



M 275

1760

BIBLIOTEKA
SEMIONOWA
SANDOMIERZKIE

Fragment Chirurgii praktycznej

Wykaz treści i numerów rozdziałów

Castratio, Extirpatio testicul.	pp. 1.
Operatio ad fistulam ani	7
— ad alviam ani et anum artificialem	19
— Hydrocele	25.
— Hematocele	37
— Varicocele	..
Amputatio artuum	40.
Tworzenie sznurów zębnych (Core- morphosis)	64.
Operatio ankyloblephari	82
— Ectropii	84.
— Ectropii, Trichiasis, disti- chiasis et Blepharoptosis	87.
— Colobomata	91.
— Glandula laryngalis hyda- tidosa	93.
Extirpatio alienae carunculae laryngalis	94
Operatio sacri laryngalis, fistulae laryngalis ad formandum du- ctum excretorium laryngalis	96.

M 275

1760

Z BIBLIOTEKI
SEMON
SANDOMIERSKIEJ

Fragment Chirurgi praktischer

Weynregerische nery raurerh

Castatio, Estirpato testicul.	pp. 1.
Operatio ad fistulam ani	7
— ad alviam ani et anam	19
— Hydrocele	25
— Hematocele	37
— Varicocele	..
Amputatio artium	40.
Twonem artium rery (Core-	64.
— morphosis)	82
Operatio ankyloblephari	84.
— Ectropii	87.
— Ectropii, Trichiasis, disti-	91.
— chiasis et Blepharoptosis	93.
— Colobomata	94
— Glandula laryngalis hyda-	96.
— ridone	97.
Estirpato alienate carunculae	98.
— laryngalis	99.
Operatio sacri laryngalis, fistula	100.
— laryngalis ad formandum du-	101.
— ctum excretionum laryngalis	102.

operatio p. benigni — p. 111
lectio cornu — 113.
operatio Staphylocornu — 114

Castratio et Extirpatio testiculi

Cel renowacji zwirzka jądwa ze smarkiem nasionym
np. nardzi i sporobow postepowania.

Triatamé

odkrywa się oznurek nasienny.
podwiera się się: nas. i jego nadymia.
odejmuje się jądro.
wykłada się.
Głowini opatrzywszy, leży się.

Wskazania

Skir jadra: orsu san: nas. - prazisto vreme mizme
jadra (Javokale)

Ime i točenje jadra rakovate

na masce miszka, zberasta: *Tungus*
hamatodes / lez nie ma wyhodzi z stony bialy nadw.

Przeł. iadła ze skruszeniem, Gęgr: Owadki: gdy się
ka Jaremmie zilita się i niebepier: rycia.

Slvard: pasta niepodobne do rozumienia z tego Aby niebaż:
Varicelle (wzd: zast. w.) P.

re ygori jstki. ptytj. vneisto veinem jadva.

Spermatothekę, wptywające na ogół zdrowia

Alomatokele w inaradze, adwa - god bñ. brataw
Utrata nasiema niepokonana proskami z nadwry-
cia d. pñ. wiozga do imieru. —

Maikary

Stwierdziłbym ogólnie, że jakiegoś rodzaju ucieczkę
nie jada. wprowadziła.

Memoriam oddalema, kaidogo punktka shornego
w klogynie pniektorunie dbywa up: et: kord.
Ja: ni: tak daleko pashodpany, ze nad nim nie mo
zna pawiarki patorgi bez wojewa do T. B. —
Wol: wroclaw: sam: nas: dochodpany okot: kdz: p: i: l: o: t: y
aby, bez me z naczem ja da i napol: wramia smutka. —

Wskazać się chcę na stole - boku praojca toika, kwi-
niek ułata $\frac{1}{2}$ niadr: uł ter, pod tyt. carata; ułata uł oddala

zostawiony na łódkę, gdzie opasać się natchotekami
i dać się oddać, wtedy ogólnie, dole i wycie wypróbowano.

1. Przebieg choroby

a, zdrowej stała się przy prawym boku łódki - między
rękami chorego, umocniły się fałdy skóry na mostku
klatki i nacięto wycię, tak ukonnie, aby po rozciągnięciu
na, miała kierunki biegu krwi, powrót ię tej fałdy
klatki lewej pomocny. nożem wykastym, kiedy po-
mimość unosi worek, rozina ię fałdy, potem
przedtem ię cięć z góry nad przedwiosem
klatki, do klatki górnej rany - a dół rozina ię
dalej aż do dna worka z klatki dolnej powy-
naję albo przedtem ię cięć na podwójnie:
tytu pod skórą aż nad pierś: br: z tyłu rany:
do dołu rany ię cięć br: z tyłu rany. -

b, chorej zerwała skórę i. aby ię cięć - przedtem po-
sta, i skward. i równość unosi ię fałdy, ukonnie
i przeina, potem napierając palcem w. i. rany.
skórę od klatki dol: wycię ię cięć w kierunku ię cięć:
części skóry przedwiosem. Aż: umocniły się przebieg, rany
nad podwójnie. Zerwała nabrzm: b. naprężone, wtedy
bez unosięcia fałdy napierając skórę palcem
w. i. rany. łnie ię z góry do dołu.

Nadaniem Lidwana i Monro robi ię mate cięć
nad smutkiem dla odkrycia go, a podwójnie go,
rozina ię dalej worek.

Siebold odwrócić pokrywę, łną od mostka nabrzm:
do dna worka, a wycię, rany ię cięć, przedtem cięć
do góry nad pierś.

Lekarski Aug: odwrócić, prawie prawie, części skóry
dla łatwiejszego pojedynania z nową krową.
2. odkrycie i odobienie smutka nad:

Ogólnie krowa gębka rozina ię płytkim cięć
palcami na smutku, i nacięto głębszymi rękami ię cięć,

tkanka kom: starajęca smurek, smurek ięty 2 pal.
inoi ię inoicem, obnawęcy ota do pierścienia
brasi: przebiega ię pod palcami tkanki, w otwor
wprowadzając palce iędnę do uoia przylotony.
podniostęz nęin smurek, przebiega ię przylotki.
tkankowe od pierścienia aż do jądra.

Od tego kęca wykorzystawana ię, rōnie:
Nęduwicięzi po uoicęu ehoi, i oduęu smurek
podwizęzali go i odinali jędro. Hędler, uoici
wola wyprzed pęcięzi smurek, potem podwizęzając
ty wykorzystęzający jędro. Dawniej uiano pęcięzi
odinali jędro uoicem rozpalonym jak Ręger i Plan
Guidon Cholici smurek pęcięzi przylotki, i po
dowizęzali go i oduęzali stron smureka palom
Podwizęzanie smureka i = alkowite = organkowe
przed i po oduęciu.

Podwizęzanie ię smurek przed oduęciem, gdy wypr
da odinali blisko pierścienia, jakoi Dobson i
tkanki i uoicięny smurek, podwizęzając ię kęcy
wa, ięta pęcięzi = mająca uoiko na pęcięzi
wktorem ięta pęcięzi, smurek odinali ię pod ję
wotarku.

Smurek podwizęzając ię i odinali jak naj nięz,
tylko na 1/2. nad nięziem pęcięziłotorem, a
pęcięzi na 1/2 cala nięz pod podwizęzając.

Smurek nęcięny podwizęzając ię i odinali jak naj
nięz, tylko na 1/2 jeden nad nięziem pęcięziłoto
nem, a pęcięzi na 1/2 cala nięz pod podwizęzając.

Garangau podwizęzając pęcięzi pierścienia, leci po
nięwar nęcięny podwizęzając w nięziem pęcięziłotem
pęcięziłoty wyprędko uoicięzi kanał pęcięzi: aż do
pierścienia uoicem. Dokonali to uoicięzi.

Leclerc na 4 palce: nad pęcięzi podwizęzając.

Dupuytren

Duquiroen gny weu: pisse podwirat.

Deppault wyraża, że smutek i jesić wewnątrz podwiaz-
nia wycię, pnieży: do jany br. wżusit. Pami-
tai: w rane tak wyrokiego rozcięcia, iż pniebuszy
tkóre i odhrywszy smutek, podsunawszy pętybnie
rowth. pod kamat podku: o astery ogładzły omy
ktoż krowawienie tem nieberp: im pniebuszli-
rej podgłth. Poniemat cofanie się smutek po-
chodzi z kuterania się kremastego, pnieło podwiaz-
nia smutek werset pojedynięm i radięgiem
i odda pomonikowi i pnieży pod podwiazku na
4 linie, a podwiazawszy katus podię prawotyphę
je smutek i rozinając ja, pniebusz i rozsu-
nawmy padnery, rozwalnia się werset pętybni-
kiew podp. o. radponym. —

Tuini jak Nuk, Ken: Nell rakhadajaw nadl. ka-
wizkhar ? od pruypradhar.

Gum jak ^{przepraszam} Hejler obaczenie u nadzwyczajnie
smutka p. nark. zynia podkladki pod prawe-
rkap. Patet urzysa klasiki olowianej.

Laurens major na celu pucacji. Br. nowo-
twa wzięto do podwiązania narypi intek ciętych
jedwabnych.

Podwieszenie po odcięciu doprowadzające prawie-
rke pod tron samurka w ramię leżący i skoro
pomocnik tron podniesie parietka się prawie rke
Podwieszenie exaltowane

Narzut uległszy calkowitemu podwigraciu tyrowa-
drania piazien nerw. był powodem do podw: osat:
p. Breselena, Nella, Liebolda paleonego. Tuni nie
winnajz być jichnety, a widocznie twudnok szeregowego
podwigraciu, nato rdzenie to pnie narozk, kady wka
szu powidziału, paleonaz podwigraciu ogólnie kady
ten est 7-8 pstaionaz mowu kłakka. Kom:—

[illegible]

Schnurker ramdraja: riciawienowu neru: pneumi:
podwirani i drobno wykongwa, a podwirane: i wptatek
ruciwinie jado, aby riciawem menajprate sznurka,
ktadnie na poduszce szubankowej, i rakta na pa-
chwinie a po 24 godz do 48. Kiedy nie mniej ktad nalezy
kwaicienia pneuma sznurka, ale se krowaw: nastepu-
mitytko pteku sznurka ale i pteku gnedniatu
i snaw: Kapil: bywa, pteko ruz podwirawoszy
sznurka, mniej on obchodzie powinen, niz ktadna
ktad ktad krowawia;

Wstrzymanie krwawienia różnie przedstawiane
Polek parumaję podwładanie naczyni, przesyły erumeki,
oktada twarzeni perkami zhubanki pod ryma produkt-
ke i puzjaska to oparkas T. do kosi. Tonowoysh.

Шеден укладна стопниова, купка на пнеис^т мановице:
на кнево, пориова спн: на пнеис: бн: и обтоиовны ебубанка
шкюбана, на ктава апарамисн.

Ponteau powierzył mi także fr. szmerek, adreśy komei jego
zakładu nad piros. br: w wiecie skoty, skwierdzągo
kam, okładka skubankar i fr 84 grz. - dożytki kawa-
wiecie nie ustanie, raleca lekko palcami naciśkaj.
P. H.

Leblanc który nieawiska morno prawizka, p...
da na pt: ciwia w sm: luytke, chubanke, podklatke
i oparka, uawiska, asi sama pt: ciwia poprzedniego
w sm: bytaby niedok: do podjory, pnela odania sm: ukasnie.

Runge uścinając jądra rakowa kłkwarowy sznurki,
i nakłada nad kosa ton do kłkwaru mierze sznurki przyci-
ska, a gdy jądro racnie odumiera, sejmuje!

Ledran nim odcina, grzeje sznurki między palcami, sta-
berp: raktała rawigzka powyżej od smygatku.

Celler rąpięcia mowym nacięciem i okład. gąbka
i mow: w tym: niepodwiera się sznurka.

Na tym co uginającego naprostem rawiaraniem aby
wzrostu postępy: + rawiktaniem podali nacięcia do naci-
tku sznurka jak: Rawaton, Hejermann, Graf.

Dotygi nakłone praw: nerw: naprowadzaty były
przegląda dozorumi: raku pochodzito z rawiarania
nerwów, wano defer: z raku etabego ucinienia nerwów
i waporanie urojonego umierania, ścieli: już w Celu
palcu nakar odrobinienia nerwów od sznurka. Na
który nadpaz was defer: odskilał palcami i nacię-
cia krowawe tylko podroizra.

Arnold i Garangeau sądkar ze uginistom pier-
br: mow: ze przycięcia do ścianki sznurka
nabruńcowanego po podwizaniu radzili rozcią-
do góry pieru: i rawigzka rakitadai na sznurku z
wzpięciem z wyżej.

Verdue radzi mierze rawigzka rawiska.

Gotier ^{prawemian} nerw: rawiska odpien mowig
rawigzka majgi nacelu odwieranie jądra sznurku
protypa.

Schneider radzi sznurki okładai przatkami skabach
i rawigzai pojednio.

Marchal wyprawdaję rawienia nerw: naprowadz-
sznurka, radzi mowini wprowd sznurki od a: okład-
yfi, ai do pieru: br: podwiera się sznurki, mow: sznur-
wzrostu

wnuwa do pierścienia, choremu, palca, potoremie poronnie.
 Lecz ani ciotka, najmniejszej, ani potoremie poronnie
 nieprzytomna, ulgi, bo statek pał: naj+ wzniesła
 rżaw: nerw: i mierzachy od krwi: utoremie samo
 nieopływa na rżaw: podpastry więc worek rżaw-
 drew na podkładzie, wolno choremu leża podług ugo.
 dobawia — owszem lekarze wolali od raku nerw pata,
 likowai ff nagłe rżawienie, i pnelhodpai kres amia-
 kowania rżaw, drugą, rżawizkę od pnypradhu,
 aby ja, wrarie rżawiego pnypradhu narku, rżaw-
 rżaw rżawizki. —

Pelak mowi treba rżawizki rżawizki obu rżaw,
 aby iokolwiek się w rżawizce rżawizki utwando
 rżaw, w rżawizce rżawizki rżawizki. —

4. Wytworzenie jądra

Tadto ujmuje się palcami rżaw lewy, a unoszą je rżaw-
 nani, kiedy poronnik worek rżawizki do dotu, Operator
 pnypradhu norem wyprutyw rżawizki jego, pny odra-
 biania pnypradhu, aby nie rżawizki rżawizki, rżawizki
 pnypradhu worek i wrarie rżawizki: takowej Bellu-
 wiaje się, aby rżawizki drugie niebyło nagołowicie
 wystawione, rżawizki pnypradhu rżawizki: tam gdzie pny-
 rżawizki pnypradhu rżawizki rżawizki do rżaw: i rżawizki
 i rżawizki, to rżawizki narku o rżawizki pnypradhu.
Beller uważa się rżawizki rżawizki rżawizki rżawizki
 po odrańu jądra, worek rżawizki rżawizki jest niepru-
 buy, nieotwiera worek, niepodawia rżawizki, ani
 jądra nieotwiera, lecz pnypradhu rżawizki rżawizki
 do kosi ton: od rżawizki rżawizki rżawizki nabok, uj-
 muje rżawizki rżawizki rżawizki, rżawizki jądra do dotu
 ;worek

wadza i wargi nad sm: do zburzenia i naprawy
z 4-5: i tegoż korw: - Mniej pierwsze pojednanie po
opatrzeniu parskani łepki - brzozy szklada i c.
leci parskani skabanki, wryłko i k.
parskani łepki, na które wkładzie się kompres i op.
ska T. - po cieniu wyprawę podestanie, wkładzie się ko-
tego na grzbiecie i radaje opiat.

Udalenie wiru opieraj

Nader obfite krwawienie i kurce.

Krwawienie z cofnięciem się sznurka, wypchnięciem
się przed podwiązaniem naryn - wstrzyknięcie się
V. konna na delu okolic brucha i pierścion, poje-
dyńcze tetna podwiera, lecz sznurki z kłowi realy
ptarogrym wymaga wrycia V. walc: Thedem i na-
cihu łepka i skabanki; gdzie stan naryn był
woszeniem i k. sznury krowiwoń, tam je wrycia
lek daleko, jak sznury nożem można wryć i k.
k. sznury.

Kurce porównać do pniecia i po cieniu wy-
magają tylko opium.

Udalenie po opieraj

Krwawienie następuje

po cieniu.

sznurka sznurka.

sznurka: sznurka i krowiwoń brzozy i jego skabanki.

sznurka: wrycia sznurka

Kurce z sznurka Tetanus.

Udalenie brzozy sznurka.

sznurka sznurka.

Melanholia sznurka, jada mianowicie sznurka 25-
45. sznurka.

Opatrzenie drugie po wstawieniu się sznurka, które
i cili jest obfite i w cieniu, sznurka do opatrzenia i tak
sznurka - i 8 d. lub później sznurka sznurka, by-
nie brzozy sznurka sznurka i krowiwoń sznurka

p 10. 12 dni szary ma tuteż porówno nagrobek, po-
kazy mają być sekli, za napój orszada- stola
ma być kawce wotny.

Operatio ad fistulam ani

Nadaniem j. rozciągnięciu grzeczki albo powołaniu mostka między jamą kieszki i rektum: zwanego fistuły leżącego, za pomocą stworzonych narzędzi i sposobów albo celowo nadaniem fistule postaci samej lekkością i wzbudzenia w niej potrzebnego stopnia napięcia i rozciągnięcia i wzmocnienia;

Czynności główne są:

1. Rozciągnięciu otworów fistuły
2. Rozciągnięciu części miękkich między jamą kieszki
3. oddaleniu ciała obcego, jeżeli j. w kieszce
4. Natamowanie krwi do otworu.
5. Opatrzenie otworu do wzbudzenia potrzebnego napięcia i Rozp. i odpowiednie leżenie.

Wskazania

1. Wszystkie fistuły, które narzędziami dotrzeć można, zwłaszcza jeżeli są głębokie, wysiępiate i nadwierają, czynności organów, a rozciągnięciem otworu nożem uważa się miedziową;
2. Cała obra, innymi miedzią i oddaleniu opatrzenia.

Nakazy

1. Jeżeli otwór wewnętrzny: 2. fistuły tak j. wysoko, że dotrzeć można narzędziami z przynajmniej dostateczną siłą, i tak nadciągnąć utworu powrozu było można, to chodzi o Ribesa i Larocyn i Gleditsia, prawie wszystkie otwory nakłkane liniami żółtymi i z St. Kierkowem, jednak może być rozp. obok kieszki sięgającej dalej, choi' cięło do fistuły nie należy.
2. Stany chorobne organów kieszki oddech. przyległych jak Stychno miedzi, pecherz prostaty, miedzi,

poskwy, które u wprowadzity f. i. tate = jej sa skutkiem.
ale sprawa, ulczy sie, nie daje.

Teżak nie przekorują, bezwzględnie, bywa bowiem, że
rozwiązanie faktu, że ci ogniska xinnijosa i
dawa były podobne, a faktu, że w rzeczywistości były.

3. *Hereli* fakt: Stała się organem reakcyjnym se-
krecyjnym i sprawadka ulga Tłby, która reakcyjna
albo gdy j. Stuga konazyca Crisis.

4. Tereli piktata i organem nadawniaty se - i. ekstr. 6.
nawet chowalby byta bez wyzolenia i imna
chba, gdy dawnem twaniem wstajata i rnae. 7.
nie rymoiu organem, takie raleuone, iowne 8.
jaki ractanate wrody rymu ragnaraja - Rona 9.
rpy nalerz orzli organ, jaki ractaheng - hew na 10.
okarye usporob. do rby i do jakieg? organ rone
jwre byda rony, wse wysledni jak, skag? org, jw
ka rymoiu niej. ronetarai, jakia rlosunka racth-
dra miedry byni ek: a piktata? tak pny jej
hwooneu nie, jak wbiagu jej twania, org uspor.
bienie organu ractahet. do pnyjeria rymoiu racth-
rpy rpy po ulezeniu piktaty, miedatoby nie, racth-
pny rnetthieu? ry rba ktora piktata rlyste,
stajae nie rniej racthau ff to, da nie wianu
stanie utnyrna i obiaq rnetthie.

To wrelwaukry, morna oznawryj' o ile operacya br-
dnie ~~stawiana~~ ^u ~~skhodowa~~ ^o ile pakow beznie wa-
runkoway ^u ~~berozgi~~ - Pomniei, ze w wonod dobro-
wolny stryji redota ^u ~~pokonai~~ ^{duany} ~~shbe~~, teg,
zpodreicai se nie ualery od skurmezo, jak miedelk,
wiedpiei bowiem nie moima o odzajaj pnygzokow.
ff natura, ani o mieniem, ktore do celu pnerma-
 wysta.

rytu. Terleń fistula prowadzi do inguinieckiemu, wtedy
bez względu, czy powód ichnie i czy inna Abscess:
pępe, materij, probu, modetko, potem operacya.

5. Sakakolowicki Abscess wewnątrz: ogólna i w którym organie
nie napię w czasie, kadłuba, brzucha, bez względu
naję postać i istoty, którąby uważać można za
powód do fistuly - pogorszyć się mogąca po
operacyi nagwarazade.

6. Najlepiej częściej fistula otwierająca się.

Jeżeli są warunki.

7. Bolesność nacina: do fistuly należącej rakowej do czasu.

8. Werty hemoroidalne nacina.

9. Stan organizmu i kłopoty do kłótni.

10. Wzrost i rozwój w ogóle, a w szczególności: kłótni.

Wydane są te fistule dobrowolnie się tworzą, sko-
nane i ich wywołanie, mianem: *exanthem*: których by-
skutkiem dokonane postacie. - w przeciwnym razie
w nich uległyby dykt. mianem: *exanth.* suchot. w ja-
kijkolwiek ich formie i postacie, bez względu, nie można
przyjąć stosunków wskazywanych, po naleceniu fi-
stuly, wskazać się może Abscess gwałtowna na-
wet śmierci. Bywa i to, że o istocie fistuly wio-
dzącej z Abscess podobnej postaci, która fistula po-
jawniła: i skutkiem powodem być mogła, uwa-
żając się fistule za realną do operacyi.

Wniosek ten składany być może, gdzie sążniste i ra-
palczyk wzdłuż hemoroid. i przysięgę pewni: przysię-
bom równie ogólnie mogą spowodować fistule
niebawem wrode, które są rozprzecz werty, jako
nawet Abscess i kłótni. Wniosek, i mianem:
wraz wachoby, wyjątek fistuly bezuwnodami.

Rozpnie przy otworze otolowymu z obwarowania me-
chanicznego wydaya fistuly wodowe: jeżeli osoba
cierpi skryta lub jawna dykteryja, kaskeryja sa-
kot, wtedy te fist: wa: przynajda czynności Abou
sprawiają, ulgę, choć głowonę, tak ze ta prawe pnieka
a głowon Abou daję się być fistula.

Ja rdanienia fistul, których stanę zakażone, tak
dalek równowazę się z nakarami, lub też z ujednoca, po-
najbliższemu twardo, jest zbawieniem lub zkażeni
operacyi ornaryji, wtedy iiste indywidualizowanie
pnieknie lekarna wyrok stanowią

Sposobow operowania jest 6.

- 1^o Podwiązanie
- 2^o Wyjęcie ścianę fistuly
- 3^o Rozcięcie fistuly
- 4^o Wypalenie żelazem
- 5^o Wykawienie środkami trawiącymi z pomocy wathol.
- 6^o Kastracykane uciery drzewianych.

Wynura się cięcia podwiązania, inne sposoby albo
wodorotekne, albo okrutne: za nadto niebezpieczne dla
życia, Proiz wyjęcia ścian (Excisio) w raku
skrowatoru, lub pniekoczeniu rakowatego kieszka od-
rodowej, lub wrzecz innych, jej pniekoczeniu organi-
cznych. Miedzi się naley pozrytać skward niecie cze-
fistulowych ze skward. skwa lub Raka.

Co do pniekoczenia pniekanego tym sposobem.
Podwiązanie więcej robię jedna ralety, które wspot z ka-
ciem ze skoty Alexandryjskiej pochodzą z rereg. było
od Arabow wzięwane, gdy cięcie Grecy pniekocili. On-
te sposoby miały ichonictwa, a w końcu XVIII wie-
ka pniekoczenie cięcia na ludwika XIV króla Fran. uczyni-
wały wretori robię sjednato: mniej się używano
aż do

a do noszka w. XVIII. gdzie zapamiętane Podwrażanie
 f. Foubesta było wznowione, a Kludy Pott cięć naj-
 prostsze starał się zalecić. Desault i Kongre wy-
 nalezieniem narzędzi starał się Podwrażanie wyje-
 dnać, i z niego tam używa gdzie uoi dojeć nie może.
 Stałany fistaty stolowy i słomki indywidu-
 alne do niego, a okoliczności niegdy być stanowczo
 mi zasadami do używania Podwrażania lub Cięcia,
 a nawet rumiany tych sposobów są tak różne, że
 wypracowany je przysposobił przynajmniej pierwszeństwo
 najbezpieczniejszemu najtańszemu i najprawnie-
 jszemu.

Cięcie. Oporowanie cieniem przysposobił Galenowi, któ-
 ry wymyślił o Syringotomie. Sposób ten różni
 się wykonywaniem słowem do fistaty.

Kłótki rozcinając się, powagając się, fistaty do-
 rzeć pnie maczając na rękawku syringotomii na
 pewną kłótkę, jakoby użył celu uoi nieporówny-
 przedurony w postaci rękawka rękawka wprawa-
 drzeć w otwór fistaty, pnieć się po otworze wewnątrz
 bony do jamy kłótki; pnieć anem na rękawku
 wydobyciu, ażeby rękawka nowa, ażeby ręk-
 kę między uoiem i jamą kłótki rozciągnąć porusza-
 ją uoi w otwór. Syringotom, zornat imian
 f. nadanie cienia jego rękawkowej więcej glistki
 lub wiskrej długosi, lub opadnięciu nakrywką,
 lub rękaw kłótki wywaga się na rękawku na
 rękawku w kłótki. Teodorius i inni wyrażają na
 rękawku rękawkowy i rozcinając. Pott nadawczy
 uoiowi uoiem na koniec głowki pnieć wprawa-
 dra po otworze fistaty wewnątrz do jamy kłótki, gdzie

quartus gloriose. na palu wskazywajm w kieszce, ep-
sohem pítowania, wyznagajm nór iwanu rocznie.
wrod tego postadke masz, bydz odagane na rewangte
na boki, nap-riane aly atawu rocznie.

Cicui pistut Stuguk. Wprowadzisz do kieszki odch-
dowy gorzorek drewniany lub metaliczny, na którym
sie uoi ma opiesai, rocznie sie iwanu pistuty.

Drumont uwanu gorzorek do pistuty, nardziem za
Stukowem, lud od strony kieszki odchodowej. po-
dobnie wykonywa Brombignu pnyrdem. Cicui u-
iem ukrytym rubia Platner. Wallolm podaje do
pistut Stuguk norycki norktadue, iktangh, iedro
ranie wprowadza sie do pistuty, druga do rany ki-
siki, stonowy oba rannona rocznie sie pistuty.

Pott. Ben. Dell wwarajm w mebpierciusko ro-
nie Kanatu Stuguko, ie moana pnieia wariad-
senja, sadas solny tytko Konie Kanatu rocznie,
obok rocznie dolnej cressi radzi Drondi wyomy.
Kai tuziem gzyrany caty Kanat. Monro p-
dobny obawy radzi seon. Okwó rocznie spowa-
die do lnu prosty z Kanatem.

Cicui pistuty elegy na weinagte. Niciu sie pistute
pnieu. dua pnieja sie chorowym noiem, poren-
cose sie Konie noia: iwanu pistuty na noi sie
na lwa. Kant opora Konie, pniejajm noiem
Saargniogo na gorzorek Reizingesa. lekajm sie sta-
kerin'a palu, bo Hunrowski z tego umart, ras ok-
wony palu okiaw odejmy sie cunie. Bywa sie
pistuta jest elegy na rewangte, wtedy Konie rewangte
rocznie sie lancetum, i pnieu sie na doklad new
pistuta, lub jest Konie jest niewygrany wpowa-
drany do

Przewyż do Kierki odcho dziej z gębki zatknięcia się
go, i toż reszta zatknięwona, stara się wjeść wo-
twor wewnętrzny fistuły, rezi zatknięwona pnie-
jąca kanał aż do dna wewnętrznej, okazy niejże
otworzenia. Desault radzi rozciąć kanał do cho-
ry wewnętrznej Kierki albo nosem, stonując się
do drucia, albo liłotomem, lub swym kielichem.

Stany chłone wskazywa się

1. Tonelka fistuła niezgłębiona najwyżej na 7. wiersi ciała.
2. Gdy fistuła na kielku rozchodzi się gateri.
3. Młodzieńcu zgięciu fistuła stonowirnych
4. Fistuła z ichnami ciałem obrem
5. Stan Kierki nieobartliwy wogóle, wzmog: Kierki odcho dziej.
6. Gdy operacyja moria uważa się p. rodek do ulżenia
lub oddalenia organu przyległego Abnego.

Podwiaranie jest wskazywane

1. W Kierce fistule, która wolno operować, a chory może u-
żyć niedowala.
2. Jeśli chory wbiega leżenia patniedniemom musi się po-
wieszać.
3. Jeśli stwor wewnętrzny lub duo cłaje, tak jest wy-
socho iż palem dosięgnąć niemożna.
4. Jeśli obok fistuły masyjna hemoroidalne są cho-
rowate.
5. Chory podpada biegunce nietogowej.
6. fistule towanyszy Kacherya lub Dickaryja drata-
nia mierzakanyja
7. Jeśli miewa mierzniejsze rozpięcie mori byi slihodliwe
8. Jeśli obartliwom chorego jest 6. p. mażna.
9. Jeśli chory daleko mieszka od Lekarza.

Stonunek operacyi do ogółu moria tak wyja-
snić: że fistuły wyrobic i bez rawnictania p. innymi
stanami

stanami u miedziowych morna operować, bez obawy
niebezpieczeństwa, bez urazę prągnym, tj. gdzie fistuły
coyrolu sięgają na skórę u drążkowych, i gdzie wiele
wielkich hemoroidalnych przepada skaleczyć, lub gdzie o-
pasane niekorowne do skopania drążkowych i do rymu
palcione, tam skutkiem uścis nowa być zapalenie
gangrena, kolki, które często są z tyfem i ma-
stym, zapalenie brzoświ białym, opasane nawet
niekorowne może być stać więcej niebezpieczne od ciekia
Tam gdzie drążkowe po uderzeniu rozwinę się przed
wisto, gdzie fistuły rozwęsto od jej dna, i opasane
korowne do drążkowych i obrzmienie skaleczenia, pa-
lono, konjunktury ciekia będą widoczne, bo usuwa się
niejczyste uciekanie i ogólnie, które mogą wskazywać
fistulę nastąpić, jako to: mizerne, poczyni
wgnięcie i t.p.

Powrót lub trwanie fistuły stać często pochodzi, i
ciężka choroba mogła być obrzmienie obstrakcyjne, lub
b. mało miata pywotności po zmierzeniu, a stać nie
poradzić zdolności do potrzebnego do rymu, lub fistuły
przed operacją, mogła się z kilku kamionów złożyć
których nieznajomość, lecz tu było by tylko uszy białe
lub mierzwińskie odległa, więc to nie jest parutem

Przyrząd

Klebek rękawowy gładki, jeden z koncem słupowym, dru-
gi rękawowym bez słupowym - noż z głowicą Pół,
noż prosty, nóż drugi woski; noż ławiczny, i t.p.
Włoszowy Reisingera i Peruga i Desaulta, nożytki
z koniami rękawowym, lub Walckhimego z włoszow-
nandzia do podwijania rym. Oliwa, gładka, woda
rumna i ciepła, woda Thedena, kłosa walkow d. 2-4
cali

17
ale długie ze szubanki oliwa namaszczone, przetrzy-
szubanki przy kielku, podkładka podługowata, opa-
łka T. kielka drogiem podługowatą. Pomocnikowi.
4^{ty}, z tyłu dwóch rąk pewnie i spokojnie zachowanie
sie chorego, mieć utrzymuje urosnąć zdrową część
tyłka, swarty utrzymuje rękobitki rowkowy.
Ułożenie. Układa się chorego poziomo, nabokichy
przy boku kielka, i aby tyłek na bóg wystawał,
przez uchyłając się na podłogę a pod tyłek ta-
rata. Chorego dolną stronę przetrzywać wygnęga się,
nogi zaś podawać ręka się pod kielka, rękami
chorem aby przynagłać do brucha, lub jeżeli by było
dogodniej ułożenie, jak do Litotomii, lub potracenie
na brucha, z wystającą tyłkiem, przez to sta-
wić się przetrzywać, sposób Litotomii. Do wyboru Litotomii,
wtedy ogółnie. Oparcie I. nakłada się przed operacją
czem, i z poziomu i kosciami tyłu podnieść, aby woda
nie operacji nie była przesłana. Rozciągając przed-
kciem oddać stoła przed operacją, rękami się ene-
my na b. godzin przed operacją. Jeżeli chorzy przetrzywać
jest na wosku rozciągnięć go stronami na kielka dni
przed operacją. Wosku i tam przetrzywać chorzy się do-
rozmniejsza chorzy i ogółnie ciała, wygnęga poto-
żenia podetka w najskuteczniejszym miejscu.

Operacja przy fistule doładowej, gdzie są dwa
otwory zewnętrzny i wewnętrzny.

1^o Przygotowanie. Ułożenie chorego chorzy, wprowadzić
rękobitki rowkowy z kciem skryć go fistule, a do-
my kielki, potem namoczyć waleczkę: lewą
w oliwę, wsunąć się go do kielki; na tym kciem rękobit-
ki

brzask opastny, adnie się zglebnik pomoinkowi i
statygo alupnania.

2. Oryg: Pojem noż gloskowy Pota i Savignego, po-
piera dżidat, ujmując się z ręką, prawą tak aby po-
stał przypadał, na przed ręką, na kółka linij mi-
rę solnego konia ręce dżidowej, a palce wskazują-
cy, średni i pierśniowy na stronie prawej, grzebień
ręce wstawia się w rowek zglebnika i stawia
na palcu wskazującym, po czym pomoinik wyznaga zgle-
bnika. Operator prawą ręką swoją wchodzi bedany
na grzebień noża, tak aby gloska noża patrzył
brusem palca, posyła ręką noża, ku stronie
długiej i tyle, aby noż stanął w osi podłaznej ki-
nety, nasika palcem noż i posyła go coar więcej
konik wyznaga i palcem z kółka i pociągają
koloburki ze znajdowało między palcem i nożem.
Trzeci kółka noża, jednym przycięciem nożem,
długo i prosto pocięcia, i tam utwierdzenia no-
żem. Pomoinik w chwili pocięcia potwor
byłby dżidat, napiera odciągając na zewnątrz.

3. Oryg: Pojem wprowadzający noż, aby na $\frac{1}{2}$ cala
wranie, obraca obrz do drugiego kółka i pocięcia
nie ścianę fityły, a goły na 1. cal u dołu na 4-5.
Druga, nożem ręce niskie, polowy byłby drugiego,
aby stworzyć równy sam, przycięć go tak
byłby dżidat, byłby dżidat u dołu i aby w rękach
złazniatych wbudzić potrzebny stopień zapalenia
Odmiany Operowania

12. Trzeci fityła składa się z kółka kanałów, każdy nożem
mały, razem pociągają jeden kanał, nożem się i drugi
gdy jest

gdz jest nadrobie ciecia, a wyinkity kawatki skóry katowały
wygina się. Jeżeli jeden z kanałów idzie na bok, wtedy wypro-
wadzisz rzytbniki rowkowy, nowym prostym kłociowym roz-
wna się, jeśli kanał powierchowny pod skórą idzie, sko-
re wygnie, bo dla braku tkanki skórki rowkowy nie jest sta-
bny do pojedynania.

2^o Najdopuszta się nad otworem wewnętrzny, kłocika jest
obrotowe obracanie, radzą drżać tak, jak żeby fistula
była lekka, i ade dno ją rozciąga, lecz w tym czasie
może się wydławić i w czasie wyprowadzenia noża
formuje się otwór wewnętrzny fistuły, niewielki
po co fistula rozciąga nożem, ratując ją temu, powier-
chu noża małych otwory otworami fistuły, wypro-
wadza się do rany palcem wskazującym a po nim no-
żytkiem pniekonnym leżącym, idąc rozciąga i gładzi-
wli obracając.

3^o Lito wprowadza się po fistule do kłoci rzytbniki
z kłociem otwartym, a pniekonnym się palcem
wskazującym, wprowadza się rzytbniki drewniany, obro-
towy i owiknem do fistuły; w kłoci tak wysoko, aby
na $\frac{1}{2}$ cala wyżej nad otworem wewnętrznym stał,
na rowku opiera się rzytbniki do kłoci wprowadza-
drony i pniekonnym go pniekonnym, żeby stale opie-
rał na rzytbniki, operator sam używa rzytbniki i wprowadza
nóż prosty kłociowy z fistuły na rzytbniki
opiera na rzytbniki nóż, wygaga nożem rzytbniki
i pniekna wszystkie rzytbniki opierając się wyjsm na
nóż, i wód wygagania noża pniekonnym napiera-
chony bytek. Po rozciągnięciu rzytbniki z rzytbnikiem
które się próbą skłoty, wygaga się wyjsm na
tak

taki wydobycie są dowodem pniecia do doskonałego
stety.

Aparatura. Tę pnieciem jest:

1. Oddać warg, rany od dna aż na nową rany się
ba stychać nie mogły.
2. Wkładnię stonowy stojen rąkoma
3. Wkładnię odpowiednie słowi rąkoma
4. Wkładnię rąkoma rąkoma.

Oczywiście stety rany, operator wprowadza
pale wskazujący ręki lewej do karki, aż do dna rany
winnę kłosem rąkoma walek słowa napuszczonej tak
ręby rąkoma stony kłosem wytworzył, a pnieciem
druga, stonę po pale wskazującym aż do karki
nego rany, walek płotka walek ten, między warg
rany, tam stonowy kłosem, wydobycie, kiedy
tym czasem, pale walek więcej walek między war
gi rany; następnie wprowadza się tyle walek i
operator wina potrzeba do celu, lecz aby w czasie
wprowadzania, pierwszy niewypadek rany. Dojamy
karki, poleca się pnieciu w tym czasie karki
na rękach, lub operator sam, palem wielkim
tej ręki, który pale wskaz. jest w karki, pniecia
karki rękoma walek do połowy chorej ręki.

W karki wprowadza się do karki gruby walek, stonowy
manna nim więcej walek, a rany karki, potem
pniecia się przez skubanki na rany: pniecia
pniecia karki, nato rękoma się karki, tak
ręby słowa stojowego rękoma, ogół pniecia
pniecia się opaska T: układa się chorej
na boki.

panenka

Nadaniem pod czas operacji:

Najważniejszą jest Krwawienie rzygłe wskutku paury-
zkiego użycia. a tak pniecia kistka gątarek kisto, albo
pniecia jednej lub + gątarek hemoroidalnych, lub wrostów
hemoroidalnych. Wszakże krwi ptyzna nie zawsze
wzika na równość p. choor stoloway, lecz powracam
do jamy kistki, gdzie niemażące oporu, w znaczny
wyteu sa dotu: i sprawia szawiska krwawienia waw;
ktore tak sie mogą piznie niebezpieczne, tem więcej
je pny on na ich jest utyktar. Albo wyduje sie to kraw-
wienie waw: p. puto dobowy, upadanie iit, kłednienie
boway. Jest pinnny na ciele, kłuch sie nadygna,
to ki skłach, stychar bawenie, następuje ciele wydyma-
nie na stole, który z kłodzi p. mass krawnych płotory.

10. Teżli kłucha krawica jest blisko słowu stłk;
i kłotpiu do niego moćina nardziacim, podwizra;
pawie: pny miedzyt wółkiem krawicem wyptarom
rarkny kłicenie wody łdowaty do kistki odchoway;
pny kładowanie jej reongka, lub wponowadparow drop
skubentki grubey, podługowaty skropiony 7 Teżena do
kistki na nanyne krawice i palem i stółkiem
sie nawiakta. Teżli nanyne krawice jest wygro-
ko: i krawicem pmaćne, a crotki nardostakierne
wtedy raweruje sie na konie gionym cropa sku-
banki duraga, i owatnego dwie mome iitki natkny
iitly ołeny konie iitk p. bokak jego zstapowaty
a wronowony cropa namatowany kług: Digestio, ar
nad kłat gionny rawy, ujmupio sie 4. kłone wyktod-
e skłotki rektar ławar, tak iitly nierniennoty
kłotunka p. bokak cropa, miedzy iitki wawia sie

niekiedy prawda tylko tutaj ze skubanki do kieliszki aż do
rogu, aby wypatnie kieliszek, potem włożyć prawicę
ze kielisza na wielką skubankę, a tak rogu i kieliszek
skubankowe po naciśnięciu ustek, tak się do siebie zbli-
żają, iż rozciągają się w poprzek w kierunku naci-
skając narynia krawiec, lecz ponieważ opiera
wielkiego niedźwiedzia, jest skubek nierównie do-
statkiem.

2^a Moria płołek nowicem do rany obłożonej wy-
wodzić do kieliszki i rany naciśnięcie, a naciśnięcie do
kieliszki naciśnięcie, które skubanki i kieliszki skubanki, kieliszek
się promienistymi i rany ze skubanki naciśnięcie na rany
i naciśnięcie krawiec.

3^a Lub wprowadza się do kieliszki puchem białym
koncem słupem a po otwartu wstrzykuje się do kieliszki
ta do puchera, wypatniwszy go do potłuwki prawicę
ręce się ośmiakiem skuto rątki strzykawkowej i o-
tule się wstrzykuje aby naciśnięcie na rany wypat-
nat, potem rątkę wydobyci i puchem krawiec
U kobiet ze wrodki wystawiają, wypadła w rany
sta lepszego naciśnięcie puchem wypatnat. Działanie
tych wrodków wypiera się utoniem chorego po-
równem na boki rąk, naciśnięcie kieliszki i białe
paleca się spokojnie, wypiera się działaniem okładów
ręmi i rąk, na brzuch, rąk powiekiem
rąk ośmiaki, rąk puchem.

Łdarczenia po operacji

Krawiec naciśnięcie na wypatni i naciśnięcie
zapalenie, Gangrena, kurcz krawiec w potłuwce
kolki

14.

Ropienie kolikwajne, patrzymanie uryny, Biegunka, wydymanie się i spawrot fistuły.

Leżenie następne. Operawany dostaje parazzo po operacji, opiat, dla uspokojenia umysłu i wstrzymania stolca p 48 godzin, aby p ten czas niepotrzeba było odniewiania opatrzenia.

Skoro się wstawi ropienie opatruje się raz po drugi, jeżeli pierwsze opatrzenie dotąd niczna było ulymman potem starai się aby chorey co 24. godzin oddawał stolec, jeżeli to nieumiało miejsca. Wtedy przed każdym opatrzeniem rada się enema. Po oddanym stolem wypróżniona się V ciepła kłótki i jak dawniej przyniesioraże ilości watków opatruje się. Na każdym stolem rawsze opatrzyć na nowo wmiare, odwarzania się wrzeć ode dna rany, przyniesioraże wbytu sznurku ilości watków które niema rąka, się w aliwie, ale pny stopniu przyniesioraże odrygn, w odwarze solaru maczane, lub dosztygając za maty odrygn sucha watki się witać. Ostukanie palcami rany przyniesiora trawienie kamieniem żółci. Pokarany porządkowo ptyme, rozot kleisty, za napięć oszarda, potem lekkie mięso. Stopień odrygn wskaze sposob odmiennego postępowania. W razie za matęgo zapalenia wlewać się je wodkami warmac: Drar: dyta, przyniesiora. Zarazne zapalenie przysia się rozważaniem opasania, rumem okładaniami, pijawkami, enemami kleistymi, oszarda, lub wodkami kleistymi, olejnymi, co jeżeli niewystarza opatrzenie odjąć dopóki zapalenie nie ustąpi. W razie gangreny oddalając przyniesiora powodo we użyje się okładan ujętych wikt gotowych

gotowych : rachowa się ochłodzawsz około rany.

Kurex i Kalkie, albo wypadki silnego odrazu oddać się sposobem powyższym, lecz w niejże okładani reszty kurexu ciepło. Rada się R. Opji ze wrodkami olejnymi, endymy naskalyrnie, opasanie się rozwałnicą, lub odgrypiem uwarai' ony pod postawia koleki nieustynowa się zapas powłoków lub miewioń białozębnych.

Rozpięciu topniażem, rana się od dabinem przegrzany odległych i dyktaw pozycjonar. W razie ratnymania wrym wryze się katekero, ciepłych okładani na oko: tonowa i rodkow olejnych c. R. Opji, Enem uśmierczających i opasanie się rowolui.

Podobnymi ztkimi oddać się biegunki : Tencemum,

Pawioł fistuły nakaze pawłony operacya się wrygdem uśtyym, na okolicznosci kłose run uwrzty powożenie się i traktania pierwszego.

Cięcie fistuły ślepiej na wewnątrz

1. Kalkes. Rzętebnik równowry z końcem prawym wprowadzić się po fistule do najniższego punktu zmię obwaronej kirski, lub do dna fistuły prawego, potem wewnątrz wolny pale wskazyjący do jamy kirski, dla przekonania się o natryglem rzętebnika stanowiącym. Kłosego utrzymywanie state porusza się pomocnikiem, potem wryżwszy nóż ławigowego, tak iżby wskazywał w gębce sporywał na przednich rękach pale wryższy najniższego i puresienowego, a potem na tylnym końcu trzdy wprowadzić go prosto rzętebnika na punkt do punktu puresienowego z przekonawry się ze głowka nora tam stoi, co pa rzętebnik z fistuły.

2^o Kłucie Operator wyjąga pale r kłutki i wprowadza
obrotowy naprężony rłobek kłutowy Peinigera i rozstają-
cy się na rłobku ramionami kłutowy. Wtorzyszy pale
włtki i pierścienią, w obrętki kłutowy, pale średni postę-
wi się blisko pierścienia wewnętrznego, a pale wskazyjący
potrząsa na końcu tylnym. części drucianej rłobka,
tak aby głowka noża przypadła na przostreni wy-
kła i odległa ramion kłutowy, a rłobek wygot-
owanie i aby na 1/2 cala nad głowką noża stanął,
pozem operator nawiąza głowkę noża i ścianę kłutki
w przostreni między ramionami kłutowy ku rłobkowi wsu-
wa. Odstawanie rłobka od kłutowy, wskazuje dobre
stanowisko noża, natomiast jeżeli go nabłki po-
szar niemożna. Pozem przybija się ścianę kłutki wy-
szneta drucika, a poruszając noż ku rłobkowi, które
jego głowka przejdzie p otwór w ścianie kłutki robi-
ny, cofnie się drucik i rłobek kłutowy r kłutki się
wyjmię postępując noż w jednostajnem stanowisku.

3^o Kłucie. Na koniec wprowadziwszy operator pale wskazyjący
rłutki i obrotowy, namaszczony oliwą do kłutki, stawia go
brusiem na grzbiecie noża, a tak mu poruszając noż
i wyjągać go r kłutki, przynosi się przegoda fioletowa.
Albo można kłutowy tak robić.
Rętkownik rowkowy r koncem prawym, doprowadza
się do najwyższego punktu fioletu i palem wskaz-
uje w kłucie przestępując się o jego stanowisku. Pozem wsu-
wa się rłobek w kłutek aż do końca rłutownika; na
rłutku rowka rłobkowego, opiera się koniec rłutownika,
którego utrzymanie pomocnikowi się porusza. Po row-
ku rłutownika wsuwa się prosy noż wartki p fioletu
do końca rłutownika, koncem noża przybija się ścianę

Wierki tu atłokowi, który opastory nóg wygiaga i
razem oba narząd atłoki rozcinają prawarkę
między niemi.

Podwiązanie jako mniej obciążające od cięcia nie ma
wpływu miejscowego na ogół ani na dno organu, a do
nemie niekiedy po nim widziane były skutkiem lub nie
właściwego do podwiązania użytego materiału, jako
drutu stowianego, stotego lub ramiennia niestawianego
Skłerenie po podwiązaniu jest mniejsze, jak po cięciu.
Zaleca się szereg: sposób podwiązania tam, gdzie orga
nizm pierwotnego prącia nie może i nie może
drzeć na odległym prąciu. Lecz postępowanie obrotu
wypycha podwiązaniem, sposób zgodny z naturą
podwiązki nie tylko chwila prącia na swoim prąciu
ale również bycia niekiedy prącia i innych jemu nadawu
nadto podnieć prącia i innych pod warunkami indywidualnymi
tu wypycha wypychaniem i najb. i jedynym sposobem
w razie gdzie obrotu wewn. fiutów, lub drut, tak wypycha
prącia i innych prącia i innych niemożna. Miałoby
przypadków gdzie cięcia w tym razie stało się kom
stnem, niemożna odjąć lub podjąć prącia i innych
tu podwiązania. Lecz z drugiej strony przy fiutach
doskonalszy i gdzie cięcia wierki jest prącia i innych
nad cięciem fiutowym wewn. podwiązanie niemożna
rozważać prącia i innych, gdzie prącia i innych
wystawia do urzędowania tego prącia i innych
do podwiązania cięcia prącia i innych prącia i innych
chyba że będzie wykonane sposobem wypycha podwiąz
przy fiutach na wewn. prącia i innych. Sposób prącia i innych
tak

tak operowane fiatury wracaty lub niedaty, nie zabawy,
a forma jest doskonała reszta ma znaczenie obywatela, lewo
w uziemiu statek nie zagoty.

Przykład do podwiązania: Trójkątne rurka, pętle
bucik przypadają do tej rurki, która barania A. na skrajce,
przy której byłym końcem przysięga się. Strzyżek drugi
rurki. Przyjmuje się p. koniec strony praworony, smutek
na tak kamień, jak drugi w rektoryj p. białego, jedwabiu.
rurka płaska, mowa i na - wchłania, stosownie do dosto-
w. składowa fiatury zewnętrznej, od składowa stołowego
drugą na lin: 6-15. i tyle smutek aby oba konce
prurka takwo daty nie przesunąć, nabiegach obu końców
jednej siłany na p. tyłki nacięcia, do ramienia wnie
prurka, p. odłaski p. tożsame, skabanka, opaska T.

Dawno używano drutu otworzonego lub otwartego, lewo
to mowa, którego, więc ulegała smutekowi który w ród
mowa p. 6-6 tygodni aby nie p. nieg. 103 tyg. nie
odnowi. Pomocników był w przy czyn.

Mechanizm podwiązania jest różny stosownie do drugo-
ści fiatury: stawa się doskonałego i niedoskonałego. Je-
żeli fiatury: kółka doskonała: p. palcem i z drzewa mo-
żna operowane były sposobem pseudohipokratyjskim
albo Alexandryjskim, używano pętlebucha cynowego
ze smutekiem linianym, takowy p. nieprowadzący p. fiatur-
ta aż do kółka odchodowej, do której wznawia się pa-
tele wskazywać, p. gina się go w sposób karykatury sta się
cia smutek i wprowadzenia go na pewną bps.

Foubert operował tak, byłko używał szpilkę (as-
doire) a zamiast smutek drutu otworzonego.
Pomocnik pętlebucha grzechon ma być takowy i by się
p. gina stosownie do kłosa fiatury p. na tej zasadzie

Fugenburg wprowadza metalicznego słony wprowadza
złotnika wprowadza ff fistula do jamy kieszki; p
go potem wskazujemy ff stole wydobywa.

Desault wprowadza ff fistula do kieszki złotnika na mi
nasuwa rurki, a wykawory pniej złotnika, wewnątrz
druć, które go konie na paśmie skierować. Dofish
długich. Dofish: gdzie nie można ona potem skierować
podaje Desault kleszcz i róbek rozciągający (Reparatur)
może którego druć przeprowadzony innymi kieszki.

Recher wykawory trudem natężenia drutem napro
stym nędzy ramionami kleszcz, lub wprowadzania drut
narówek, wprowadza chrone ff fistula do kieszki do
słony zmusz jest przywierdony, a kieszki wydobywa
konie słony enernami lub kleszcz ten kieszki. Dofish
nie że enerny konie słony wprowadza jest nylat,
wydobywane kleszcz kieszki niedobry, bo chrone
dofish tylko wewnątrz można do kieszki, ile ten m
kieszki niedobry, jeśli chrone nie przysięga, niedo
że wewnątrz bo cie opora o ścianę kieszki, gdy
przysięga patrzeć się i nie wychodzi.

Wiedemann podał narzędzie nazywa Desault
do podwiązania fistul długich, podał: Schögers
swoją aparat

Podwiązanie fistuły ślepej. Najprostszym jest sposób
Hipokratesa, który ścianę kieszki smieja kleszcz konie
złotnika z ustnikiem na zewnątrz palowici. Desault
smieja trójramiennym na drucianym iłotkowi o ff
rurki, drut stwardny wprowadza.

Normata op

3. 17
Normalna operacja przy fistule dośkonalej

z boku lewego.

1. Zakres. Operator wprowadza tę fistulę do kierunku rurki
namaszczonej oliwą ze złotobutkiem, wsuwa palec wskazujący
do kierunku dla przekonania się o położeniu rurki do
środku kierunku, potem cofa palec, a drugim ręką kwadrans
kierunku, wprowadza do kierunku klaszorę bez istotki,
tak irby się klaszorę dotykają starko ciężu fistule
wych, klaszorę ujmuję zakonice rurki w kierunku wych
ją, a ponownie wyciąga ponow złotobutek i wsuwa
znowa opatrzoną radziogiem ci do kierunku o tytu, irby
w nioj na 2 cały wystata, jeżeli nie znowa oparta o
środek kierunku, otrzymać ci z porównaniem, ci koniec
ten przeistnie, po raz dalej znowa, wsuwać, wtedy
sarce ci nie przeistnie znowa w całym biegu fistule
co z rurki przechodzi.

2. Zakres. Potem operator ci klaszorę dotykając ci koniec
ci rurki, oddali ten środek przobiegły fistule, o tytu irby
klaszorę opatrzoną koniec rurki irby tylko sama znowa,
klaszorę raniejszą ranioną klaszorę stale u ujmuję.
Jeżeli rurka na nadto w kierunku wystawia, wyodróżnia
ją odrębnie i zwatka, raniejszą w kierunku klaszorę,
irby ci znowa z ponowidły ranion nie wyniknie.
Przekonany ci ponaganiem znowa, re jest irby,
rurka a fistule ci wyodróżnia a następnie klaszorę
w znowa wyodróżnia ci klaszorę.

3. Zakres. Do konca zewnętrznego radzioga u kończącego
prunek, jedwabny, mojem okazaniem u starku
po ciągają ci z znowa z znowa starko wystawia
a razem wyodróżnia ci znowa radziog przy koncu
ci przechodzący wyodróżnia ci prunek tytu, aby obu

Konie były równy długości, jeden koniec przesuwali
i jeden otwór rurki przestawiali, drugi z otworu jej pro-
stęgi, i tak i te końce rurki wewnątrz przegrzewali, po-
tem waga i te końce były, że lekarz pamięta
wywodzić narzekanie na fistulę bez bólu, ponieważ wewnątrz
rurki nie widać, rurki rozgrzewano i w końcu po-
dymano, i wzdrygiem na rure. Pamiotanie pamiętano
może być ryzykowne lub niebezpieczne odprawa-
nia, i słabe przedsięwzięcie i działanie rano.

Oprawy ze strony prawej. wzięci raki na odwrot.

Odmiany operowania. Zamiast strony moim
wzięci sprężyny zegarkowej, wsuwając do rurki koniec
jej głowicy i obracając ją, przestawiając ku otworowi ot-
woru, rurkę nie wprost z fistuły wydobyc, ale
sprężyną z rurki wyjąć, a sprężynę w jej uszku
zwardzonym włożyć i się wyjąć.

Postępowanie przy fistule Recto vaginalis

Skierowanie do kierunku kan. fistulowego; odpowiadania wra-
żonego otworu w kierunku otworu wprost, wprowadza-
nie rurki lub zgłębienie rurki ze zgłębieniem przodu
kierunki odchodowej, z której wydobyc dalsze wskazywanie
kierunkami bez błędów, a to wprowadzając stronę z
rurki lub sprężyny, działając sprężyną lub sznurkiem.

Przy fistule na wewnętrznej stronie nado.

Operacja wprowadzająca rurkę ze zgłębieniem do fistuły du-
żej, lewej, obrócić koniec ku stronie, a jeśli dwa fistuły palem
dotrzeć można, wprowadzić palec wskazujący prawej do
kierunku dla penetracji i te, że koniec rurki w tym ot-
worze, którego odległość przemiennie słychać wyjątko, a
lewej rurki w tym kierunku, wydobyc z niej zgłębienie

i rnorodny woliwie wprowadza do niej Zgraniec aż na
3 linie Stęgle od ujęcia rąkownicy się z Zgraniem, potem
wprowadza rąkta prawa na Kleszcz, tak żeby koniec palca
wskazującego spoczywał na głowie sprężyny łożka, a ra-
miona ich nieco były od siebie oddalone, a łożka rurek
do rurki był obrocony, aby koniec jego wyżej nad ru-
rka na całe sięgał. Wtem operator, taki Kleszcz naprowa-
dza żeby wyprzedził samą Kleszcz stanął koniec rurki
której nawiśnie się na łożek Stęgle, żeby nieco od Kles-
szy odstawiał. Ustaliwszy oba te nawiśnie w wzajemnym
stosunku, wsuwa się palec wskaz. i średni w pierścieniu
rurki, palec prętykowy do rurki Zgrania, przebiega ścianę
kieszki, a Zgraniec stanął na na łożku między ramio-
nami Kleszcy, nawiśnie na łożek, aby ramiona Kles-
szy na 5-7 linii oddalił. Wtem tego operator nawiśnie
łożkiem i Kleszczami na Zgraniec, palec pomocnikowi
nawiśnie na głowie Zgrania, a sam rurka wsuwa
między ramionami Kleszcy i opiera na łożku. W razie udę-
cia stanowiska rurki między ramionami Kleszcy, całe
działanie przebiega powtórnie, potem ruszając głowka
sprężyny łożka palcem wskazującym, łożek odpada od
Kleszcy i wydobywa się z kieszki, wtem wsuwa się rurka
więcej w kieszki i ujmując Kleszczami, do rurki wsuwa się
skłona lub sprężyna i z jej wydobyciem położyć się jak
wyżej.

Wyciącie ściany fistulowej (Excisio)

Niekiedy chca, najdowolniejszą tego postępowania
w Celia, lecz wypracniej opisał Leonidas w 3. wieku: należy
zasadzić się korda fistula ma ścianę stwardniałą. Leonidas
zasadzić ścianę wycinać: w tym celu głębokość blaskownicy
głębokości na 7-8 cali Stęgle przeprowadza się fistula do kieszki,
wsuwając go do ręki, palcem wskazującym, sposobem ha-
ka ujmując się głębokość gębki i wprowadza ręką do
do łożka

p. stola, tak zglebitu jest raz, jak strzyż, a mój
oba końce wstępu wolne posiadają, wreszcie sianu ujęta
miedzy otworami wycina się. Cheselden wprowadza jedno
ramię kleszczy pod skórę do kieszki odchodowej, drugie wprowadza
po fistule aż do kieszki, zakładając kleszcze polipowe w ramie
ujmując niemi sznurek fistuły i wycina ją.

Przedsięwzięcie pod czas operacji:

1. Operator może chybić i nie trafić na punkt najwyższy przy
fistule na wewnętrznej stronie.
2. Fib: może być doskonała a operator nie trafiwszy na otwór wewnętrzny
bedzie ją bierzył jako ścieg na wewnętrznej.
3. Po przebitiu kieszki zgraniem może surka nie wstąpić do jamy
kieszki choć się zdawało że weszła.
4. Surka może się cofnąć i jamy kieszki wstąpić, gdy się zgranie wycofa.
5. W kieszce może nastąpić taki gwałtowny kurcz, iż w kieszce
kiedy kieszka przebito i surka ma wstąpić do jamy kieszki
wej fistule nie może odebrać od kleszczy, ani narażać
nie może być wprowadzone tak wyprokta, jak się wyry niektóre
w takim razie, uwaga, śmierć może, i inne postępowanie
powtórzenie czynności są środkami paraderemii.

Przedsięwzięcie po operacji: Odryć na sznurku i d. szurka
mają - zasilny, lub w skutku panowania może powstać
gwałtowne zapalenie, wywołując gangrenę, mogą się wsta-
wić bóle niemożliwe, szereg innych objawów szurka; może nastą-
pić biegunka; lub fistula wroci, lub trwać ciagle, mianowicie
sygnus otwora wewnętrznej, a szurka pominąć otwór
wewnętrzny: fistuły.

Leżenie następnie. Pierwsie wykonanie operacji wykonanie
było przylgiwym bólem, szurka zadać Opłat, wprawdzie
szurka po operacji raku spokojności najszlępszy, potem
dzwoni niektóre raki przy ratowaniu niebezpieczeństwa
cierpieć leżenie. - Dieta procrastu porzuciona, jętyma po-
tem lekkie mięsa. pamiętać aby szurka co dzień oddał stół
wody, a w razie ratowania szurka.

A 3-4 dzień smutek lub drut moiniej pamięci, okolicie
tylko niepięta i obumyśai: lecz przy pamięciach nie wi-
dzą być ma nanięty tylko aby dory mian dani ma-
tego przywrócić.

Tak postępuje się 2-3-8 tygodni, dopóki smutek i
drut nie pominie wreszcie mian tylko w niem obliczają.
Jeżeli by się pamięci epistolego po ilotii dani mian tylko
obliczają i pamięci smutek i drut w 5-8 tyg: nastę-
pi, wtedy w 3 tyg: nowy smutek, pamięci, przywró-
cić go do dawnego. W końcu jeżeli smutek wisi na
materii pamięci i dory, pamięci go. Różniczenie pamięci
i dory pamięciem kam: pamięci. Na male pamięci
nie smutek, pamięci by pamięci mian, pamięci ro-
pamięci i dory. Ich by bōt po operacji najwiecej jest
pamięci dory i smutek, wici w pamięci mian je
pamięci, mian: przy dory. Wici wici mian
pamięci i dory, pamięci, pamięci pamięci i dory
drut. W pamięci i dory przy wici mian pamięci
i dory i dory pamięci.

Operatio ad Atresiam ani et ad anum arti-
ficialem

Przez diatamę to rozumieć należy postępowanie, mian, któ-
rego otwór stolowy normalny, ale po nad to pamięci,
lub otwór karoty przychodzi rozszerzać, lub nowy otwór
otwór robić, lub kiedy ani pierwsze ani drugie mian
mian mian, w mian mian na powiększenie bry-
cha mian otwór otwór.

Czynności główne

- 1° Rozszerzenie otworu stolowego rozszerzenie, lub otworzenie stolowego
stęps.
- 2° Wzrostanie otworu w pamięci, w pamięci, pamięci
wici i dory brycha, otworzenie karki, aby mian otwór
stolowy opasanie.

Wiskazania

1. Tak ciąsny otwór płaci: iż odchody kłiszkowe nie mogą być poradmi oddawane; do rozszerzenia którego żadne środki nie pomagają.
2. Rupture narosnięcie stoła bez żadnego otworu.
3. Narosnięcie stoła, lecz potasone z kanałem uchodzącym do miejsca nieprzyzwoitego, jak: do jamy brzusznej, lub z otworem w ścianach brzucha, lub ujęcie do innego organu up: do piersi, do kanału wypróżniającego u mężczyzn, do pochwy, lub do pętl: maci: u kobiet.

Nie ma zakazów prosić etatów przy których jedna
umiera, nie idź lepiej nie da.

Jeżeli na niezmiernie normalnem wzroście kirszki, nie
można, przynajmniej na bruchu zrobić stołu szkieletu.
np. kiedy jest zarosty stołu, kirszka prosta zarostu pro-
sto na 2 cale wyproko; lub gdzie kirszka odchodziła tak,
jest niebezpieczna, że o zabiciu stołu ani pomyśleć
nie można. Operacya ta mając wzgląd na organy i na
sposób działania wzmianczony lub tylko na wzroście
kirszki lub na otworzenie błony która rąkowała otwór
stołu: nie jest niebezpieczna. Lecz gdzie kirszka jest wyproko
zarostu, gdzie błona jest gruba, lub jeśli reszta kirszki
odchodowej same się robi, prosta, jest kirszka kirszki
odch.: pamienny, jeśli am śladu ma stołu, jeśli kirszka
odch.: wyproko koniecy się wrokiem grubym, słupem, gdzie
nawet same brzośna z inną kirszką przysiędły otwierac;
wtedy maćmy stopień niebezpieczeństwa łowamy, bo
można inny organ składowy jak się pamienny, i
kirszki wzięte do wzmianki otworu stołu są obciążanymi,
wzbudzając, odwracając do niebezpieczny.

12 Drugie szlony przymuś na niedzielną potrzebę nam
tu odchołowego, a widząc że p. te opier: Dobrego prościu mian
funkcyj, p. nalerz p. nalerz stopień konjuri — lew wypadk
miej

nie rawsze sa poradzana, bo rawsom niekiedy bywatake
 (nieistota), i z jamy jej druzgnac niemozna: a choiby
 druzgnieto kanat p rawsie azu wysoke i dany, ni da
 sie utrzymac stworom p wodki rozszerzajace: i choi sie
 rozszerzy na nowo nie wzepa dzinotnia natury, lub
 ruiem memore rozszerzad.

Gdzie przyjdzie otwozy bruch, Cocum, lub Colon
 descendens; tym sposobem ustanowic stola szlucny, lub
 gdzie przychodzi ustanowic komunikacya miedzy kiszka
 odhodowa i prehenem, aby z kiszki odchody pniekaly
 sie do prehenia, stedy wortki operacyi okazyje sie b. mala,
 bo choiby szerszina operowane, indiwiduum porostanie
 witane udrugny, do bezcennego odstypu p stonki lub
 pndem brucha.

Operacya ta u dzieci orada rzuc, jeeli wiej skutku ra-
 paleni nieboga. Jeeli nie oradzijsz tak szuga z opera-
 cyi, i odchody zatrzymane w kiszce, wrubdzaj wiej
 rapalenie lub spazalirowanie, operacya ta pomyslana byje
 memore. Kwytke te stany na okazyja po 4. tygodniach
 wiei w 2-3 dniach pierwszych moria operowac pomyslne,
 gdzie nowonarodzony parciem witygiem odda meconium
 oradza miejsce dla otworu. Gdzie kiszka wchodzi do po-
 chwy lub kanatu wpy: tam operacya na dalszy czas, na-
 wet do 4. miesicy odstojc moria.

Przyrzad obecnyc:

Nor prosty, wartki z kolem, drugi z glowka, trzeci wypu-
 kty najgwiez najgrubszy i pharyngolom, zglebnik rowko-
 wy gielki, zglebnik do kamienia rowkiem, i gta z nitka
 duka, laska wathow grubych skubanki 2. Stuzich, rozpek
 z gumny przysilek, perki skubanki, partki Stuzie lplie
 kompres dielny, opaska I; opaska bruchowa. Pomo-
 cnikow oradem 2 oradem 3, zlyts jeden utrzymuje dziecie
 za gorne raziu ud; za biodra, jeeli jest subiekt do opera-
 cyi.

cy pniernarony doroty, wtedy dwóch użyjemy odnóg
dolne, tak, jak przy kłopotu, tniei pomaga operatorem
Pomocnik mający sobie powierzona używanie drzewa
cia ma najprzód stonę rąk kładąc otwór stolowy,
ma uważać żeby miejsca tego skóry, w którym ma
pniebić nastąpić nie usuwać, za nadto, żeby otwór
zwężony mógł odpowiedzieć ci podługny kłótki
prostej.

Działanie czyli sama operacja stowomni do ramienia.

1^o Przy wzrośnięciu ujęcia stolowego wprowadza
pęsetkę równową po uciśnięciu otwór stoli: potem wia
wa się do otworu stoli: noż pęsetką i pniecia się wko
punktu najkorzystniejszym.

Michaelis przed wzrośnięciem powyżej ujęcia rozciąga
się nożem pośrodku w dół skóry.

Crasem otwór stoli: j. wzrośnięty, stał się rozciągnięty i był
kół wtedy rozciągnięty i używanie w oddaleniu p
agasty j. dostateczne.

2^o Gdy otwór stoli: błona narosła. Ponieważ pęsetka
przydrożony punkt wskazuje miejsce, w którym ujęcia stolowe
ma się znajdować, lekarz obiera ten punkt do otworzenia.
Lecz gdy w nadostatku skórki niema śladu miejsca tego
wtedy albo widać rąk rąk, które wypięziona, wko
rej rui się daje pniekanie po meconium, lub pojedz po
pneudankiem znajomości anatomicznych i skony
gdzie się będzie rąkawa. Pomnie iż ujęcia stoli w
nowonarodzonych nie leży tak blisko części rui się daje
cy koiu ogonowej, bo zwykle jej koniec będzie smutka
nie tak da się namacać, obrać więc należy miejsce i na
ist odległe od części rui się daje cy koiu ogonowej.

Spis treści. Lekarz wbił noż prosto w miejsce oznac
ne p. błonę otwór rąk rąk, potem wprowadza pęset
kę równową a potem noż pęsetką, który rozciąga
się błonę

że bliżej na kinyjsie aż do miejsca, dokąd mur się zdaje się
bezwzględnie pnieć morze. Istnieje wyjątki od tego, należy aby
się nie myliły. Lecz jest już sadzić aby iście nobili Koliste.

Sposób 2. W miejscu oznaczonym. Pnieć się zgranicem, a
wprowadzić w niego głowikowy, rozszerzyć kanał pnie-
ciem nobili, nagle bowiem otwór po zgranicu nobili
bywa zamknięty. Wzrostemienia godna operacja Dremsona
dwóch grubych ścian pnieć się, pierwsza na całość
ujęcia stołowego, druga takież na całość od pierwszej, które
rozciągnąć nożem wprowadzonym po ścianie wskazywamy.

3^o Przy znajdującym się ujściu stołowym leż
prowadzającym po kanał szerególny do worka śle-
pego, utworzonego po kieszce odchodowej,

Leżać jeśli morze ścian wskazywamy pnieć się po kanał, aż do tego
worka, iżymien to użyciu, jeśli zaś nie, wtedy wrzucić zgłębnik
całkowity tak po ścian, po zgłębniku wprowadzić noż po
ich warstwie, rozciągnąć typy worki, w których pnieć się, o-
twor ten wskazywać się nożem głowikowym, jeśli zaś
nie, wtedy iż takowej celu dojdzie zgranicem lub pharyngo-
tomem użycie ich. Pomimo małej operacji na kieszce
nie użycia rąk kieszki kinyjskiej, nie na inny kieszunek,
aby wskazywać ścian pnieć się kieszki odch: iżymien.

4^o Operacja przy stanie zarostłym kieszki odch:
bardzo wysoko znajdującym się.

Stan ten bywa różny, gdzie miejsca zarostłe, morze bywa
między punktami gdzie się ma znajdować otwór stołowy
i jama kieszki prowadzić, lub na $\frac{1}{2}$ -1-2 i + całość wyżej.
Ponieważ ten otwór nadto a priori da się oznaczyć, pnieć
się operacja ma posiadać odwagę, ostrożność i symetrię ana-
tomiczną. Poprzednio wyznaczyć się pnieć i kieszek
winn

w nim się roztanie, jako i karawnik biega urocznie i psichera, których uinikać w czasie użycia, potem wędzie się nożem prostym kolarystym lub zgraniem lub pharyngotomem, po niejże rozciąć do worka słętego. Jeżeli tekaniowi przyjdzie na $\frac{1}{2}$ cala nożem rozciąć, wtedy wprowadzić w ranę palec wskazujący, po nim wrzucić noż bardzo szary nim co pnieć, niech dobre palcem wypłynie aby kłosa nie pnieć, dalsze rozciągnięcie otworu, lub po zgłębieniu nożem głowkowym albo po palcu wskazującym przed ucieraniem. Pomnieć na kierunku kłosa oddech: na bliku urocznie, psichera i pochwy, albo niech wprowadza nasadzić między kłosa, oddech: i osłaniam, prawosze wyżej, jak na d. cala jest bezstraszne i ciele.

5^o W czasie gdy kłosa prosta uchodzi do pochwy.
Lekarz, mając starą wprowadzić zgłębienie rowkowy po pochwie do kłosa oddech: podnieść ten zgłębienie do pionu, i tak kłosa pomocnikowi utrzymać - a równocześnie i ledwie palcem wskazującym po niejże rozciąć czy niedostignie zgłębienia, co jeżeli się uda, pnieć się ośku, którym i otwór głosi: rozciąć nożem, tu rowkowi zgłębienia, lub zgraniem. Jeżeliby nie mógł ośki po ośku niżej stanowiska zgłębienia postąpić, jak w czasie poprzedzającym.

6^o W czasie gdzie ujęcie kłosa oddech: ma miejsce do kanału wrynowego u mierzycy.

Jeżeliby nieustawiał się sposób postępowania poprzedzający, tj. gdzie wewnątrz otworu otwór kanału prowadzi do worka słętego kłosa, na brzości się użycie. Wtedy wprowadza się do uchwyty pnieć do kamienia, i po nim się pnieć nożem wyprostym pnieć na pnieć choroby otworu w urocznie, prosto tu kłosa ogonowej, i na pnieć, tego użycia stara się rozciąć, niebłogo otwór w kanale wrynowym będący, lecz pnieć się z rany kłosa ze strony otworu słętego.

wego. Naanai sam pchero miednau, gdyz more powsta
kwaszara p cete rzye pirtuta uynnow-stolowa.

Nada Mastina ied w miedrykrota po rgtibniku rowko-
wym do urebty wprowadzonym i pakorywidnym pncici ry-
je pchena i mala czei urebty, dla robienia stola siku-
rnego. Pelik nawet i wtenas pchena pncici ryj p-
chena w miedrykrota, wtedy stola w takowym miedru
do pchena ied otwieria, ktorego rgtibnikiem wyledpi
memorna albo lekarz usiluje p choroby otwor w urebte
wprowadzi rgtibnik do kistki odchodowej, potem czei
wygniaz rgtibnika tak ustanawia iedy data uedni
p perincum, nastepnie sposobem ciecia na kamien
ale nie w kierunku ukosnym, lecz prostym tnie ku rowko-
wi rgtibnika p czei pokrywajace urebte i p zianie ki-
stki najblizsza otworu stoliowego. Ta stola tu pache-
dzi trudnosc je nadto udat nie more przeprowadzenie rgti-
bika p otwor urebty choroby dosanny kistki odchodowej.

7^o Gdy kistka wchodzi do pchena

Podobnie je postapi jak wyzej, gdzie Naanai prowadzit oso-
bny do worka slepego p kistki odch: utworzonego. Wtorkot-
wik sposob obrzezcia pramutai aby sfinkterem am'ne
pncici mysluie, bo mieniamy go nie budze morina
wshymai odchodow.

8^o Gdy radnau miara memorna w miejscow przy-
zwitekem robie otworu stoliowego, lecz shtamny.

To raleut pjanasy Litr a wykonat Daret i przyklad ten
byl i edyny dotad, ale niedawno Frir wykonat drugi i lu-
be Dziecie bytko do 5 tygodni bylo, jednak utworzona kistka
rosta nie piciuana bruszna. Otworzył on na cal naci
p pnia anterior a na 1 1/2 przednia in regionie iliaia
pinstwa, uciem 3 calowem fciang brzucha, p otwor ten
odkryt colon, urunat na bok i wialkay, i dwiema ziegami

utwierdzić kieszka w ramie rozciwszy ją podługnie na
2. cale. Albo też można operować tak wykonać:
Spineina się sadzi brucha w regionie iliaa sinistra,
cisiem 2 calowem, ½ otwór szuka się S. romanum pod
prowadza się pod niego nitka workowana, a potem rozcią-
ga wstawić, rozciąga wyprowadza do jamy brzusznej, i przy-
ramie przeciwniej, utrzymać się otwór przeciwy kieszki na
pomoc, nitka pod kieszka doprowadzonych, które się na-
siłami brzusznej utwierdza praskami lepkimi. Łatwiej
stać wargi ramy kieszki zadanej, chłystki się z wargami
ramy przeciwniej wsuwać brzusznej. — Pilloz otworzył ciałem
wokół iliaa dextra. Podług podania Calipena iść
wokół kędziowej łewej, ma się wtkierunku między rebrami
między ławami: i cięta ostro ilei, rozciąga przednim
brzegiem musci: quadrati ½ ramie ½ otworu Colon. Kępo-
między niewielu punktów Pringowi najpomysłniejszy
udało, pnieć on kłosek na 3 cale w boku łewym, 2 cale
nad a. 1. odległy od brzoła wosor: spina ant: ilei, pnieć
ukłonić do dołu na wewnętrzny spinać się na 3
ciężkie 2 cale odległe od lig: Puparta, ½ potem podobnie
ciem pnieć miedza aż do spinać, wtkorem robić
otwór mały, rozciąga go na 3 cale od kępostry Colon nad
S. romanum rozciąga go na 1 ½ cale dłużej: i 4 zięgami
reszta, brzoła, potany.

Operowanie

Ponieważ nieraz, nawet gdy się operacja uda par-
merium odchodzi, pnieć w otwór w ramie się watek klu-
banki, który utwierdzi się nitką, która jest obwinistą i
praskami lepkimi utwierdzi, szereg: raleca się wryje wate-
ków kędzi kieszka prosta uchodzi do pochwy lub do woty
i gdzie się operuje sposobem 1. 2. 3. 4. 5. 6. i 7. tam boiorem
gdra

gdzie się 8. operowało przyszyta się płatki ścielonyj me-
diusawrony w oliwie smażony na cześci samej; utrzyma-
ny go szorowana opaska. Cokolwiek się za nadto rozcią-
ło na zżanie brucha gotowy się jak rana prosta -

Ndaznienia w czasie operacji:


- 1^o Niespodziewane zmniejszenie wyroko w kierunku odchodzącej.
- 2^o Ułtywienie jamy kieszki prostej.
- 3^o Skaleczenie innych części.
- 4^o Silne krwawienie

Ndaznienia po operacji

- 1^o Bardzo gwałtowne zapalenie mianowicie rozowe.
- 2^o Zapalenie peritonai i kieszki
- 3^o Rozwinięcie stolca ciemnego, a także trudności oddawania odcho-
dów stolcowych.
- 4^o Ciężki odpytyw do przebrna lub posuchy.

Leżenie następnie

Nowonarodzonemu po operacji daje się mata z drewna zyr. Rhei;
Enemny wprowadzają do stolca, kilka razy dziennie odnowi się watek.
Podługlosy skłomion do rozwinięcia się skłonu wyję się o-
pois ex spongia pressa lub z kaubrukku. —



po
he
u
D

le
u
o
u
u
ta

ra
po
(

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,

9,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

Operatio ad Hydrocele

Pod działaniem tem obejmującym różne sposoby ~~pod~~ powstania napomocia, których Tunica vaginalis propria testis i funiculi spermatici, albo wogółnie obci okrywająca, ciałem wypuszczenia cieczy w wielk. rękawicych, tarcz. Dalej postępowanie lub nie.

Cel operacji nie tylko jest wypuszczenie wody, krwi, lecz zmniejszenie wroguenia sprawionego cięciem, i statek uderzenie, mocz, zmniejszenie organu chorobnie odosobinającego, na poprzedniemu wprowadzonego pojedynia błon wyprawiających. W 1. var. gdzie tylko woda się wypuszcza, jest Cura palliativa, w 2. var., gdzie się tarcz. błony wyprawiają, jest Cura radicalis.

Cura palliativa

Ustalenie się go stworzenie wartha prawidła jego wode raktywnem, tudzież stworzeniem opasaniem i zapobieganiem napaleniu.

Wskazania Hydrocele Tunica vag. propria testis, są:

1. Gdy ciecz nagromadzona staje się dla chorego uciążliwa
2. Jeżeli się nastąpił b. wielki
3. — chorego wielk. znacznie podwyższy
4. — ilość wody b. wielka
5. — jądro tak jest zmniejszone, że nie nad cętyrpaną, one go nie roztaje, na co jednak chorego nie kierować.
6. Jeżeli obok tego ogół organizmu jest zdrowy, nie p. operacya mogłaby się choroba ogólna pogorszyć lub nie. Stan ogół. organizmu mógł mieć st. wpływ na operacya. radykalna.
7. Jeżeli chorego nie chce się na jądrow operacyi statek kierować.
8. Jeżeli indywiduum jest dzieciną, już zmniejsza, mającemu.
9. — jest podjęcie nie radykalna operacya dla chorow. jądrow nie mogłaby b. zmniejszyć, for. pogorszenia jądrow.

10, Jeżeli poprzednio niemożna mieć pewnej diagnozy, o ile jest choroba, dopóki się woda nie wypuszcza.

11, Jeżeli taki rachunek choróbki między Hydrocele, kłosa i Starodrogi kłosa nie wolno jest radykalnie operować jeżeli worek kłosowy mały jest z jądrem.

12, Jeżeli Hydrocele jest wypadkiem Cysty.

K a k a z y Do tej operacji są:

1, Napalenie worka jądrowego.

2, Stan rozdęty jest w miejscu smecia

3, Gdyż taki mały jest wody, iż lekamy się skaleczeniem jądra.

Operacja ta jakkolwiek mała narażająca może stać niebezpieczna przy wielkiej obciążeniu organizmu, mianowicie worka jądrowego, iż samo jego naruszenie mogłoby przyczynić się do gangreny. Zresztą jeżeli indywidualnie jest potrzebne radykalnie usunąć wpyły na ogół.

Sposobów dziać się jest dwa:

1^o K a p o m o c a T r o j g r a n i c a

2^o — — — — — L a n c e t u.

Do tych dwóch można by dodać trzeci sposób wolnego spuszczenia i napomocą igły małej, rozpałonej, która pnie się do worka kłosowego i rozciąga go, jedwabnie, jak radzi Galen lub pnie się do kłosa jak radzi Dionisius.

Trojgranicem potrzeba się użyć wtedy, gdy ilość nagromadzonej cieczy jest d. narażająca, gdzie są Varices, gdzie stan choroby w worku jądrowym nie jest skomplikowany. — Przeciwnie Lancetum używa się gdzie ilość wody jest b. mała, gdzie jest wypłnięty kłosa obok Hydrocele, lub jądro zmniejszone, a to dlatego iż niebezpieczeństwo nie ma ad skaleczenia jądra. —

Przyraz

Przyrząd i działanie.

Cieńki kółka zgranie z rurką, lub Lamiel, z tylnik, nawiązuje do zbierania wody, wokolurek ot. imzdatowego, 4boimny kawałek płasku tylniego, podkładka unosić, worka jądrowego, pomocników dwóch do dorosłego, do dziecica ras trzech.

Choręgo usadza się na knieście tak aby tyłek wystawał o tyle, aby worki jądrowy wisiał za bieżącym kniestem, pod gniebist podkładka się tyłka podsuwa do nadania poręczy siedzącej na wpiótkerany, lub układa się poxiomo choręgo wótku. — Dziecie ras sadra się na łono pomocnika który ma rabiejszczai poruszanie dziecka.

Przed umieściem wybadai potorenie jadra, ponieważ morca procesu poprzedniego choroby, lub w skutku stanowi wiktajanył choroby, lub powodu noszenia suspensory moimno przyzgiżajnego, worki jądrowy, potorenie jadra more być odmienione, i more być tam, gdzie przypada przebijai — pnieko nim się przedwiecznie pniebie, wychodzi się palami miejsce jego potorenia, bo more być w każdej stronie — naley uwarai takie i na potorenie smurka nasiermego, mianowicie przy hydrowe radaumiatem.

Sposób działania trojgranicem — Wypuszczenie wody zgraniem radnit pierwszy Abulkasem tak: pomocnik przykłada rękę jedną na tylną płaszczynę, drugą na przednią worka jądrowego i naciska ciępy wewnątrz wantedo datu i ten podowu; potem operator kłoni przed choręym siedzącym, lub siedząc przed leżącym, lub stojąc jak mu jest najdogodniej, ujawni ręką prawą trojgranicem, tak aby palec wskazywał wypuszczenie nawiwa

był odległym na 6-10 linii od jej końca, a ostatek
nie grubości błon jest równa ale różna, tak że i ilość wody,
a potorywszy rękę swą, ława na dolnej i tylnej części
worka jądrowego, jakby rękę chwał robić podpórę,
wbija nieco utożnienie rękoty do góry spodu ku tyłowi,
a rękę przodem opór wywieramy sp. błony na przegranie,
przekona że ten wszech do jany i V akwonej, lub
leż niepotrzebując pomocnika operator użniży rękę
kwa ława rękoty worka jądrowego, tak iż palcem wle-
knie: wskaz: obejmując go rękoty w sposobie obracania
i teni palcami nawiąka wodę do dołu, i wiod tego
przebiecia sp. orem wygładza przegranie i wypołączenie
formuła na racjonalną rękę, i to w miarę aby woda
tej wody i zrogamnia się błon, bo nieposuwając rękę
tę mogłaby ławka waz: pr. leżka przesunąć się
rękoty i nastąpić wyłanie wody między błonę.
Wydobyciwszy rękę palcyka się oków napobiegają
wkręceniu powietrza do wnętrza worka jądrowego,
a kiedy koniec tyłko ma się wydobyć palcem wskazu-
jącym i wielkim rękoty lewej, i ińska się rękoty oków
na worka jądrowego, dla napobierania wydobyć się
błony wciśniętą na racjonalną.

Skarpa znajdująca we wszystkich wielkich Hydro-
ketalach i pnapiernia nacięcie ława rozproszone pnap-
tka na łokkach, nioło na pnapierci, a nianowicie ku
dołowi rękoty przegranie obijają odległe od dna, tj.
nieco więcej modka góra wodnego i watakielini
którały góra cały drucik na 2 potory. Jeżeli
rękoty nacięcia ławy na pnapierci, prawa operator
nacięciem palcy nacięcia jego na łokki, aby wale
mija

niejsze do przebiecia wyjsiat. W niejsze goza sie spo-
 szaga przebiecia Wemy przebiecia mineralny. Goza sie wiele
 wody, tam niewypuszcza sie wszystkie od razu, lecz ra-
 zy sie rurka kilka razy potem i wstymuje wy-
 wie takowej, szwiltowa, aby stony mogly sie skurzyć.
 innej wypuszcza nagle wszystkie wodę, narynia
 kapitanowa porobawione podpory, przynimaj, w siebie wie-
 le krwi nagrywajacej i piskajacej, a szed more sie ulowczy
 nowa skorba zwana stematocela (infiltrowa krwi do
 worka jądrowego). —

Jeżeli cewa, jest gruba i nie wypływa ze rurki, albo
 jest wlozonymi koinorkach, lub jeżeli szwiltowa składa sie
 z samych worków, wtedy nalerij pasarz przedewszyst-
 kiem radzalyby Aztem i niewydobyszy rurki
 znowy, owsem wzuwa sie w niej zgłębunk jądrowy
 aż do jamy stony pochowej, ze ten zgłębunk zsuwa
 sie rurka potem narowku zgłębunka wprowadza sie
 rózę prochy i wszystkie stony jądrowe skurajace przed-
 na sie na 2-3 cali wzdłuż.

Opasanie. Rana nakłuta pokrywaj sie plasterem
 lepkiem i podkładką, worki jądrowy wstymuje sie za-
 pomota suspensorium.

Sposób Dr. J. Lancetem. Przynadziwszy wszystkie
 jak do przebiecia zgranicem, operator wbił lancet, tak iż
 by bregi otwora staly do góry i do dołu, wniejszy jak
 przy hojgoinum cofa lancet i do runda wodzie odpływa,
 wtedy wypływanie pomoru podnosi worki jądrowy o-
 chaim, aby stony nie rozstaly otworu przebiecia
 innej woda wybie more, co gdyby nastąpiło zgł-
 ębunkiem pniełowa otworu problem. —

Jeżeli się znajdowała kista, warianu stannu tego, pocięta ostrożnie i dlatego woszu solnej smalcu, roztworu wodnego, robić się może na całą drogę w skórę, którym obnarywszy tunikam vaginalen, rozpruwamy anatem: i; nunię się takowa unosi do góry i; cięciem noży ręk: rozcią, lub postępuje tak, jak reworkiem kistowym.

Ładzenia wśród operacji mogą być:

- 1, Skłócenie jądra
- 2, ——— nacięć nieco warzejszych, mian: art: sperm:
- 3, Wstrzymanie się od tytu cięć.
- 4, Kłócenie wody między błonę worka jądrowego.

Ładzenia po operacji wydarzają się:

- 1, Zapalenie jądra lub worka jądrowego
- 2, Włóknienie się ropnia w worku jądrowym
- 3, Gangrena worka jądrowego
- 4, Gwałtowny ból
- 5, Silna gorączka,
- 6, Wzrost krwi — i; stąd Hematocele.

Leżenie następnie:

Po zapaleniu użyje się metody antyflozycznej: okładania wodą zimną, pijawki, środki rozluźniające piersi: palce. Jeżeli zapalenie jest skutkiem pęknięcia wody do skłócenia komórki nierówności, powstaje od tam pęknięcia rozszerza się ją, cięciem Nożem między pękniętego by woda najłatwiej wyciągana — podobnie w in: pęknięciu, gdzie zapalenie jeszcze nie nastąpiło. Leżenie między re: zapalenie rzec: w jądrze i; jego postacie, niej: skutkiem płynem wydzielonego p.ł.: postawowej wzmocnienie błon; wtedy można się poinekad spodnie: wać ubrania szatki, wicując leżenie takowego zapalenia

do zadanego celu.

Włwonony rozróżn rozróżnia się nozium.

Gangrena worka jądrowego wymaga usiętych okładek i odwaru odmiernego i oddalenia przynajmniej powodzi.

Przebieg bólowy i powrót krwi z powrotem usiętych okładek i odwaru usmierniającego, ludzkiego piżmaka, kapuły usięte, rada się orszadek i. Opio, enemu usmierniającego.

Gorączka zmniejsza się oddaleniem przynajmniej powodzi i. Rozróżn do jej stopnia, lewy się zmianami i. w. Kani.

Hematokle nakazuje wykonanie operacji radykalnej cięcia, które jest niej. dostateczne, bo sączenie się krwi z wewnątrz przynajmniej bł. podwójnej wymaga niekiedy usięcia tej błony.

Wstawienie rektalnego ark. spermatica wymaga podwiązania ony, okładek zimnych lodem, a jeśli w zimunku nasiennym jest jedno tylko takie kłus, wtedy lepiej od razu jądro.

Jeśli wskótke po operacji kłus się na nowo wwróci, jądrowy nabrzmienie wrastające do stopnia dawniejszego Hydrocele, przewożąc światłość morda i. w. wrastanie to jest Hematokle.

Powrót wody wymaga punkcji, lub usięcia statego. — Kreska operowany po operacji po 24-30 godzin powinien najd. zachować spokójności. —

Cura radicalis

Operacja radykalnej sa następujące sposoby:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 ^o Cięcie | 4 ^o Wrycie kłusku |
| 2 ^o Kastracja | 5 ^o Wstawienie wstki rektalnej |
| 3 ^o Wrycie rątki | 6 ^o Wrycie błony podwójnej |
| | 7 ^o Operacja ztorona i. cięcia i. wrycia kłusku. — |

Zpomiedzy tych wszystkich sposobów Ciepłe naj-
więcej sobie jedna ralety, ale sta tego:

1. Nie są one najpewniejszą celi morina dojrza: bo za-
stanawiając się nad istotą Hydrocele, nad warunkami jej
zstąpienia, nad mechanizmem operacji i skutkiem oraz do-
rę, niema nic aby się temu stwierdzeniu sprecyzowało.
Bo sposób dratowania celi, sposób odrygnięcia sa dwoma
warunkami niezbitymi dojrzewania do celu.

2. Zapomota, tyłko celi ranać się morina nie
zniewidzialnym stanem komplikacyjnym choroba upi-
Kole, Enterocele, Epyjlocele, Sarcocole — wyprawiać
morina celi, jeśli jest zbyt gruba, ranać się morina
błonie pochwową, ranać się morina ranać się tyła
tydy, zew: i wewn: bł. pochwową — a jeśli nawet ranać
dużo się Hydrocele tun: vag: fumieli spot matri, wypt-
czenie celi nętkawiej i temu ranać się.

3. Najbardziej Celem bery morina Haemahol,
Którą czasem patrzywać przybiera postać Hydrocele.

4. Operowany w przedziale 14 tygodni opuszcza more
tórko a w 5 tygodni być akronym.

5. Zapomota, celi ranać się i nagromadzeniu
rogu po innych sposobach wynikają, celi, a które na
nowo wymaga wycięcia morina.

6. Gorgierka bół, jako skutki operacji sa i niebyle
wielkie i przemijające.

7. Celem morina pod upodobania celi ranać się
nie uogólniać, ale jeśli opatrzenie pierwsze było
na nadto istne i odrygnięcia wielkie, drugie wci opatr-
nie wstąpić lub odjąć.

8. Zapalenie ani ra wielkie ani ra małe być nie może
ani ra też gangreny obawiać nie należy. — 9. Celem

9. Ciężem najdłuższe się jędo uam się niezmęda
 zaraz go wyjąć można.

10. Same ucie nie jest operacya trudna.

Przebieg wycia raskrykiania to można powiedzieć:

1. Tę po raskrykianiu ucieca na mało drżnia-
 ca, niemowna abrymał stopnia zapalenia pobudze-
 go do uciecia — wskutku zaś mownego raskrykiania,
 wyutka zapalenie na wielkie, miedze i sprowadzić mo-
 ra ekhodliwe następstwa, atego lkać się należy, bo
 mieniozna ornaczyć stopnia obratlowości chorego.

2. Jeżeli błona pochwową jędo jest gruba, ści-
 rowata, nataka błona raskrykianiu przykajnie nie
 ma wptywu, wyposzy zaś grubej, narazie się na
 niebezpieczeństwo jędo zdrowe, atem bardziej jeżeli
 jest skorzone.

3. Przy wszelkim stanie skomplikowania choroby
 a mianowicie przy skrowatości jędo, raskrykianie mo-
 że zmniejszyć skutki sprowadzić.

4. Gdyż się byda bydy, tam raskrykianie nie tylko
 nie staje bezskutecznem, ale nawet wiele nie jest do
 wycia — a byda bydy b. cześć się zdarzają.

5. Jeżeli jest hydrocele tylko w warunku nasienym
 lub rarem zabrzmieniem wodnem in tunica vaginali-
 propria testis, wtedy raskr. jest bezskutecznem.

Atak to przynajmniej należy raskrykianiu po adre-
 ci a miedziom jest raskr. zoi pierwszy, i bezpe-
 cny, a nawet i a dorostych pod tymi warunkami,
 gdzie hydrocele j. ciwore i miedze, gdzie bł. pochwową j. ciw-
 ka, gdzie nie ma stanu skomplikowanego i jędo nie
 jest punktowane — lecz atak stanach nie może być
 kary a priori dowiedzieć.

Przeciw rawłoci to można powstrzymać:

1. Tr. być same niedogodności jej towarzyszą co i przy raskach kamii aż do 5° stanu.
 2. Przy rawłoci często się zdarza Rozpiera.
 3. że rawłoka może doprowadzić, w jednorazowym stopniu, do śmierci, a to czy ponadto, czy na stałe.
 4. Nie oszczędza stanu powstania choroby jądra, które niebezpiecznie może na jądło wytywać.
 5. Wzbudza silne i ciągłe bóle, leżące ponadto długo trwa; w końcu przynosi do usunięcia innych środków.
- Na konyrce rawłoki nie powstrzymać nie można.

Przeciw usunięciu środka trawicznego to:

1. że to ma niedogodności jak raskach kamii.
2. że jest b. męczące, długo trwa, bo kastyka przychodzi czasem 3-4 razy przykładać.
3. że często po usunięciu kastyki, zapalenie gołębka i ból dochodzą do stopnia zagrożenia życia.
4. że przy wielkimi hydroch doprowadza do jednego skutku, chyba że poprzednio punkcja była wykonana.
5. że śmiertelność środka trawicznego jest różna, więc nie pewne i lekarni skutkiem składać nie może. —

Tedyż stan w którymby usunięcie kastyki jest kiedyś szkodliwym dla niej.

Co do wyjęcia błony pochławczej. Operacja ta należy do najboleśniejszych i najwęższych obciążających: a nie jest samo cięcie ucięcia aby może było nieprawdopodobnie i równie pewne jak przez wyjęcie, punktu w którym byłoby szkodliwym dla niej do wyjęcia.

1. Gdy bł. pochławcza jest twarda, prawie chrząstkowata i podobna kurortliwemu.
2. Gdy po punkcji prawie nieważenie.
3. Gdy Hydroch ogromne.
4. Gdy b. często punkcja przedsiębiora.
5. Gdy

5. Gdzie worki w hydrocele istnia funiculi jest b. twarde, lewo owego moria dotyka, ale wywierca tylko cieżę je dny narzyna które wody powstato.

Sposob 7. wystawca okrem do osiągnięcia celu, leu nierazka tej pewności jak cięcie.

Najmedońszysze jest wzięwanie wathy je Tedena nalecane.

Teraz mowić będzie w szeregach o kardym
1. 7. wymienionych sposobów operacji radykalnej, po-
następem wyje wymienionych, a najpóź:

1.^o Cięcie

Główniejsze ratunki tej operacji są:

1. Przecięcie ogólny powłok b. pochłowej jądra, i niem po-
sternem.

2. Wypuszczenie wody.

3. Rozcięcie stanowi komplikacyonow choroba

4. Takowe opalenie pąsowidła którego b. pochłowa je-
dra tak zapalona zostaje, je je to zapalenie albo wprost
organiczne pojednanie tej błony jądra od białej naski-
pije, albo je drugie rozcięcie jądra i je, stajnia, albo ter-
je rozcięcie i granularna tak w b. jak w powłokach i je-
dra czynności sekrecyj na prawe i lewe, zostaje
albo je charakterowe zmniejszenie, lub charakterowe powiększenie
b. pochłowej jądra lub je zupełne powiększenie obu
organów.

5. Stosowane leczenie narkotyczne.

Ponieważ zapalenie jest nieodpowiednym warunkiem
tego leczenia, niech pnie i by i je nie powieć w o-
kresianiu, nieba niei wgląd niebyłoby na zapalenie ex-
tensive i willie, ale i by stowione było quo ad inten-
sitate, i by miało miejsce w całej przestrzeni błony
pochłowej, i w niej, jeżeli tylko uznawo nastąpi, można
by pewnym je Hydrocele wia. Jeżeli zapalenie będzie ka-
stabe niejednolite w okresie ani oddziaływa narzyna ka-

wniesityby wstan paralityczny z przetyczeniem krwi
w naczyniach kapilarnych, stad sta mogacego nastąpić
gwałtownego wypocenia krwi z kłosa błon, sta tchaw
następniej gangreny, lub ze rozstępowaniem szwami
błony, nie mogłyby się odbyć na potrzebę stojąca napra-
wienia, jeno lepiej jest ciwam paliatywnem pośredniem
średziwianem, a potem jeżeli wazne drugie do potowny kłosa
wody się nagromadzi średziwianem ciwam radykalnem.

Przyrzad do operacji Ciemnej, jest:

Nosi proste, rzeźbionik równowagi porządek prosty. Kupera, kleszczyki anatomiczne, narzędzia do podwijania siły, gąbki, woda zimna, płatek płótna cienki, wrywany do 5 cali głębi do 4. szerokości, którego brzeg jest po nacięciu, walców skubanki do 100 nieograniczone do 20-30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6810, 6820, 6830, 68

Chorego ułożono na porucio, przy pomocy brzojterki, nadając mu podporucio, w którymby zstawa; był po-
dnieziony, pod tyłek wstaje pod torę, na worku jędrzym
wstaje ugnęci, rze porucio suspenzorii patrzy się
do kła nieduży, ptaki mają worki masie pakta
się nabruch.

Diatamia pum hydrotheca Annica vaginata p. testis.

1. Oryginal. Na prostku, gdzie utworzy się fakta, popa-
rnia. Ktoś ma nawrócić, a jakby było, że drugi ma
nieznie, komu jeden fakt, powstaje się pomocnik.
wi, drugi, utwórmy tam operator, powiem, przecież się
jedynym powołaniem uora, że fakt, wiod całego fomo-
auk, saka, wolna podnosi, worki jedynym, drugi, niezna-
ma

ma wyrown^{ie} z resztą Stugosiu gura. Terliby po pnie-
in falty ciuie melbyto. dostateknie wielkie, pnie-
je do góry lub do dołu morem.

2. Czymon Odtoniwszy kumiam oaginalem propriadym, pa-
ciu wskazygany lewyj, strukia sie nijsa, gdzie plachkane
jest najwyprawniejse, ochotnie wtem miejscu pniebija sie
morem, a cofnawszy noz, albo sie pniestawia koniec pal-
ca wskazyguzgo lewego na stwor pniebity, w stwor
wprowadza sie rglubnik rownkowy spiesznie, nim woda
odptynie do dołu, jestli stwor a góry byt robiony, a do
góry jestli byt wisko robiony, a napremian i do góry,
do dołu jestli stwor jest na wodzie, lub niegotowity
rglubnika, jestli stwor jest oboreny, razars po nora
rozsuwa sie pnie wskazi do jamy kum: waz: przegnie kochi,
i nijsahto stwor sie nim pamyka. Teraz wprowadzi sie
po rowka rglubnika noz lub norypiki, jedno samie
i rownia sie bl: poskurawa, ar: ciuie bedzie miato.
Stugosiu 2: 2^{ie} rata, ku dołowi ciuie w bl: poskurawy
ma byt krotkie na kiltka linij do nijsa kadane,
kumia darto. Jersie ciuie byto robione wielkie,
lub mniejsze, i wtedy wydany sie more i jadro wy-
jadnie, i zstabeł ptoicenny i watti skubantki z dna, do
klatgo byty wepekane, wypunaz sie na wierski, jestli
ciuie byto pamate, kndro pnyjdrze iaty apparat na
jadro patorij, i mozas sie kwony składy rozpy, na
upuszczenie ktorzych pnieba wiji nora.

Terliby po pniegum art: Linstakid eksma krowawita
podwiarai jao natory, aby pnyobiedr: krowawiceni
nastepneum.

Terliby operator dwarzat sie robu operanyas ciuie
w hypoteke padowinistum, stedy ma miat z otworinok
orly ciuie sito p sam model, a to irby unikat skla-
tenuma

leżenie smutka nasiennego, przebiecie bł. pochwowej jak
najbardziej przedzielną, i jeżeli nie wzbiana blisko dna
przebie. Gdyż zaś hydroele jest mato tam niedaleko
leżący bł. pochwowej w górnej części, aby niekiedy
smutka nasiennego, gdyż się znajduje cząstki pro-
stokątne jadra bł. pochwowej na podnie Hydrotele, tam
obok tego prostokąta części prowadzić trzeba.

Przy użyciu awarii: na hydrody leżą między tuni-
dactos i vagina communis, albo między vag. com. i tuni-
pr. testis. Aby się urodawato czasem przebiegać worek
wodnika, i w końcu do tunia propria, wtedy stan
wzrostu nowonarodzonego, użyciu się hydrody galami, lub
dręgiem. Wagina nowonarodzonego lub uroju, po użyciu
pręgiem do przebiecia tuni. vag. propria; lub, tam gdzie
byłko same wodniki przedstawiać obraz Hydrotele, po ich
użyciu, nie narodzić bł. pochwowej jadra, jeżeli
wodniki były na samym jądze prociemnie.

Gdyż bł. poch. i. twarde i grubiejsze, lub użyciu się niekiedy
jaka, wtedy użyciu części dręgiem, wagina użyciu
użyciu lub uroju. Gdyż użyciu po użyciu pokazuje się wżo-
nie i. Hydrotele jest tak wiele, tam namowić chorego do
użyciu jadra i użyciu ją przedstawiać.

Gdyż Hydrotele było potężne i kuta, użyciu się użyciu
do opalenia, użyciu części do kuty użyciu i użyciu
użyciu je wżyciu brzusnej, a do użyciu operacji lub
jeżeli kuta jest użyciu tam przedstawiać Hydrotele,
a jeżeli okoliczności pozwolą potem do użyciu operacji
Hydrotele. Bywa czasem je wżyciu kuty, lub
wżyciu wżyciu kuty i w bł. poch. jadra, wtedy i pos-
wżyciu i druga przebiega wypadła, wtedy pręgiem
użyciu. —

Opatrzenie. Pomocnik ujmie za oba końce samy b.
pochwowej jadra w umiarkowanym palaniu wiskar: nabatki palny-
wionym: naj-sięcej cokolwiek między palcami unosi do góry
operator pnyktadą płatek płotna cienkiego wypranego, rma-
samu woli: mgi: nabiega rozistej bł. poch.: wruwa rąpomi-
ca topalewki lepiej po obu bokach jadra, między jądrem: bł.
poch.: tak głęboko żeby dotykał się tylniej pł. bł. pochowej
obracając prawe do kłosa jądrowo, połem równie kasunie
płatek ten wpatrzy boćnie u góry i u dołu, połem praw-
nie biega płatek na równość obierając niemi biega sam
bł. poch.: tak mając obwinie jądrowo wprost białe
między jądrem i bł. poch.: wruwa wathki skub.: wathki: ma-
crane rąpomi: sroży: rąpomi: a wyjętym wry: moini do-
kiermie rąpomi biega płatek na wathki, na to pnyktadą
płatek przestawia skubanki i parkami leps: sięgając wath-
samu lun: darto, dla rąpomi: wypranieniu jądrowo
na to kładowie się podkłada, która z obrymą umiarkowa
Morina: tak postąpić w rąpomi: płatek: pnykto-
dacie owalaj płatek płotny, takiej wathki, żeby o-
mgi: jądrowo dobać: wathki: biega sam bł. poch.
biega, jego rąpomi: kładowie rąpomi: rąpomi: rąpomi:
kładowie do kłosa jądrowo, a: do tylniej śiany bł. poch.: tak żeby do-
doty do jądrowo grze: rąpomi: rąpomi: rąpomi: rąpomi:
rąpomi: płatek płatek a wathki: bł. poch.: rąpomi: rąpomi:
i u dołu wruwa się tych wathki: kładowie, kładowie:
wathki: rąpomi: rąpomi.

Heret: chory i: diermian lub wypranieniu rąpomi:
dante wathki: wruwaj płatek płotny, który rąpomi:
wathki: diermian: rąpomi: rąpomi: rąpomi: rąpomi:
diermian lub b. diermian: rąpomi: rąpomi: rąpomi:
kami

Kami. U dowolnych «ktoiyk» b^l: paku; nie jest pnie-
cowa, wyposane matye misne. U ciob mogaych pnie-
wprory slopien drzinienia. Ktoiyk b^l: j. b. gubel, shiowate,
po puszeremu wody nie tworzy sie, nie tylla pascaro pnd-
siewornu wygnie asiu b^l: leco wyphasia moniej.
Injedyas jadro pniek rone nie wyphasia wa tham shub-
btany poth: leco rowno sie tylla ptatek ptociemny: a jest-
by podjeineu padto na gorze pniek szorene, dos pnie-
ciai b^l: pociemowar ber ptatka samy pociemkowane opa-
tury, a rapowodorowory se hydrotulu umiaie moiet.
owetkiye sie shatka apotany. Niu traba wodnaga pod-
rabyka pniek szorene stotkowego jadra, jest po rapaleni
tryprowem, aderenem, lyto jadro rapalone i porostato
shwardnienie: wtedy moniej wyphasia.

Tam gdzieś b. poch.: prosta i. nagrodzie i jądrem,
 lub na bokach, że byłto dase, który wewnątrz gładki
 i bokiow rozmięwa pod spód sta rozpotierem i radeham
 popy. Latta sadzi rozmięwa cały wach jądrowy, wystawia się
 weon: b. poch.: na chwał nadziatani powiercha i wygłe
 opatun powierchowane, umieszczaj rozpaleni następne
 cibly mialyto rbytuie. Urob mierz dierliwych, wkle-
 nych b. j. twarżca sadzi on mizkha gładka plectha ovi-
 sca weon: ptasowymu stoy poch.: aby rozbudzie wiaz
 rozpalenie.

Adarremia pod czas operacji:

1. Wskazanie i narysowanie post. kłopoty w. memogary.
2. Wyprzedzenie jada.

Na Krowarowie wzięci chłaban świąteczny, wody in-
nowej, a jeśli to niedostateczne, wyleć się z brzoza sto-
ły pości: rybi z jej powłocznymi nieobracając krawędziary,
w trawie dźwięka iu takowe brzozi, podwieszyć się z pościem
sukna

transgressiva, w 2 sari wypadnie wyjąć błonę pośł. ob-
leć ją krwawicem wstępnym. — Tereli, jadra wypadnie
oprowadzić się: pokładać się płasko tyłkiem, a jeśli to
nie wypławy, starania około jadra zamieszać.

Adarremia po opasaniu się:

1. Krwawienie następuje ex art: serotani ed: i z błony poślowej
 2. Gwałtowne zapalenie worka jądrowego, pest. tonci.
 3. Gangrena
 4. Kwaśna gozarka
 5. Wtanie
 6. Nagromadzenie ropy w worku jądrowym
 7. Kierowanie się w stronę płaszczyzny błon — a więc dalej
- Krwawie odrobniawia się, wody. —

Leczenie następuje

Krwawienie wymaga od razu opasania i wstępniać kła-
pota, raffomota, thion i siodków ściągających.

Silwum zapalenie rąbka się rozwoluciemu papetoe
nia, a jeśli grozi gangrena, wyjmuję się większość ciała
lub uszytkuje wulk, wije się okładam piernych, piją
wielki soki robijstrowej, orwałujaczej, diety suitej, nade-
mka krew piciu, sadaje się enemy. — W zapaleniu po-
stanie ugaszono się krew, ludziek pijawki, enemy wy-
próbowane. Calomet i. magnesia ch. ed: Hypocriami,
okłada się białym piernem, oddala się wulk, kłęb-
ferek H. kusew piernie okładania niebyły by dogodne
ciężtych wry.

Gangrena polebije ciężtych fomentacji z natani an-
matyrynych, oddalona wulków.

Gozarka przy tem postępowaniu się pryncyp-
wulk, uszytkuje okładaniem ciężtem nabiałem, eno-
mom uciwierdzenia — a jeśli to niedostateczne, rozwol-
ści.

się opasaniu, wyjmie się wathę i pada się. Mieszkana obijta
twa skubanki z dodatkami opji. Tereli Koltki są z natych
traumatyzmami i ukrywają rany: peritonei lub kłósek, postę-
pnie tak, jak te choroby wymagają.

W razie nagromadzenia ropy, jeśli niemoczna, jej nadawanie
niewielkiego siłku wyci ściągnie na jej wypróżnienie.

Gdyż nie jednoczą się z mosta bł. pochwową z jądrem,
lub temu przeszkadzało niestoworne opatnienie, lub bł. po-
chwową potniebawata wyjęcia, wtedy wprowadzają róg:
błuki rowkowy, a po nim ranie wciągnęli z koniem kłójce
do najgłębszych punktów, jak bł. pochwową i pnieinacii:

pozem ranie szpita i jama odkryła błony poch. wypręga
się mocno skubanki. Po operacji pada się. Chorobom
opiat. Na umiarkowanie wzrostu nerwów truszących.

Dieta stosuje się do stopnia rozpalenia i odrywania.

Tereli suspensorium nie dość mocno unosi wypręga je
przekłam skubanki.

W 48 godzin po operacji, zdjąć powierchowone części opa-
towania, po dźwięczeniu ich poprzednio, a w ich miejsce
nową, nie skubanki pnyłoty.

Dnia 4. można wyjąć kilka wathów skubanki, a wry-
duszy miejsce wyciąć wodą, wkurwa się surowe. Tak
postępuje się aż do d. 7-9. w którym orasie płatek
płatka wypręga ropy, pozem go się wyjmie i wry-
duszy punktu między jądrem i błoną poch. wypręga i
waterkami w bł. nóg: pnieinacii lub w nieptgwość,
a postępnym w którym miejscu raziło się porównanie
to najwięcej wypręga wathami.

W pierwszym i drugim dniu opatkuje się dwa razy dziennie, pota-
myłko są. Rabinowanie pnyłoty się nacierają ka-
mieniami pnieinacii. — Tereli pnieinacii i jędrze kwalifi-
kacja się do wyjęcia, a chory wato mierowat, wtedy

Kamieńka waltho. Jatkka i rana powierchoćnoie op
miej, zjedyniać korego z powrocie wody.

2^o Kastrakanie.

Prośba nadei jekubnych do jekubia wrota i adrowy
jekubna jak jekure strachaska z ogrycia do Zij moza
obzi, ktozby rarka do rarki zgranowcy. Jny padat, i
kmarly, wina 32^o Deaumusa, konyrio.

Operator jekubia wrota, wypuszcza wode, jekubkaj
aly rarka zgranowcy jak najzłubij wronat po jekubna
jponowit na wstymai wrota jadowy aly po wpy
nawin wody mowunsta iei blona poiki, p rarki, po
reca jponowit wprowadza rarka strachaska najel
mowia winow wrota zgrania i wstymkaje tyje
dofany bti. jekubowcy i ta obzi mowia, kastrakanie
ma iei jekub wrota, mowia jekubkaj wrota do jadowy
wrota. kono jponowit rarka strachaska wrota
gwie, operator rarka jekubkaj paleu rarka zgrania
i drugie rarka mowia bledie wrota jadowy, aly na wpy
Mia rarka wrota wrota zgranio. Po i tub wrota
mowia iekubkaj iei rarka konyrio i rarka konyrio
nar drug, jekubkaj iei rarka drug, ai b. jekubkaj
wy bati wrota w wrota jadowy, wrota bledie mowia
ka nasieniego, wrota rarka iei rarka bledie jekub
reudenia. jekub drugie jekubkaj mowia
kono tego strachaska bledie, rarka iei rarka mowia
mowia tak rarka, jak tyje rarka jekub mowia jekub
wypuszcza iei jekub strachaska jekubkaj, jekubkaj iei
Po rarki zgrania dla wrota wrota konyrio
mowia rarka konyrio. Na obzi jekubkaj jekubkaj iei
jekubkaj

plasterek lepkiej, wosk jadalny obłożyć się w ciepłym wio-
nie smarować podkładką, a wewnątrz ułożyć się ma-
siakiem. Sklepić ręką aby drągiem. Sklepić ręką
rękojścią tylko pierwsze, a jeśli to będzie niedo-
statkiem, mieszaninę proszku z resztką wody
U doświadczeń mieszaninę mogących błonę postać: kawałek
wagi zlepić z proszku. Pamiętaj aby ręką zgrania
mieszaninę stała wspanie błonę proszku: i nie, nie dojdą
się ręką, bo ręką gangreną woska jadalnego
ale: śmierć naciągnie more. Po wypuszczeniu wody
nie się ręką, należy wypadać stan jadalny: blo-
ny postać: a jeśli jadalny jest, smiertelne a błona postać: lewa
ta, leży, mieszaninę: albo chorego ręką tylko
przy punkcie, i wypadać albo jadalny. Sklepić drągiem:
wosk, ręką wyciągać 4-5 dni: wtedy ręką, ręką
się takie ręką, wyciągać ręką u-
mniejszając, dojdzie niebezpieczeństwo nie mieć, po-
nem się ich pamiętać: i ostatecznie konać uleceńca.

3. Sposób leczenia ręką

Przygod: Trójgłówny ręką obłożona do 4 linii, ręką
długa ma mieć do 5 cali: grubość talerz, aby po par-
wora mogła się przesunąć. Ręką ręką 6-7
cali długą, którą w jednym koniu miał kółko trójgłówny:
ca a w uszku do przysięgnięcia ręką, ręką
ręką tylko grubego, jedwabiu grubość drugiej ręką,
ręką ręką, ręką ręką, kompres, unosić.

Chorego ułożyć się po lewej stronie boku łóżka,
operator wbić zgranie ręką, jak przy ciele palatwa,
wypuszczać nie, woska ręką, drugą po ręką, ręką
grana talerz ręką, aż dojdzie do górnej resztki woska,
ręką woska błonę woska na równość wycią-
ga u góry ręką, wypuszczać ręką obu ręką, ręką
konie

konie rawolki little raweruje, oba punkta worka pnie.
Kutkiego opatny pętkiem skubanki na worku katorzy
kompiet: utryma ogół unosiutkiem.

Secreum Jeret zapalenie wzmogło się na wysoku,
saronie do indywidualności odpowiednie antyflozityzmu
ciotki, na worku jądrowy okładania usimierajac, a
postmegatory przepa w worku się nagromadza
morem jej nabryt droge utarowa: 12:14 dni po opat-
ny pny opatnem wywaga się lalka iutko x na-
wotki, tak się rawalwa zimniejsza arż ostaknie
utki się wywaga.

4^o Sposób leczenia środkami trawiającym pod

Naczeń pnodawa: i solna worka jądrowego pny
ry się okienkowy plaster lepkie, na to pnyklada się
kawalek lap: caust: Hirsorgum, mający do 10 linij
Jugow: i serotioin, albo się go robi waznem: i pny
tory p 5:8 godzin. Jeret niedostatkem skutkowat utry-
się w 3 godziny na nowo naskonye opalonas pny
ry się perek skubanki namawany c. Ung: Dig: i
to kompiet i worku jądrowy unosiutkiem się utryma
Gdy ikonyra odpadnie w miejscu pnetrawionem pnet-
ja się lametek, woda się wypuszcza i na nowo opat-
ny. U dziec można pnetrawia c. Arg: utk: fuso.

5^o Sposób leczenia wyuciem

Przynad: Nois pnaty: wyppkty, pgtelbruk rowlowy,
Klesze anatomične, norystki kypsa, nandria do pny
wzganiam nacypn.

Dziatawie: Na nodku nabrzmiałem wodnistem Inu się
widetur od goiy arż do dotu skora. Dsabria się ja rym
du kutytaw: arż do Epidermis, potem skureta się blona
poch: skwir jej norseret: się do dna worka, porem cy-
nuy: arż

niuje się cieża boćne błony poch: albo palcami i kłó-
szczykami anatomicznymi, aż do miejsc gdzie niebezpie-
czeństwo parzenia, rągnięcia, tj. aż do epidermisy, i rnu-
ka nasiennego, potem wypatrują się jama do otokaję-
dwa walcami w oliwie smażanymi; postępuje uśtatk
wypej. --

Teraz się drżatami parząto cieżu; i natrafano na
takiowy stan błony poch: który nakazuje wypięcie rzuca-
du odpytującej wody, odrobienie błony poch: jedną od dno-
tos już nie da się tak łatwo uskutecznić: wtedy u-
niuje się ławica dantes szczytkami pomocnik ponę-
ga kurobie ławica waz: prosięć i wstąpić why-
marini błon, operator oddziela je się da, i zagapaw sumi-
cam dostatecznie kutyłowi wygina uszytkami cieżu
sum: vaginalis a te rągnięcia się nim zdaje rągnięcia.

6^o sposób leczenia rłorony środku trawia-
go i cieżu.

Nacalij obitość gura stowuie do jego wielko-
ci wawrzy faldy pneuma się takowa na 2 cale pp rłorę
aż do błony poch: nate błony składnie się albo potari-
grypari wprostika; rągnięcia na uśtatk, albo purrek
skubanki w tugu rnydarskim rmarany; uśtatk
się płaschem reptum. pp 3. dniach odjeiniuje się, uś-
wypuszcza; w tówor pnerarły rozwarwa kawateli
gąbki iuśniety albo kawateli płotna wymiępionego
do jamy pochłowej, rucławia się go pp 3 dni, potem się
rłowon odnosi aż do dnia 10: 14. -- po 10 dniach ab-
cenne się rwoytkie koniary.

Dla rorzmianostoi stanów chorobnych, które uśna
pohłkajac operacya ta podpada odniunom:
1. Teraz, w rucławiu nat: p. tt wtedy uśniuje się stowuie
do ukornosi rucławia ukornaw na nim faldy pneuma uś.

a re po pniegu odchywaniu stan smotka nas: wtedy
się odchyja i postać Mły. Jeżeli w przednich Komorach
Kach skłanki Komor. jest T i w tydatydach, wtedy Komor
ki rozciągają się, tydatydy wytną się noryskami
Kupera, wskazywając to p. roznosić, by nie skłanki
narysi smotka nas: pozem wsunawszy do rany
płatki płonny, wypełnia się ją, watkami skłanki
nakłose przystawia przeliskanki i płaski
leptu obwinie się podkładką i ogół ubynia się um
siłkiem.

2. Jeżeli jest hydrocele w kanale poch: smotka na
siły rwane hydrocele ciśnie wtedy podobnie się po
stępuje, jak w poprzedzającym, tylko że roznosić
się narysi prawosą T, w mniejszym dołu pro
tyje się nosem prostym, prawosą T w większym
dołu otwiera się, jak worek kitowy; pozem w obu rana
wprowadza się zgłębił roznosić, a nam pocięma się
kanal poch: noryskami lub nosem prostym ku górze
i ku dołowi, aż do punktów jego skłanki. Jeżeli
rualarko worek gubny twarde, wywar go aby się nie
skłanki bez nadwężenia narysi smotka.
Opamię, jak w poprzedzającym warze.

3. Przy hydrocele congenita:

a, Jeżeli woda prawosą i wblone posłuszną je
sta i obrakowu chorego nie j. wielka morna przed
wianu ulewuie p. pomociu partny Kniecia, przy am
tus abdominalis, ras wywar się słonowy narysi
wryskania pojednania części. Jeżeli obrakowu j. wie
kora, lekajac się skłanki niebezpiecznych, lepiej kara
unosie tak długo worek jadowy, dopóki woda p. b
cha wywarona narad do jauny brunsnej nieostapi, po

ten patorgi najpierw brzozy opaska kłowa, która
poleci się stugo myć, a na worki jądrowy wryje się
rodzkois irogajany, dramiayko. Przy takim postę-
powaniu u drzewi słabowitych można wryć się ułeciem
state, u dośrodku pnieyosy, wypuszczyć wodę
wryjęc opaski kłowej.

6. Jeżeli hydrocele ma niedługo czasu: błąd
postępowej jadra tj. wty cześć processus vaginalis, kło-
ra lery między annulus abdominalis, odkrywając się
uk nasienney i postępie, jak przy drugiej odmianie ope-
racji. Po opatunku aby nawiązać byt opaski kłowej
ratorgi dla pojednania bytu cześć w annulus ab-
dominalis.

4. Jeżeli woda znajduje się w błonie postępowej
jadra i smurka nasienney, wtedy rozciąć się ogólna
powłoka od pierścienia brzelnego aż do dna worka
jądrowego. Po cześć chłopa ić ten: vog: p: testis, na-
stępnie guz smurka nasienney. Opatunek się sposobem
wathois i worki b: postępowej i utworzony z nagioma
drzewa V w smurka nasienney. Można cześć chybić
dla niebezpieczeństwa pnieyosy a priori a nawet aposteriori
po wypuszczeniu wody błony postępowej jadra, a to dla tego
że nieliniem i cześć guza pnieyosy się na rękę
odpływu wody, i operator cześć może się przy smur-
ku nasienney nie wody nieostatecznie wypuszc-
wszy wodę z worka jądrowego, jeżeli i podjęcie ić
się i w smurka nasienney znajduje, rozciąć się na-
rętem powłoki smurka nasienney od annulus abd-
aż do gołnego kłowa cześć błony postępowej jadra.

5. Jeżeli wypłynie w obu błonach postępowej jader wo-
da i rękawca, wtedy wykonywać się cześć na obu hydro-
celi

Kele z Kardię strony robno. Tymże sposobem wathamiera
wyppetnia białą porę: leca ucięcia się po jednej stronie
kół tyłko się ogranicza storoną, aż dościnie do wrota.
Jeszcze od czego potrzeba. —


Operatio ad Haematocela


Tę Haematocela postępić się tak jak przy hydrocele
sposobem Ciriā. Jakiż, jeśli krew wypława, i ptywa
i po robionem Ciriā odptywa wtedy rozciągać
nowem Haematocela, rannika się wstawia wathamiera
tyłko się wstawia płatek ptywiny, jeśli krew, strona
pła, wtedy otwór kłosa wyprukity postawić się
otworem, aby krew swobodnie wylewała się odptywając
Opatrując więc białą wyprukowaną. Ukierować dół
się postawić się naturalnie.

Operatio ad Varicocele

Tę operacyę le rozumić się postępowanie tak jak
pomocą którego pniecia się ogólnie powstanie worka
jądrowego. Varices się odstawiać, i ptywać, się postawić,
i po poprzednim podwiązaniu naczyni nowem się wy-
stawić, pamiętając aby nieobawiać się kłosa nacię-
tych ani varis deferentis. Pościwać ten stan vari-
cocele może być zhanglikowany, a powody do kom-
plikacji mogą być różne stan nowy radnej ogólnie
nej operacyi dalszej ustanowić niemożna: a jeśli nacię-
cia mają się stan ten zaważanie do operacyi, jak
albo przyjąć przedewszystkiem ekhyzany jądra, albo
odwarte się otworzyć, i nacięć naczyni, i ptywać
i ptywać

mis: pniekonai iia wy moznai wyidzi' lub uie.





Amputatio artuum. 5.

Czynności ta zamierzamy exeg. odno-
gi w kierunku średniej poprzecznej
od reszty ciała oddzielnie, celem nabe-
pieczenia zdrowia ogółowi. —

Czynności głównejsze są:

1. Poprzeczne ratamowanie ~~krwi~~ biegu
krwi w pniach tuż otwórka do ~~odci-~~
cia pierzynaczonego. —
2. Pianone przecięcie skóry w postaci obra-
niny. —
3. Przecięcie mięs w postaci brzojskiej s.
płatowej. —
4. Przecięcie więzadeł staronych s. periostu.
5. Przepitowanie s. wysuszerenia kości re. ~~sta-~~
nie.
6. Ratamowanie krwawienia podwiązaniem
woda zimna lub innymi środkami. —
7. Polżenie rany i Opasanie stosownie
do brzoju sztaornego, który chcemy urda-
tnić do znoszenia szrudła. —

Wskazania są bliższe, niż wy-
kto się wprawidał, podanych do Am-
putacji znajdować. — Wogóle to moż-
na powiedzieć, iż bez względu odiecia
można, tam gdzie się wybadawo
stosunki choroby miejscowej, same
porer się i stosunki jej do ogółu ciała.

ta, że względu na stany ulcero-
ne wewnętrzne można powziąć myśl
pewną, iż chory ostonek, iako też i ry-
cie chorego nadnym sposobem leczenia
innym nie może być utrzymywane, a
przecież jowiaropodobństwo, iż odci-
nięty ostonek ryce przynajmniej
*ocisnąć można.

~~Wielki stan~~ Co do ogólnego wska-
zania Amputacji, lecz iwarun-
kowo, iestere powiedzieć można, iż ws-
kazaniem iest do Odcięcia:

1. W wielkim stanie chorobnym ostonka, któ-
rego możnaść ulcerowania przypuszczać
da się, lecz do ulcerowania takiego na-
kładu jest natury trzeba, ac między 10.
przypadkami, 8. genie zmyślenia
z nim przyjdą do zdrowia.

2. Taką chorobą ostonka, przy której
ostonka da się utrzymać z podobieństwem
do prawdy, lecz po ulcerowaniu staje
się bezwzględny, a nawet ciężar-
sem dla ulcerowanego do nabycia chle-
ba, tem więcej iestli powstanie mo-
żna, iż siła natury do ulcerowania
choroby miejscowej, może nie wys-
tarczy.

41.

3. Takie i inne stany chorób =
ne, które tylko pod najsłabszymi =
srebnymi stosunkami zewn: sta choroba
dają się uleczyć; w odwrotnych stosun-
kach są wskazaniam berwzględem
do Amputacji. —
Skreputowane wskazania do Am-
putacji są: —

1. Złamanie kości szerepowe, potężne
nie ze zmięgnięciem części miękkich
w tym stopniu i w takiej objętości, iż
członek raczą zmięknąć utraconym
być nie może. —
2. Takie złamanie kości, gdzie szere-
py i. stawy się przerywają, a nawet miękki
organ i. wyrostkowe części i. gdzie
radnym sposobem raną kłowi na-
stawić nie można, w rękodziełach p-
te szerepy, których ber naraczenie cho-
roby na śmierć oddać nie można. —
3. Takie złamanie, po którym prze-
widywać można miękki: Zap: Gangr: i.
wyrostkowe objętości. Rozpię: tak to by-
wa szerepnięty i. części ciała górna i. dol-
na kości rękowej i. części stawowa kości
udłowej była. —
4. Złamanie kości i zmięgnięcie części
miękkich spowodowane przez ciała obce,
i. tak kule działające w czasie kontuzji

11. Lupulne wywichnienie stawów zawią-
sowych z przedarciem więzadeł i creści
miękk. stawowatych. —
12. Utrata wielkiej creści kości rurowej
i dorostłych sprządną p. wplywy zw-
nietrzne z. Nekroze. —
13. Przerwanie przy tętno ertonka, z których
wynikłemu kłopotliwemu iadnym sposo-
bem rady dać nie można z. żeby na-
wet dalo się zaradzić naczynia poboczne
nie są w stanie do przywrócenia dostatecznej
go ertonka. —
14. Ogromne Aneurysma zastarzałe u fru-
dywiduów rucernie podestnych; — w ogóle
te stany, które zabierają Operacyę aneu-
rysmatu. —
15. Zniszczenie wrygsthick creści do kół,
przy Aneurysma się r. n. g. u. i. g. y. —
16. Zatarowanie kręgieni krwi, bez możno-
ści przywrócenia go po Oper. aneurysma-
tu z. Gangr. stędo wyniki. —
17. Aneurysma talia, które bezskutecznie p.
długi czas naciskiem było leczone, przy-
tem choćby chciało Operacyę przedsię-
wziąć, dla niebezpieczeństwa do Operowania
miejsca innych, wypadłoby na miejscu na-
ciśnięciem Operować. —
18. Sekwester kości taki, iż go wydobycie nie
można, a ropienie tak gwałtowne, iż cho-
rego do grobu pblina z. u. i. k. i. nowa kość
przechodzi w Caries z. Necrosis. —
19. Końce stawowe kości owrędrone z. obu-
marłe z. Caries z. Necrosis: / nie mniej Caries
i Necrosis kości z. g. r. a. s. t. y. c. h. s. t. a. n. o. w. i. e. y. —

stan stopy i ręki, a w pasieru iereli te-
m stanowi nie sprzyja wiek młody, iśli
gdyridum nie może być przeignowane
iereli meta sincerisim w iele sprawa-
wie nie można 4. iśli z Ropniem
połgryta się gorzka miseracja. —

20. Ogromne rzedzie cześci stanowych ko-
ści, z iakiego kolwiek powodu, z Ropni-
em wyecupującem połgzone. —

21. Ogromne rzedzie kości iakiego kolwiek
istoty 4. narowiska, które 4. p. się na-
grodzić miseraniem cześci mięk: i ry-
ciu, nawet gury cześci mięk: podkopu-
je kasadę życia, nie dać się inaczey od-
palić 4. orynięce ciałem, przy którym
widać, berwytcznym cięciem. —

22. *Tungus articuli*, *Tumor albus* w 3. Ła-
kości, i nawet i w 2. iereli poprostu
wryto wreselkich sposobów leczenia ber-
kuteernie. —

23. Stan rakowaty tak cześci mięk: iakie-
toż *Osteosarccosis* cześci twardych, z iakiego
kolwiek bądź dyskracyi, tudzież gury
łostwie niczem nie pokonane nagrodzić
ięce ryciu wstrząs solen 4. bólem — do cze-
go policzyć można gury po *Pota* opisa-
ny, charuicy się w środku 4. górney
cześci tydli i nasracy niektóre uchy-
anewrymatu. —

24. Gangreony wewnętrznych wytych 4.
re sto sumków ciałem takich, które

ryciem bardzo nagłaśnie i przy których
 czekać nie można oddzielenia się ganz
 greny; przy cym nie ma nadziei, iżby roz-
 produkcyja przerywnie się nie mogła do
 wynagrodzenia straty i ertonek & nie mo-
 że być utrzymany & utrzymany jone
 niebezpieczny; przy cym i przerywna ganz
 greny z erescią rąkanger: p. Amputacyja od-
 raru może być oddalona, ery gangrenen
 się ograniczyła & nie. — Jest wskazaniem
 do Operacyi Gangrena która się ograni-
 czyła gdy ertonek po oddaleniu eresci rąkanger
 nie da się utrzymać & utrzymany jone nie-
 bezpieczny, tudzież taki rodzaj Gangr: napi-
 datny, który był raskrepiiony p. niery-
 ste opatrzenie, a który wymagać może
 Amputacyi. —

25. Cresto wracające krawisnia z naczyn gło-
 wnego leżących np. r tetna idącego in arcu
 profundo planta pedis & ole manus, pga-
 leri gło: art: poplitea, ex art: interossea i-
 krawisnia porażenia którym podwignano
 głownię, nie pnia ryp na prozino, a wtedy
 jeżeli spiesznie krawotoku ratamować nie
 można, amputacya jest wskazana. —

26. Ropioni wyzerpnięcie, twarda, miara pow-
 szczygnąć się nie dać. —

27. Tetanus, ale taki, którego bież nie j spie-
 szny i o którym twierdzić można i pew-
 niosci, że pochodzi z masyca skaleczonego,

w takim razie Amputacja jest ostatnią
czynnością środkową, po poprzedniczo, trze-
ciej części. wranione, przecinają się ściśle,
do dalszej części, aby, uzyć środków usmierz-
ających.

28. Stan sztywny i twardy. Kłopotliwość ertonka
które choroba nabrania użycia ertonka
użyciu mu porażka drażniącego do utrzymania
nie użycia, jak ertonki nie użycia, jeżeli popro-
simo użycia w środkach starania leczenia sta-
nu sztywnego. —

29. Polec nadcierniowy, miedziowy, bardzo wielki,
wiecej porażka drażniącego. —

30. Stan wypryskowy po Amputacji w postaci
rozglowicy, nie nadto kłopotliwej, nie po-
krętych dostatecznie skóry. —

31. Takie stany chorobowe, na pokonanie kłó-
tych, użycia w środkach sposobów, a które
choczą dalsze leczenie, pokazuje wiarygod-
ność i niebezpieczeństwo użycia wyprysku, nimby
mogły być uleczone, tudzież choroby takie
których uleczenie nie jest pewne 4. proces
leczenia jest niebezpieczny, trudniejszy od
samego nagożenia rany po Amputacji i
porazki, którym nawet rozsądnie lekarze,
użyciemby się wystawili użycia na niebez-
pieczeństwo niż po Amputacji. —

Leczenie.

Względnie takim przypadkiem, gdzie na P.

44

choroż, mied 10. r. Amputacyi gine, w których bez amput. utrzymać można iak. Kolwiek ortonek w st. urotycznym. —
Przeogłowe Lekary.

1. Gangrena z przerywny wewn: i wspólnie trwająca choroba wewn: z gangr: tendencja iak iaka choroba j. wiede z gólna, która ncha cały Organizm. —
2. Tetanus tak często napadający z innych ja- kich przerywn, a oiu puchodzący z samicy rany, a pominiwase tego stosunku porównanie iak nie pewne, a skutek. Amputacyi iisere j. oiu pewniejszej, prosto lepiej utrzymać się od Amputacyi, a mianowicie na orton- ku miedkim. —
3. Gdzie ortonek amputowany rostat z pos- trzatu Driatony, gdzie odcięcie ortonka oiu j. blisko stawu rana nie j. bardzo oiu równa z. Ranażek porostaty kosei oiu j. rozciągany. —
4. Stosowanie z srodka kosei rury, przy całej postacie ogólniej, wyniszcze z pos- trzatu grubego, iakeli ponacinawszy orton- guk, wydobyto się trzaski. —
5. Rozcięcie wyzerpujące, które nawiądo od przerywn, dających się usunąć np. z ciat obcych, nieczystości dróg pierwszych, pnie- tora zepsutego, rtych pokarmów z tego Prasnania, z nie stosownego z. niewyca- srodków potrzebnych wewnętrznym. —

6. Obnarzenie i nadpowierzchnię ortełka
wystające końce stawowe kości, pod-
czas Wymicknienia, lecz wtedy tylko,
gdy cięci mięk: w najprostszym sposo-
bie cięte, rana jest czysta i końce wysta-
jące kości odpytuwać się dają. —

7. Przy *Tungus articulatio*, *Tumor albus*,
gdzie na wielu stawach się pokazuje.

8. Zapalenie ogólne i miejscowe nagle
postępujące, połączone z Mierzą-
kiem, Konwulsjami. —

9. Na wolno Amputować, przy wyew-
ianiu się stawu zupełnym, przy wy-
miszreniu chorego, przy Gorgazee ni-
szer: Gdy puls mały, przódki, cera tma-
rzy zimna, otwiana, skóra sucha,
mroźna, purgaminowa, poty, topie-
chymioty białymka, na pozor pom-
kowane oczy, a do tego siły bardzo spi-
sane, lecz widocznego powodu giną. —

10. Gdy chory jasno przewiduje, iż Opera-
cja przy kości wzięcie, a do tego i-
te przepowiednia, co wysoki stopień
chorego nieodwariania się, obawy, trwogi.

11. Lekkość kłopotu w. wzięcia nie-
tam gdzie odwieci i wskazanie, lecz
stany te, nie dają się na przed prze-
widzieć. —

12. Taka obetność choroby mięscowej, iż wstręty
 długo nie psatego nosem oddalę oń można, jak
 gwałtownie wstręconie orłonka, tak dalekie
 iż nie można być pewnym, czy w mięscu
 Amputacye skutek tego nie będzie. Gdzie
 wstręconie całego ciała, omiłowanie, puls
 sięgający, mały, utrata rymptów, organie orłan-
 ka, wyonoty, rumno, rumiana cęba i oddatność
 Stan ten ~~wstręconie~~ wstręconie nie jest takim iż eg-
 ber narunków, lecz wypadła w nim orłonka
 następną, z resztą wstręconie które się og-
 niwa mięscem gdzie się ma wykonać Amput-
 nie jest takim albo granicą wstręconie i z
 pełnością orłonki nie można. —

13. Stan chorobny takli ogólny, który jest powodem
 uśpienia mięscowej, a którego oddalę nie można

14. Korpuscularnie h. s. 2. Kosi do noga Stanowiczy
 orem a priori napewno się nie można, i to naj-
 nika iż z nalaściu pod odpitowaniem kosi, i
 tak rozpuścić się w stanie przyległym i nad nim
 karat amputować, iaczej następnie konawienie nie
 wstręconie i wstręconie następnie Caras. —

15. Taki stan ostabienia i tak wielka Obrażenie
 i której można przewidzieć, iż choroby i wśród Op-
 i w skutku Zapal. Skoneg. —

Stany wskazywać Amputacyę. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
 13, 14, 17, 19, i 20 wskazywać bez względu Amputacyę,
 pod wszelkimi stosunkami i gdzie tylko Amputacyę
 jedynym środkiem ocalenia, gdyż wskazywać ulokowania
 erasem którego z tych stanów, polierzeby natierato do
 zjawnie natury niepożytych, które nie mogą się stać
 w Maranion dla Leikara. —

Stan wskazywać: 4, i 8. są bez względu wskazywać
 ale tylko w czasie wojny, gdyż i pomiędzy 20. tak
 ranionym, magore, i 8. umiera, lecz ponieważ
 wielkość i kierunek takli ran są różne, więc
 i iaczej ich ukazywać może być inna, i to raz
 my takli przy stosunkach pomysłowych, bez tylko
 w zglądnie wskazywać stanami, to i takimi

[illegible]

na skutek wyżej oporob, i nag aduclan
 Holizow. Dyskrarje albo są trondzie do-
 gannie albo doigie iu wytepie i tak skrofaty
 w Do: C, H. mogą rniking lub B, albo. B. y.
 w nast. jnych. Podobnie podagra drice.
 Dyskrarja sipl: skor: porubionie rastane
 w atiego slady. Arter: ncha ertomika ar
 do grobu. Dys: rak: pamiowar iest pre-
 istocreniem inney Dys: j ni tykalna do-
 paki t. nie borie, wytepiena.
Oczadzie w ktorym przedsietrac

amput.

Przedmiot ten iur x iah od 100 lat rozbie-
 rang nayskrypulatnidy i radanany iah
 nagrody x xbliryl sie do pernego stepnia
 oznaczenia. — Woyna 30 letnia i os-
 tatnie woyny Francyi dostarowaty waz-
 wiecy materiatow skunacych do osadzenia
 nayslosownieyorego peryodu do Amput-
 tacyi, a choc twierdzenia nie ryskuia,
 iskere pewnosci terapeutycznej, pre-
 ciar naproccerje nie mozna, re ponie-
 wasz w tedy tytko drianie lekarstie.
 j ~~do~~ rbanwienie, kiedy w stosownym era-
 sie j przedsi:, preto i stany o ktorych
 niepomnielismy iahlo wshar: rastosowa-
 ne do peryodu stosownego mozna uwa-
 riac na kwalifikuic sie do Amputacyi.
 1. Woreknie swkie skakrenia, o ktorych
 wyryj powiedzielismy, rzadzie Amput.
 natychmiast, neydaley mozna sa od Torg

do 24 godzin, a ratem amputować nim
się racemnie process Łap: w ranie. —

2. Wszystkie rany i stany chorobne:
a. Których możność uleczenia ber Amp:
doswiadczenie uznato w większej części
przypadków; ber które w dalszym bie-
gu tak się rozciągają, iż życie czy to
z możnością, czy ber możności utrzymania
ciężka, a bardzo j. racjonalne, i. ber
Amp: niemożliwie upadł musi. —
b. Których towarzystwo okoliczności: i. ał.
Łap: Gorgierka rapalcinowa, eretismus,
konwulsye, pomieszczenie umysłu, dyskr:
daje się usunąć choroby, które się w
tych stanach chorobnych wydarzają, Ga:
nicog? z przyczyn: i. ał. do czasu
zakażenia Czerwca w tej chwili istnie-
jącej, w której Lekarz racynia ściśle? chociaż
rodzaj Skaler: sam przez się może
być uwarunkowany ber względnie Amp.
naharuięcy. —

c. Których stosunki są tego rodzaju,
i. okoliczności naharuięcy, równowa-
żąc się z okolicznościami naharuięcymi. —

3. Wszystkie rany i stany chorobne, które
potrzebują leczenia przy gotowości
nim się do Amp: przystąpi, i. ał. ar:
dy trzeba oceniwać, ał. Łap: od-

czyni z apatniony i eretismus zniknie,
 a i umysł uspokojonym zostanie, aże
 procesy Prop: dachonale się w ranie us-
 tali, aże obciążoność nakładająca w ranie
 srey tierbie istnieć będą od nakładającej się
 aże leżenie przygotowania ułożonem
 będzie i dalsze odwołanie Amp: sroko-
 Dziśby Operacyi mogło. —

Jeżeli Lakresy ostatnie, z tego powodu ob-
 ramy do Amp: —

1. Gdyż wielu umiera iur wprost procesu
 Kap: które się w ranie rozwinęło. —
2. Jeż procesy Kap: w ranie a nawet i wreszcie
 otaczających ranę takież podpada de-
 ganiracji, iur nawet po zniknięciu Kap:
 miejsca nie ma, gdzie by Amputować
 można. —
3. Gdyż ropienie następujące iur w pier-
 wszych dniach, staje się ryciu na gwał-
 rażącym i ropienie wreszcie przyległych
 tat: daleko sięgać może, iur później
 trzeba wyjąć Amp: robić, niż gdyby
 iż przedsięwzięto przed nastaniem się Kap:
 4. Zgubne krwotoki następne, ażeby
 właśnie w tedy następnie, gdy Kap: na-
 cryna przechodzić w ft: choroby innej,
 a wtedy właśnie i Amp: później
~~z kłopotem się domyślać, iur wtedy po-
 nę przedsięwzięto, Kap: wstrząs się choroby.~~

j niestosownej i krwotokom nie radzić
nie można.

5. Przewrót rucronych skaleconych j niemiernie męczących i stać się przyczyną
cierpienia wprost rabiających 4. raka
ruiących nawet Amput. pozmniejszą 4.
kuiących się domijać, nie choroby po
miej przedsięwzięta była, smutnie się skonała.
Uwagi te są nader ważne dla lekarza
wojskowego gdyż te same stosunki
mogą nastąpić nawet wleci, kiedy
chorzy nie zostają przewróconym, bo am-
re, dla często wydarzającego się Tetan-
nus. — Na razie oprzyjmy i mimo to,
je się takich skaleconych natychmiast
amputować, iednak wielu z nich umiera,
nie wiele wartości klasa może mieć, ier-
li pomogę rachemy, i. Amput. takich pro-
stowane są na polu wojennym, gdzie często
4. ciążebnie się amputuje 4. wśród ni-
stosownego usposobienia umysłu chorego
często bez dozwolenia rozważa, ier j potrze-
bna Amput. 4. szkodliwa, często bez po-
trzebnej pomocy do Amput. i pospie-
chem, narzedziami i t. p. —

To wszystko potwierdza, iż samotne po-
 tożenie wojownika, i wchłócenie jego
 soku i nie zostało lepić, i w takim razie,
 aby chory wśród niecierpliwości umarł, niż pod
 niepowodzeniem wzięcia, wzięcia, podpadł.
 Amputacji; doświadczeniem pomysłu, i o
 przeworze chorego na wojnie drabiniastym
 i rang amputowanego i rekonstrukcji stry-
 kanym, o st. skalec. i macz. i przypowieści
 podwój. i chorym, któremu otwory ranne
 pękami skub. porażano tytko, w takim
 razie wzięcia, gdzie sama śmierć
 inne skalec. kare wzięcia, czy Amput.
 iadana, i wzięcia, czy można i
 wzięcia, i wzięcia, i wzięcia, i wzięcia.
 Laska wiadomości, o ile chory po Amput.
 może mieć wygodę i niecierpliwość i duka-
 ra i kłótnie, gdyż i kłótnie chory po
 Amput. nie może być przypowieści
 opatrzonym, i mieć wygodę, lepić go
 raz amputować, niż takiego, który re-
 straszanym i kłótniem może być i
 niekiedy pękniętym, gdyż w tym

rara mogą trwać odcyś, nos się mo-
je klęce, rana wyrzuci i chory się wy-
lure. — Zgodnie re natura Operacya
nie w przedmą bydr przedsięwzięta,
ar skłoczony odcyśka przystępność umę-
tu, wyjdzie z przestacha i ~~przebiegu~~
przebiegu omdlewać. —

Có do Amput: pór męszych, o których
wyrarinsy, kiedy mogą bydr przedsięw-
nie, to można dodać, iż nie rarer po
wyzasomieniu Lapi: przedsięwzięć nar-
leży Amput: chyba re Lekarz by-
dr w nagłej koniurności, — an-
ter rana do odrobac nie natęży sta-
ley mylny rasy, i chory ostabio-
ny tatury, ruci Amp: nie chory sit.
męszy, wydarz się boniem i stopni-
ostabienia srodkowego, tak nagle wsta-
wie się more, i Amputacya przy-
rymi się tylko do dolicia chorego —
Omiejscu w którym Amputacya
przedsięwzięć natęży to
more stary na Axioma.

Ostrzeżenie iak nay x. erlonka, ale x tym
warunkiem, aby obok oszczędzenia erlon-
ka, wyszło co bydr more na nim cha-
robne p. Operacya odcięto, aby rana by-
ła podatna do poiczenia. — Ograni-
czenia tego Axiomata, są: Przy oznac: mię-
sca stosownego do Amp: unwarac: naley.

1. Na stopień traumatyzmności wy nikt-
kiej z Operacyi względem warności er-
lonka w ogóle x. w którymkolwiek miejscu
more bydr erlonki war: nieyszym, niż
w drugiem. —
2. Jak po Amp: chorey rękce wygwac: swo-
go Tronu. —
3. Na rramienność stanu, przy którym
erlonki cierpi. —
4. Na stopień siły chorego. —
5. Na rodzaj choroby i obciążenie części sta-
nowiących choroby mięscow. —
6. Na gatunek sklerozis, rodzaj rany,
sposób amputowania, rnaeremie i ma-
jątek chorego. —

At ponieważ doświadczenie uczy:

1. Ze Amputacja na goleni mniey j obra-
żająca niż na udzie, w stanie kolana
wiecey, niż w dołku, trzecię części uda,
w dołku trzecię czę: uda, mniey niż
u góry, przedsięgnęta, u góry, mniey niż

na stanie bioder — na przedramieniu
i ramieniu, nie w stanie barku; —
na rękach pałecy, na kościach środ-
ka ręki i stopy, mniej nie wystawia
górnym końcom tyłku kości, przeto
nawroto to prawo istnieć, aby od-
ciąć do Amput. miedzy, w którym
zakalecenie z. odrytu traumat. naj-
mniejszym być może, a tym
warunkiem aby inne wskazania do
uleczenia w wyborze tym obięte, by-
ły nie względem respektującym —
2. Istnienie pięty cięża środka stopy i
kości klinowatych, mniej defiguracji
i członki nie rąbiony sztuczny człon-
ek, i jeżeliby się w gołeni odcięto, trudno
je montowe poruszenie gołeni i członka
sztucznego, chociaż i pomyślnie era cięża
do amputowania na 6. 7. 8. pałecy ni-
żej tuberositas tibiae, jednak miedzy
pałecy, i jedynym punktem podpo-
ry sztucznego członka i kolano, nigdzie
bowiem indywid. sztucznego członka
trudno przywrócić nie można, jak
na kolanie, przeto u ludzi robotnych,

u polniemy, nie goruindriely amputo-
 wać, iak na 3. palca popr: wierz tuba
 erositas tibiae, wierz nie nadery ampu-
 tować ber nagłaizych porodów, dla-
 tego, iż obraricby morina stan Kola-
 mony. — wierz, dla tego, iżby nie przecię-
 rorgalzioney iur w Kości art: nutri-
 tie, która oficie krowa wie more, i tego
 ta trzeba przypuścić, że lepiej j goru-
 się da amputować na goleni, niż na
 polney czę: uoda, a wtedy nawet, kiedy jst
 chorowity goleni, nie orwała goruindri-
 amput: iak na 3. palca tub erositas. —
 wierz j p. tub erositas amputować, ^{ber} ~~na 3. palca~~
^{na 3. palca} ~~na 3. palca~~ ^{na 3. palca} ~~na 3. palca~~ ^{na 3. palca} ~~na 3. palca~~
 wierz, dla tego, że przy takiej amputa-
 cji iurac się nie nadery, ~~ber~~ ^{ber} ~~ber~~ ^{ber} ~~ber~~ ^{ber}
 ber wydobywania caputuli fibulae,
 nie amputować na udrze, dla tego,
 że przy takiej amputacji iurere
 się nie nadery, ~~ber~~ ^{ber} ~~ber~~ ^{ber} ~~ber~~ ^{ber}
 lantnego. — Co do Amputacji ustru-
 orniarney na stopie, to ię raczuciz,
 iż pęta nie more raczować poloremia
 poroamego, kiedy stopę, docięto między
 Astragalum i Calcaneum, os emboidu i

naviculare, a to a tego powodu re mi-
se Tydhone antagonistyceńskie Driat-
ce, miedzi na przednie stopy, leżące,
na małe małe, nad miedzi przesłane, i
li przesłane ich sięgać mi arosły i
recreiamy Kirne, stanowiącymi, i
podług Vilmaison kilka miedzi. Dapi-
ro cyprinosę przeciwną antagonis-
tów myślowie się obawia i dla tego or-
radzi leżący ryłkonac amput. w goleni
rada iego odwie się być dobra, a tego or-
radz, ię noga stać się ułyżenię, i
acredto latwiej nastosować można. —
Ponieważ przy Kradzie Amput. unarac-
nality, ię by iść eżeci miedzi: oszczęd-
na unydomata się w sta dżorym, pro-
to a iab. nagole. Tę ię oszczędzić
przy Amputacji pamiętać nality; — i
dla tego amputację przy Gangy. i
chory ma iść eżeci, ię nality odesłać
or samę granicę, leż miedzi myślowie, t
or ię przy orłaker. postat. re miedzi
ory: miedzi nality amputować w eżeci adro-
wym, przy Gangy: i to iść eżeci unarac, i
ory: miedzi ię nality ię nality ię nality
gole ię takimi okarami, bo eżeci eżeci
roba myślowie sięga, dla tego myślowie ampu-
tować, nality ię, porównie adawato. —

Porę amput. paley pamiętać i w b. orlonik
pollicis, indicis et auricularis, orulu się przę
oryniać do umorania neery, więc go re
moina, osaczenie go naterę, poruczenie b.
orlonik medii: annularis, go riel Pollicis naterę
wycaić drugi, ona bydr rarem i nim wy
cetym, porostawiać go boniem, nie tytko
się orpeda refa, alei w ięć uripania porost
kody, się rostarwi. —

Chociaż waznem j. dla lekara amputo
wać blisko rnaeronych stanów, iednakż Ony
wysoko na ramieniu i wysoko na udzie,
mniey j. niebezpieczna, niż wyżej i tyż
orlonik re stawa, tudzież re lepię j. na
tuberositas tritice amputować, niż na udzie
4. arycinae goleni i kolana. — Wzajemnie
dnie dla stawa chorobnego górney oryści sta
wa wszystkich płosci orosch refa, stanowiący
ocinać przychodzi, lepię iest odlegie cety refa, a
przedumienia, a ściskiby wypadło, tak wysoko
amputować przedramię, i by się abliżyło do sta
wu Polka, wtedy lepię j. amputować w dolney
wrepi ramienia. —

5. Lemiar i choroby obrzaskowych, niebezpieczna
j. wyllonywie barzo obrzaskowe Operacya, przeto
przy takim stanie, wybiorć do amput. mnię
mniey, orlachetne, choćby koutem niektorych
koryści lepię więc wyżej amputować, radacm
j. mnię, większą, niż orazdać oryści mnię
koutem, amputować w rozgraniozemin Gangre
4. blisko oryści postrelonych. —
5. Choroby j. dla chorego w tem rożnieniu, dnie
dla choroby sympatyornę postoll i tkanki. Móz
mózki blisko tuberositas tritice i nie w wy
nad górną trzecią oryści, uida 4. ramienia,

iereli się amputować w l. rarie nad Nola niem,
wostatnim, iereli się w stannu biodrowego z
barkowego mycina; — tam tyłko góra cępe sym
patyenne wie grozi dalszym porażeniem
skory, moim amputować nad Nola niem na
tuberkostas tćcie z górną trzeć, eręci udr
ramienia. —

C. Przy schłabowaniach posturalnych, mianowicie
nie radnych kulami r drut, a rozłazera przy
romiary: erę: mięk: przy wtórnie ogólne powł
ko są natłuszczone. — Skaler: awersie się oż cięga
Dali nie ogarniera się się omięsem do tkłowa
Punk, tudzież przy postępnicy Gangrenie a
przyerowieniu: przy wyrodek fałszywych sty
postaci przy stanie rozkwitowym, choroba rony
kła gęstych emięci sąga, mię się olna poraż
nia, więc w takich rozach wyrę się amputa
cja, podrażnia, iakby się rdawato bydr potę
Ponieważ przy bęgu krwi p. głowoci galbra
piewanym mniejszego rozdu galbrałi my
drae r pnia nad mięsem adata morawia, do
taworaig krwi do erę: mięły potężnych, poraż
przy Gangr: erę: gęstych amput: naleri argon
mię zięci, tak, iakby piern tytna obliczonany mi
tyt r tawiaony, onie aby leiat nad rony amput:
w rarie porażonym kłidy w mięsem rozawia
naczyń korotok istnie debrz nigo korot: oln
wicie się naleri g. iereli erę: przyleg: są skaler
z. kłidy przy padu amput:; niem się Gangr
od granicy, oitidy Cęci w mięscach prowaai
sie tak, aby raigła nacy nie powyryły mięsc
chorawitego, celem naber pioraice sobie pro
anania seian tych nacyri. —

g. Są wypadki ran ciętych tego rodzaju, iż eręci
nie uwarac moim nacy przytłumięca. Opr: Ampt:
bądź wty obcy mię 1400 spem ampt: eręci rony

9. Ponieważ erasem pewnym tyłko spo-
sobem operowania, osiągnąć można al-
teracji, jest to dla tego że mi bardzo
prosto da się zastosować do każdej
mięśnia, na przykład, rozciągnąć natę-
żony mięsień zastosować do sposobu
operowania, czy odwrotnie. —

10. Ponieważ iakoś toż samemu oznacza się
wrytelnosć, która jest wista od mię-
śnia w którym amputacyę przedsięwzię-
to, jest to ułudzie z pracy, że iż się
mi nadzwyczajnie w skłan do Opera-
cyi obiasa mięsień do którego nastoso-
wany, myłtwać i nastosowy sztuczny
ciężek przyświe natęży, — a ma-
tynch więcej się uwaga na kółtelnosć
wzrostu przyświe sztucznych obiasa
mięsień, gdzie od kółci porostu, pot ca-
mortalny iore ad cę, celem napowin-
nie się, i ptaszczyrny kółtelnosć, ad cę
do potierania się. — Wzrost toż samemu kół-
telnosć występującego, na którym drugi raz
amputacyę myłtwać natęży, trze się tam
w ercziach mielkich, gdzie z pewnoscią
wiedzieć mić można więcej kółtelnosć
erymia i podwignania. —

Łaciorę to pozostać do rozmiękania, czy m
razie wyboru korzystniej j on sę chorą odzie
w stanie: Exarticulatio: / 4. odzie ię w cieżkiej
Amputatio: / —

To z pewności nigdy nie da się rozmiękać, bo
dotąd powiadano o wyborze Exarticulacji
nad Amputacją, nie można uważać ka
wiższemu, terapeutyczną, razore iednak q
można dać pierwszeństwo Amputacji pr
Exarticulacji. — Lecz wchodząc w szczegó
pamiętały się można

1. Czy w razie odziecia środką stopy, natężył
artykulować między osse scaphoideum i cuneo
mes 4. i 5. dalej, choroba postępuje, czy natę
ży exarticulować między astragalum i ca
leanum, czy przeciwnie Amp: na górn
2. Czy przy podobnych stanach chodzących, lepiej
j exarticulować gołęń i kolan, niż am
putować podobnej części uda? —
3. Czy przy stanach kładących Amp: lepiej
j odzieć środką rękę, przy korzeniu ręk
4. czy lepiej odzieć korzeń przy przedram
nie, niż amputować przy nadramieniu? —

Co do 1. / z uwagi, że nie można ię iść iść mo
żna. Kości środką stopy, mamy odzieć ko
kości klinowatych, wtedy ograniczyć antag
mówi między tylnych i emisję rosnąć
tem bardziej iść iść iść Exarticulacji
wyię się przedsięwzięć, gdyż nieomylnie
pasożnica poraża Calcanei podług

Do pierwsza, sprawi, iż amputowany w l. rarie
 chodric' będzie na bręgu i przedniej piasz-
 cynie Czubie i kłosei klinowatych w
 ostatnim ras' rarie chodric' będzie na dol-
 nej piasz. ofis calcanei i astragali; - rta-
 nowego ras' stanowiska kłosei korzenia
 stopy, Patwo więc można, iż ortowietki
 długo chodric' nie będzie mógł, iż długość
 koroni stać się niejednokrotnie i nadzie się przy-
 padki, gdzie by przeciwnie nastąpiło a to
 wtedy, jeżeli w bęgu leczenia Astragalus
 zachistowat się z kłoseami gdeni. —

Co do 2. — To odpowiedzieć można, iż choć
 na nowo Sextor z podobnego przypadku
 w nosze, raczej exarty kłosei w kolanie
 jednak exarty kłosei ta, więcej przedsta-
 wia chodric' nie poruszonych, niż amputa-
 cji w części dośrodku uda; — w tym ty kłosei
 rarie wyjętek można zrobić, w którym
 Gangr. tyle umiarkowana, iż dośrodku kłosei
 stawu kolana i przyniem rozgraniczeń
 nie nastąpiło, tak, iż iśsiere otępi części
 mięśniowej porostato w stanie zdrowym,
 ile trzeba do obrzydła piaszycy stawu
 kolanowego. —

Co do 3. — Wbrywszy się, prawie z gładką, i
 lepłą iast exarty kłosei rta w stawie
 z przedramieniem, niż amputowane w przed-
 ramieniu, a to dla tego, iż Exarty kłosei

Patrzeć wykonać i mniemy jest obracając
z nim Amputacja. —

O sposobach amputowania.

Takowych seile biorge j 2. —

1. Cicie Koliste i Kreglowe. —

2. Cicie pstatowe. —

Co do pierwszeństwa ktorymby sposobowi
w przyrządzie naturalnym. — Teisle biorge
nie miora jednego, nad drugi przenosić
po w istocie wypadki obu są tej same.
są atoli roztępienia, gdzie przychodzić
pierwszeństwo z Korysnością dla chorego, i
niezawieszanym sposobowi nad drugi; — i tak
wypadki te, w ktorzych odcięcie pstatowe
stosowniejsze i korzystniejsze od koliste
kręglistego są:

1. Kiedy przychodzić doinać na górny koniec
ciężkiej ręki, albo ręki, albo ręki, albo ręki, albo ręki,
grubości, i głośności, nawet bez ratorowego
Lytocisku nie dać się najsilniejszemu
Pomocnikowi odciągnąć do góry, o tyle, ile
cięcie koliste-kręgliste, mogło być przy
wzięciu uskutecznieniem, tudzież przy
cięciu kręglistem nie można by najmniejszą
ręką Lytocisku, ponieważ nie można wzięć
przyjęciu pstatowem, a co niedość j. wain
uchorych zastawionych, nie wiele krwi do
czenia małych, kiedy nie ma Pomoc
nika dość silnego i rodatnego do naciśnięcia

podobnego palcami z. Kychotkowim teta, na
konie Operator robia Ampurowy wysoko
na udzie lewym, nie mozna stanc na
równieźnny stronie uda adrowego, a tak
stoić myzarnie na intrudmione dristamie
ichybie miedzy musi. —

2. Moze Ampurowac w Ktarym Kuchotkowim
sen uda, i rudi brach rdutnego i silnego Pomoc-
nika, do odcigania cześci miek: lepiay j am-
putowac platami, mirlucicem Kolioto Kroglo.
Robi się odcigac platami tam gdzie sumie
wysoko odunac porychodzie i. gdzie dla Kala-
tra i. rodraiin skaleczenia amputacyi miz-
magazego z. dla silnego Kolu, ramie mia
gd jania odprowadzie nie mozna. —

4. Odcina się platami tam, gdzie na goleni
cześci miek: na prodrze, i na rwna. Bohu ar
do tuberositas tibiae, sz chorowite, a cześć tylna
i. ~~nowe~~ cześci mieklich j. rdoway. —

5. Tam sie platy tam, gdzie tylna 2. platami,
na danem mizysen odonka, wryskac
mozna doś cześci miek: do pokrozi na-
ny amputowaney, a czezo nie mozna by-
było wskazać Cizem Kolioto Krog: chyb-
nieby się wyrey amputowato. —

6. Tam sie platami, tam gdzie Operator spus-
cie się nie moie rperenoscia, ani na dia-
Lanie ryto cisla, ani na Pomocnika. For-
ny pien tetna naciskajcego, gdzie tuc
platami Operator robioray Kie plat,
Duzgi w Ktarym tetna glowne idruy

- robi w tedy, gdy u zarów podziurac moze
6. odkroinowy ten psat, gdzie tetno bierze,
nie wprzód robi drugi psat, ale tetno paruje
7. Leci sie psatami tam, gdzie przychodzi am-
putować w bliznosci amicysea. Tam Mos-
dla teprze przyrywaj, wie psaty moze
ciężci i ciężci mieli na odłamku dołnym
spowryniających, wie sie odłamka oszere
8. Lepiej cię psaty tam, gdzie sie ampu-
tuje z przyrywany sznurowego stawu
dawniej przy amputacji która sie nie
porozda. —
9. Lepiej robi powryniający Lehar, i cię
amputować gdzie psatami, które ma-
rozności wyrzagać, jak Amputacja
kolisto-kreglowa. —
Winnych rasi odaremiach cię ai kolisto-
to-kreglowe rastugie na pionowinow-
a rozonate odmianny Cicia kolisto-kreg-
o tyle tytko na wgląd rastugie, o-
sie dadzą do przypadku skaleczenia, do
stawi ciężci skaleczonych rastosować;
te rasi które tytko mię na celi, i rby an-
tora rapisać w oornitkach Chirurgii, nie
maize kotrysi w ramione, nie rastuga-
iz na wgląd szeregulniczy. —
To tytko o Amputacji z 2. psatami
można iozere wspomnieć, i w ponie-
war psatowany Kosa prze psatowan

nie tak. Także się jednocześnie rozciągają
 mięsień: lepiej jest robić z płatem t. chyla,
 ze skóry przyspiąć poidełkami cześci
 mięsień: z kosciami z 2. boków się go opatrzeć
 koniecznie, aby płatki łatwiej przystawały.
 Co do długości płatów 4. płatka 4. części
 mięsień: ciężar kręgi: oszczędności. —

Kawce mieć na pamięć, iż lepiej oż
 dłuższy płat robić, niż ochwili Oper
 nacji moie się wydawać dostatecznym
 do pokrycia rany, bo to z części oszczęd
 ności części części mięsień: mianowicie na użycie
 wkrótce po Oper: o tyle się skurczy, iż
 nie nadto mierzanie, a do tego pamięć
 taże, iż często nawet konwulsyjne napad
 łaż chorego po Oper: 4. Długie Dopięcie,
 lepiej kawce będzie, na wiele części
 mięsień: roztanie, niż na mało. —

Jeszcze to można dodać do Amput.
 ogółu, nie robimy wielkiego różnicy,
 czy to po przecięciu czy się punktowi
 ogólnie od rębienia anatomii oraz, czy to
 ter po przecięciu ich, przecina się pasmo
 na przetrzymując punktowi wśród od-
 cięcia Pomoce, i jednak tam, gdzie
 się kłamy wielkiego skurczenia części
 mięsień: nie od razu będzie odrobień skor,

anatomiczne, bo ta mniéj się kurczy,
prosić do nabycia rany po Amp: i
m. p. — "Dzielność Obracenia, i tak wynika
z Amp: i różna, dosownie do rozma-
itych obrotów otwórka na Amp: pier-
wotnego, do uwarowania pory olog. otwórka
tego względem ogółu, do wielkości rany
i odciecia wynikały do sposobu amputacji
4. modyfikacji jego, do gatunku Operacji
do stopnia obracliwości chorego, do sta-
nów nakarmionych Amp: i stanu umy-
ślnego osoby, na Amp: i stanu umy-
ślnego osoby. —

Dzielność Obracenia i tego nieber-
piętność przyznaję, m. o. na tak
uklasyfikować: —

1. Najwyższa Dzielność odciecia, na
większe nieberpiętność i przyznaję
iż uda się stanu zdrowego. —
2. Następnie przyznaję samemu
re stanu; Amp: uda się iż to-
ręć części. —
3. Wielkość Obracenia i uwarowanie nie-
berpiętność: różna są przy Amp: iż to-
u da w innych miejscach, przyznaję
iż to- u da w innych miejscach, przyznaję
iż to- u da w innych miejscach, przyznaję

Nieberpierniostro Amp: nogoleni, rami-
 oca nieberpierniostro Amp: ramienia i
 przedramienia. —

5. Exartykulacja kości środkowych
 palca piątego i środkowego, równa się
 nieberpierniostro Exartykulacja kości
 środkowych stopy 2. 3. i 4. —

6. Wyjęcie re stawa stopy. —

7. Wyjęcie re stawa ręki. —

8. Amputacja kości środkowej stopy 2. 3. i 4.

9. Amp: kości środkowej ręki palca obrotu;
 i środkowego. —

10. Exartykulacja kości środkowej stopy 1. 5

11. Exar: kości środ: ręki: pollicis i auricularis

12. Najmniejszą j. nieb: po Amp: rękod: palca
 stopy i ręki i wyjęciu ich re stawa. —

Wredak, rękod: wick porządek ten nor-
 malnie j. ustanowiony, podług: godności
 ręki, wydana się jednakże dla nie-
 możliwości obliczenia indywidualności
 chorego, dla ukrytej Idiosyncrasii od nie-
 stopniowanie to często wartości traci;
 bo Exartykulacja np. pollicis może
 być podług: ręki z nieberpierniostro;
 iak: kiedy się od ręki rami i nogoleni. —

Wegółe przedsięwzięcie Amp. u subie-
któw uciążliwych i drażliwych, porówna-
nych, przy rękach innych osób, z. in-
dywidualnych okolic, Amp. pomysłowy
się powodzi. —
Lakhotnicki ugałuje się na rękach
Celsa, mójmy o Amp. i tacy mójmy
mójmy quidem, sed unicum auxi-
lium; aby ię jednak nadać ię Lakhot-
nicki pewność i uciążliwość, trzeba: —
aby nakarać ię choroba, byta cry-
sta mójmy, i by choroba mójmy. Płoty
mójmy j. stan nakarać (per: byta odda-
lonie, i by o samych przedmiotach i gasta-
by Lhazie iście rozważały stany nakarać
i raka. — i by wszystko, co Lakhotnicki mójmy, mójmy
j. choroba, do Lhazie o dalekim zostate-
i by mójmy o choroba, o powrocie mójmy,
i by. n. na krysi mójmy sprawi — i by g. i
i by traktować utracie kwi, i by n. mójmy ta str-
ta byta powrotem — i by powrót. Płoty: byta o i
mójmy o ograniczonym — i by choroba mójmy
do Amp. byta utracie — i by Opatry: i mójmy
i by Lhazie, o powrocie byta o indywidualności i

do i jamien pro Oper: sie wydarcie, czych - aby tegoż,
znattonie poruszenia umysla i ciata z poprzedniego
staleci: przed Oper: ustaly, a umysl chorego przety byt
zawieszeniem w Leżeniu i prekonasy chonierności odci-
nia cztowika. — Postugano, ze z amputowanych wy-
szka wyzyskanego, wzecy umiera, nie z wysza wyz-
yskiego. — Zowere i to moine dodac, ze trerona
Oper: ze wysostkich rdarenia, gdzie diagnosis
j wyzplowez, co do zabawienności i co do skutkow, po
wzyspiwaniu podpadać musi; leci to uż wyzost-
si nie kinnigosa, bo iż moine porownać rlehan-
stwami stowez ersto porciwony rydunemu rolyz skutch.

Secretnie przygotowane do Amputacji

Przepraszam niepotwornie, ponieważ będe, jeżeli czas i do-
li się po temu, przyprowadzić między wyjątki cięte
do porządku, iakoż Biegunkę natury uspokoić, skórę
suchą, paragonizować skórę do wypruconej; - powścią-
gnąć za nadto obfite poty i Konwulsie; - umysł prze-
wariony trwożą, niechęć odrzucenia i powściągnięcia
choręgo skłonionego w tym stopniu, iż ma być am-
putowanym, nie dopycha, ani od suery byłoby ampu-
tować bez woli na pobojowisku, w tylnej linii poty-
orki, nie opierać się bowiem Lekarz, jeżeli amputacja, gdy
długo przedtem nie rośnie na miejscu spohieru, choroba
skłonionosci podnieć w tym celu, bo się nie da, a jeżeli
ni, lubo j. wskazuje do Ampr. wst. 4. 8. gdy r. po skale-
czeniu, nie będzie więc byłoby choroba takich pow-
rót nieczarni Ampr. nadzwyczajnie w potrocinu wy-

ranizje i t. p. bo nie wystadac trudzi sie chorego.
Co do Opasania. — Ponieważ uleczenie

je 1.^o intentione j processem najkrótszym i naj-
pewniejszym, aबरpiceraicym ad skutkow
nieprzyjemnych, jak ~~korawienia~~ korawienia, prurypienis,
necrosis, wygniszczenia tronu, wystawiania piersi
i najbezpiecz utworze more tronu do przystarie-
nia ciotka sctuernego, poreto prima intentio,
rawne sie ma przed sie brac; i woli ~~czeci~~ czeci mi-
stke inne obolownosci stegum sie niespru-
wia i iezeli czeci mistki tyte nie awerodono,
irby prima ocenia nastypie miska. — Le-
poniewaz opatruije na poiednanie spiersu
kole pionoro przepulowana, gwałtownie drze-
ni czeci mistki, iezeli wspólnie kochery
czeci mist. j matz, prito tak nastaga ruty
opatruije rai pierowsy nakry, i nawię, ponie-
ramiast poiednanie spiersnego, naciokiem
wzbudzi sie odzysk mistki i da sie powod
do chon: 4. Gangr. Opatruije rai 3. 2. 4. silniej
wolno opatruije. — W szpitalach i w praktyce wy-
wistny, pierowsy opatr: bezpieczy by to wstedy
rak Pacac; kiedy korawienie nawet z najdrob-
niejszych naoryn sie wstrzymato, a nawet
pasy bezpieczy do poiednanie nie wpród sie
ratory, dopóki nie ustapi korawienia
po wycie poprowadzic na plasterginy.

any, mozcnych gazek w V. rymney, tym
bawiem sposobem ruberquora sie rana od
kwi or. Rymney, ktora roztawiona pniek
dra poiednaniu, tudziez tak rymneyory
sie odczyt traumatyczny i usposobi do
candatu dimfy plastyczny; - w tym rymney
rany, kiedy sie tylko skory osuszajaca, choc
sie poiedna platy skory pasami lepk. lequy
nirye. Okladan rym: bo inuacny przydeu
natorowy Opatrz: sie, po okaranie sie
odczyt traumat. odyci Opatrz: tak sobie por
typic iakomy poiedrici, to j okladac rymney
Ladaniem Opatrzienia $1\frac{1}{2}$ j usposobienie or
sci rymney do poiednania, jdyr samo po
mane ptaserym tak obsreony, siebie bio
ryc poiedrici nastupie. - Dny Opatrz:
umarae, aby ile bydr more iedno roene
czy sie sobe sie stykaly; - z tego wgladu
umarae moina Opatrz: iakb talczy sie
Opatrz: bo to kicnie odrym traumat.
nadaie mu stopien rbaninnego z misr
czygo, usposobia rany rana postae troni
i j rymney rymney iak sama Opatrz: tak
mryc moina poiedrici, i dricanie iego
ma byde iak rymney Opatrz: i
keer Opatrz: rymney; - odrym rymney

fl. ości, nie ma nadawanie ani ogólnego ryćcia,
ani ryćcia rany.

Opatr: ma ograniczać proces. Rop: napobud
que magromadrenia rany i krwotokom nawi-
stnym, cysej miś: przed łosię utrzymać dłu-
żej tronu i iad. najmniejszą bliznę.

Łazarzenia wśród Operacji

1. Krwawienia niebezpieczne, bliznyby można
napobudr, pochodzą z r. z domniennego braku
naeryn z r. mylnego potroenia cylocisku,
ze słabego dratania cylocisku, z pęknięcia
człłowego łasmy z r. niestosownego nacisku
cytotokiem z: palcami, wtedy Pomocnik,
iżeli nie ma łosy rogowości i siły, opuści
przenaczenie swoje i nastąpi onym bieru
p. 2^o żółci cylocisk rle ścisła, mocniej
rasmubować i łepić nawet, aby sam Oper-
ator naciskał, a innemu Operacja opy-
kować należało.

2. Brak Krwawienia z naeryn doobnych,
które należy podwiznać - to pochodzić może
z kurwego ściągania cysej pta oerpru-
rany, z omilenia z: trwogi; - więc należy
chorego uspokoić, pokrepić nimem pta-
neryny rany obmywać D. ciepłą, dopóki

się krewi krwi nie wzmoc, co gdy
nastąpi podrażnienie się przedsięwzięcie.
Zielni bardzo mocno ~~stwierdzenie~~ stwierdzenie re spili
notedę nieprzeprzeżone podrażnienia ma
czyn, na spł. przystopy się kompresji
kain: rmaci: Wzmocnienie wiy i się smolek
torek: pomietre napusci się wicie, tma
skropi się L. rini i pospiesza z Oper: a
w tym razie lekar ma uniknąć pro
owny straty krwi. — Zielni się skarciu
czajania, rdau się kłkhanasie kropki
Kelpic. Spis: sulph: aeth. — a ponieważ
pomocnicy czesto dopuścić się mogą uchy
bia, preto wrod dratania lekar ma
na wyzstke rrrucac uwage. — Corych
mispok. tworczimych, od buli i zrych
uspokoi się łagodnem premaricem,
precionie chorym, który z hero, ornego
wydzenia umysłu nie chce okazywać
bodu, nakłacie się igrec. —

Zarzewia po Operacji.

Wzmocnienie nastąpi — Zapale na melle
s. ra mate. Ostrzmiatość — Propicnie — Do
pimie topize — Wyłania i rozlanie się
sax ciery w ranie odosobnioney, Do po.

60.

chen, saigac: Rōia - Gangr. - Ertisomus
mūysom y. ogōly - Tworzenie się robactwa
Gongorka rap: w wysokim stopniu y. gang
stryerna y. nerwi y. nisierga - Kaput.
pluc, a erasem i trzewiów brzozi: Kap:
ryt y. teta - Tetanus - Wywołanie gęberusta
wychodzące z miaroty kōci - Caries - Necro
sis - Wystawianie kōci w skutku zbitnego
skurczenia cielec mięs. y. stopiania się
oszczędzonych mięs i skóry - Gangr. -
Wystawianie kōci z tronu kępliste, mi
rabliu: Leniny procesz odnowiania y. ra
bunty - Wskrzeszenie tronu - Oczyszczenie
Włósy - Stan chorowity chorego po Wyp:
ka nadto wielka kłopotliwość - Gangr. męj

Secretnie następane w ogóle

Skoro się Opatr: ratory, chorego się z os
trurnością przenosi na trochę poprzednie
oro uwięzione, nakciwory, i aby wera się pro
poszenia odnag i pnieć nie poruszał, da
ć mu się mięseć do sporyjaki osobie,
spokojnie, na 2 oświecone, w Kłomby po
wzięcie było do 16. "Reum ognani, po
ciem nakłada się Lycopis w sposobie
nie remizym chorego, aby awarii
Konewienia ratar go było można

zaczynając, trzon okłada się w potłuc
w którym by omiesza były mąka i
rozwałniane; - eretek ułożony opatrnie
się przynajmniej obczepionym, na który
się kładzie kotłowa. - Jeżeli by chore
przed Oper: nie otrzymał Opier:, da
mu się ięć 15. do 20. kłopot. po Oper:
Niekiedy w krótkim po ułożeniu ma
łóżku, chorej doznać dreszczu, zimna
wzrostu przykroć go ciepło, i nadać wew.
filitranek Herbata z. rosolu. - Następnie
trzon okłada się iem T. nie błądząc
się nieładem w plasterkach, rany
z nieudostajnego, kurczenia mięs
przeutych wymiennie mogącego,
bo niektóre są, że kiedy się płu
tam odciąga, wtedy wyrwie T. rany
i nakłanane, lecz to j. mylnie, bo
cofanie się mięs może być z obu
stron udostajne. - Ponieważ ad
eryn traumat: radko się wstawia
przed godziną 8. i 10. proto iść m.
nudermycznego nie wlekania, mo
na dać parę filitranek rosolu. -
Do wstawienia się odrywa, wro
ci urazę Operato, i by ten odrywa

uregulować do celu spisanego powodu:
ile można w całej plaster rany. —
Ponieważ indywidualność każdego
jakoś pociąg i leczenia należy do
osobistości stosować należy i prawda
ogólnego leczenia podać nie można,
choćwar należy użyć z powagą leczenia
nie ~~podaje się~~ ~~nie~~ ~~nie~~, chłodzącego,
w innych razach ostab. i. myśli i
wzbudzi i. wzmożni i. crypto usmier
cożym nerwowym. — Powszechny
d. b. i. przypada w ogóle użyć postępi:
chłodzącego i uspokajającego, w tym
celu dają się Rosoleł. cienkie i kaszki
gotowane owoce, na napój Orzade,
Limonady, naleca się umiarkowane porcie
tore od 15. do 16. i spokojuć umysłu
i ciała, radzą się w potrzebie Cze
my, radko kiedy przychodzi w tym
percepcja, użyć postępi. crypto ostab. i.
wzbudzi; — jeżeli operator był umir
walony w pierś amputować, nim cho
ny przeszedł do przytomności i. i. i.
li sama Operacja chorego, w tymże w

naprawa, wtedy wolno wzbudzić siły i
go i rywnie, nie tylko lekarstwami, ale
i psychicznie, wolno dać Miliorek dobre
go wina, lekkie piwa, pancer, rancar po
Omp. W dalszym postępie leczenia,
radaniem j utrzymywanie porządku porządku
waga: napomocą strosownej diety i lekarstw.
D. 3. 4. 5. i dalej radme ołobierne" noar:
nie nakazuje wreszcie odjąć Opatr. ta
kone odmocowny B. iępię się odrymnia, te ię
pasy lekkie, które iorenie dobre trzymają
nostania się dopokół są rywnie odry. — Później
odrycin piewnego Opatr. storod się, aby m
wymac outli podwizkoway, dopiero pod
5. 6. wolno podwizkę, z gatunku spróbować c
nie odrynie, a 10. 4. 12. 8. nacizza ię pod
wizkę z pinia, przekonac się da, cry odcho
Dzi ~~z~~ nie. D. 9. 4. 10. odrymnie się ryto
aish, wreszcie Opatr. radada się scisle
pojednawere, chyba gdzie coś odrywera
nego Opatr. rmiuic nakazuje razwa
idnalk tak się układa piaty, ięly tron
Dobry uisłac i porędn. pryspi nęć. —
Opatr. przy procespi Rozpiana, ma być
x na ięgonie nri przygniatęce, rancar

iudnat. scitacie ma cresci mihi: i rby mi-
 jny niemy ropa ni mogla sie rolowac. —
 Postroyt by re procesz podai: nie wsey-
 driu iedno staj rby sie oblywa, ze ropa
 nagromadzae sie more, roztani sie punkta
 najwiecej rany, do scisku ropy, otwarty. —
 W drucei, u podrostkow, mniej sie naciaga
 Opator: nie u doroslych. — Zerkni skuli: Kto-
 mi sie brugi rany pokrywa, naprowadza
 iz sie v. Ung. Ceruo, budzi cioko, dla latniej-
 szego odcymowania Opator. Tron napla-
 tuj ocywiera sie postroykianiem 4.
 cipta, skrepta krow, ropu 4. innu, ciur, na-
 gromadzaie sie wprostremiach plaster-
 ucygn nannych, oddala sie Nastroyk. 4.
 cipta. — Gdzie Rop. j. ma, a ractem rana
 lezy sie podlug myśli, lepiły j. opatruj-
 wac ~~niepotrzebnie~~ tytko co 4. 8. godz: — Sko-
 ro sie rana odliškita, opasui sie tym
 samym sposobem lew + ierore naci-
 kowo p. 3 tygod: a skoro cysci odryskaty
 pewny stopien izdnosci, brugi koci
 przepitorem ractaty wescane i ra obzglu-
 dy sie i callus pulat miysa spikowce,
 Tron naley obzglosci i pectnosci, co
 we 3. 4. 4. Misiu nastepnie po Ump:

uda, wtedy wolno. j. przystawic orlonk
stwierny, bo wpiem moglo by naszkodzić;
precywnie, gdzie orlonk słu do kolana
się przystawia wolno iur i. b. tygod. po
Ange: — w piernych dniach Angusto:
opierając się na kluczy p. godronu. 2.
potrzebnie chodric, odijmując rary, słu
ro crui w tonie nacisk kolisny, wy-
przianie, — niebawnie rury, klic chory os
mialad się i nalywać rycerzności do ury
ia orlonka stwiernego. —

Co Do Lgawisk po Operacji

Wzrostu zalega się oćnie — ić
Kron sgerę się z gatunk. tetrę co poroga
można z ilości Kroni stosownej do stęgi
ci crasu, polewanie II. lod. p. klicha
gudra wystawia do wstrzymania, lea
skoro wzrastanie j. r. p. tetrę, odzic Op
crisei rblirone rozprzadric, Kron skroy
ty odzalic i podwizrac ićnie można;
w czasie tego dristania wryć się Nacisk
tyto cisk. 2. tyto cisk; — lea ićnie ty II
rim: nie wystawia 2. mickone gat
nie nie daly się podwizrac, wtedy można
wryć II. lod. ra pomoy galki przystawia
na, samey rary i naciskując, do berquie
Stwa

63
 Eodorak, to poutę ponasie p. 5. miurut adnawine.
 noutyomie sie p. 4. 2. D. a iereli sie krowotak
 wot amil. p. 8. 12. D. po Cper: wotedy nie inuogo
 nie porostowez, iak y. podwiraciz tuu sporobem. Hwa
 tom. 12. w adlegosci 4. adize ortonek ora nowo Leer
 po podwiraciz tuu sporobem. Hwa tom, to sie mydow
 ia yalgabli uboone, iur sie w cressie owowem ty
 u miu choi sie podwiraciz krowawinie tom, wotedy
 mydowez naczal, aby w miu sie poroczila. Hwa
 w krowie thap: krowie oblietowato. — Godu
 krowie ora podwiraciz o braku spozrytoci t.
 tu, y. ie topicim y porogoz krowawinie, wotedy
 rada w krowie krowie miu wotedy. — Cichu
 wotedy, wotedy tigo, aby big krowie porozpustito.
 Godu krowie: wotedy wotedy, ie podwiraciz tuu
 wotedy ora miu sie wotedy wotedy: p. co na krowie
 wotedy sie tytko krowie wotedy, iur wotedy
 wotedy wotedy, ie nall w tych wotedy, nall
 wotedy wotedy wotedy wotedy Lehoru. —

Thyficienn rąpina, olieganij, poskep: Atodi: opatru-
nie mowolnia u odjaci, pary teplej popusnie, okładami
rinnie, enem: wypróżniające, rrimo - nad ko pijawki,
weneck: pylis u krowichy. Maty stopien papalecia
pobudrasia p wrodki wzmacniające wzbud u porzynie
opatruenie suchy, cepte ogneiwające: wate, arom: sta-
niesz, jęci ię torpor witawia, drarim ię i wima-
cia, rewnagrze okład: arom: a kramfory, napusnie
przyrząd arom: miedzan - a w miedze, potnia ię
erutorii: draril: modyfikuje ię wrodki.

Róża r. nieczystości gastrycznych, wymaga mod-
ki wypróbowanych - z rarietatem, ^{okład: sucha kamfrowa} -
ce gdzie j. traumatyza, nawet okład piętne.

Gangrena typ: szpitalna i kataralna analityczna
Rein opatrunkowa — odnowiona po amputacji — z miedzi
formie leżonego zapalenia, z erytemu, silnego opo-
nia, wymaga stonowych środków — Na renowację
auid: miedzi, delutium, powolne i gęste, chłodne, różowe
i napuszczone parą solną (metoda Guyton mori.)

Erytem ogólny i miejscowy z erytemu i analityczna
i podwyższona, tempes: i miedzi zapalenie miedzi
winny miedzi;

Stworzenie sztucznej kręcenicy

Coremorphosis.

Juz od lat 100 Thomas Woolhouse powziął myśl naradzenia ciemnym, za pomocą kręcenicy sztucznej. — Wkrótce po nim Cheselden stworzył morinosę, wytworzenia, z korzyścią przypuszczając wzrost inteligencji, lecz 14. maja 1800, który nie przypominał sobie, czy się ślepym urodził, czy przy jakim wzroście utracił. —

Tak nadzwyczajne powodzenie, pobudziło chęć do naśladowania w środowisku, lubo sztuka, coraz + granice swoje rozszerzała, skutki jednak nie pozmyślne, tak rzadkie, iż nawet morinosę porzuciła się Cheseldenowi zaprzeczono. — Najgorliwiej zajęto się tym przedmiotem przed lat 28. w którym czasie, wspólnie z podzwiniem Ophthalmiatryki p.

Adama Schmidta postanowiono się nad stanami chorobnymi tęży, które dozwalały tego działania. — Kar obudziła chęć uprany chorób, ale wkrótce tyle zwolenników znalazła, iż ta myśl N. L. na szczyście doskonałości stępnęła, a tworzenie sztucznej kręcenicy tak niedoskonalonem zostaje, tylu sposobami i narzędziami wzbogaceni, iż trudnoć morina, że x mamy sposobów, niż użytych mych kręcenic sztucznych. Na ma atoli ustanowienia próżnego, bo wybór postępow: i narzędzi, nastojony dopracowania indywidualnego, może być nader korzystnym. —

1. Zakazy ogólne są:

częste zamieszanie berwzględne, statyczne, tany chone,
gora się nie da żadną miarą pomysłnie operować,
a ożwiadanie ra występuje pociemnienie, uwaga
nie może być pożądana:

1. Lupinus Amaurosis, a przynajmniej najwyż-
szy stopień Ambliopia amaurotica. — Doro-
sumiemy się stanu tego, z braku uerwien światła,
tak, ale i w tym doświadczenie uerwien, i brason, i wód
najwyższego braku światła, po Oper. retynę ciemną
znadowano; nado często stanu tego porwać nie można.

2. Glaucoma dokładne tj: raciemie błony siatkowej.
i: całej ciemnej siatkowej.

3. Wrethii warniejszy: cierni: Lig: ciliaris, corporis
ciliaris i Systematu nervorum ciliarum — cierni
nie objawiają się wprostociemni, przy braku
błony rogowej i: Hapophyloma ligamentum ciliaris
i: kór kolorem sinym koniuntiwę do kór błony
rogowej. —

4. Wrethii wyższy stopień Atrophia et Sympthesis.

5. Wzrasy stopień rozdziału kuli oka wodę — nierówności
i: Wzrost — skierowane i: stward: kuli oka.

6. Osłabiona hiposfektalmia ogólna oka, w skutku
której choroida, i: rozstata porostowiona — rozdział
i: kuli oka po Lup: dyskr.

7. Raciemie bielmore całej błony rog: — rozmienię
cierni z bł: rogowej.

8. Nieuleczone wzrost dyskrasya, rozstata całej
myczna w oku w postaci asthenicznej i: utry-
myczna ciężka gnaty stopień Lup: scienia.

9. Exekti 1. oko z drzew — a to dlatego, że trudno wybac-
zyć się może, iż by rzemie w miejscu też
prawytem utworzyć wolno było, a i: też w
mięscu też nie można utworzyć,

najpomyślniejsza Operacja grozi zgubę oku i
miał wrodek i ostateczny spowodował wyprowadzenie.

II. Stany dočasnie zakazane.

Są takie, które w obecnej chwili zabraniają Operacji
po usunięciu przeskłód, wolno ich wykonywać.

1. Łacmienia błony rogowej wzrastające. —
2. Składy odrywno tranumatyczne: czy to po Skarbie
i Operacji — znaczną obradliwość skóry i skłon-
ność ich do przeistoczenia. —

3. Kapi: obecne oka lubo małe, z następcą dysplazji:

4. Choroba ogólna — tj. osłab. — powrót do normalności
i dysplazji: niemiępliwa, ale dająca się jeszcze uleczyć.

III. Stany zakazane względne.

Są takie, w których doświadczenie pokazało, że
raz pomysłnie, drugi raz bezskutecznie opero-

1. wano — temi są:
Łacmienia błony rog. na t. linia przerzucanych,
lubo nader trudno + zrobić skuteczną resec-
cję i jednakże możność pomysłnego skutku,
jak dowodzi przykład Demura. —

2. Wzmocnienie przeistoczenia teoryj w Polone i
składnie. — Stany te lubo kary się domys-
lać iż teora choroba na nowo obrabiona, łatwo
wyga linie, plast. która otwiera skuteczną resec-
cję, jednak ogólnie przeistoczenia te w
szkole Wiedeńskiej nigdy nie wzięły
zakazane potierone były. —

3. Wzrost młodszych ciał: również zgonu
limfocytów, nie edymnie nadmierne przywrócenie
wzrostu — podobnie młodszy stopień roz-
działu zysk, Atrofia — poniesienie ob-

tości kuli oka, dozwala Operacji. —

2) Nawet w znacznym stopniu asthenii oka i org. wystrząsach widocznych, jak: Skopul. — Syn-
plid. — skopul. — wyścięły pomysłowy widriano skla-
tek, nie Ophthalmiaty, Wideny obliczeń. —
Wtedy nawet złośliwe nie wrabianię wykonac
nia skutecznie xoremiey; w ludzi dysko: onrem
unwrać i morina ka rozrodzka oddziaływa-
coby od oka xoremiey; rawnie rawnie po Oper-
ie, dany mocięty tego drwinienia. —

Wale kaleriy na miyscu, gdzie xoremiey mały
rozbior, aby swie cyrnowe dobrze odbywać,
a iie stosowane do stanów chorobnych błony rog-
towej i xoremiey takowe bywa rawnie rawnie
dla ocenienia wartości; sktorene xoremiey rozbior-
niemy; na:

1) Skopulowe, których potw: rblina się do su-
bliska naturalnej xoremiey, to i w posradku,
mice ku osadzie nosa. Skopul rawnie 2. typu
dada się rozbior xoremiey, a to wrgdzie cicia ro-
bionego najbliżej xoremiey bregu tery. 4. dola
nego bregu. —

2) Skopulne, których srodki unaidnię się wrole
przechodząc między ^{regiem} xoremiey i obwodem tery. —
Takowych da się rawnie 4. w koncach linii sub-
krypiujących. —

3) Skopulowe 4. boerne, rozbiorne w obwodzie tery,
ery, w konie oka tery rew: 4. rew. gdzie w inny
miyscach powali rawnie rawnie błony rog: wst.

swietla wzbraniaia.

Wartosci tych Lzrenicy tyle mozna po-

trze w ogole, ze sztuorna migdy naturalniey sie
wyrozniadza, ze srodkowe sa najlepsze, smietli-
bowiem najmocniejszy i widzialne w punkcie
luteum Laemeringi, odtad ku obwodowi retynny
ciuci to sa mniej, sa zarwie stgo wyznika, ze im
odlegly od tego punktu promien srodkowy pada na
retynne, tym slabszym bedzie wyrok, - im x ratem
zrozenia od srodka sa oddala, tym mniej sy bedzie
wyrok, i chory tyllko rzepem patniec ~~moze~~ mo-
ze. przyorymy ograniczania wartosci tego drzatania
dla ktorych Lekar ma byc ostrzymym w
obietnicy:

1. Ze wiek kim i chory i cory, ktorychby stan wskaz-
zanie zupełnie od powiadac, bo imi rzepke na-
porod stany obla wetpiec kazd o powidzeniu sa
Operacyi. -
2. Nawet przy dogodnych stosunkach i biezacych
zasto to drzatanie ile sa honory, ze indywidualny
obrazliwosci tezy odnawce ni mozna? -
3. Wykonawczy nawet najpomyślniey, praca
bywa bezskuteczna, gdy ni niektore gat. zrozenia
pod pewnymi warunkami bardzo ograniczony
wyrok wraca i.

4. Zachodzi cos, przy tem drzataniu, iessere ni
dosc porannego, gdy ni wstrod najpomyślniey-
szych wrozb dobre sa nieludy udao i na drot.

Tworzenie Lzrenicy

Tworzy sie drogą pod siebami:

1. Przez Kaze,

2. Zennitox iuy.

1. Tridemia reueria reueria wypudni robie otwiera ciem Tridemia s. Corotomia. —

Cicum robi siz p Komorki przednia, narzedium trzem blony rogowey i do tego natury sposob Cheseldena s. 1728. przedstawia. — On sta Krotkiny w miastki o swoiem posie powiazan, stad siz roz wodem do miastania, re ciem wykonuwa tylne Komorki. — Najlepsze wyobraz: otem drze Lurinda ciem nam uwr iego Sharp. Ktore siz wykonuwa nozykiem w arblion, adnostrony w przewadza go w mięsie gdzie pozy deper siz igla siz w biu, trzymajac porozno listek no ra, a grubiat onego do siebie; — posuwa siz międy ligamentu ciliare i obwodem rewnustronym tezy do Komorki przedniej, a doprowadzajacy do bregu war: tezy, w śród wyciagania noia rola, robi siz ciem porozno w tezy. —

Sharp wynajac nozyka Cheseldena przebi ia blony rog: na linii od icy bregu, posuwa w komore przedniej do obvodu wewn: tezy, co faiz noie porozno, przeina tezy. —

Gerarda s. 1767. stanwia siz skalec: sovent ki w przewadzeniu nozyka sposobem Cheseldena, wolac prawy otwiera blony rog. i w pr wadziwszy nozyk do Komorki przed: przei nat tezy krzyzowy ptaty wypukle rozstajajacy siz, rozstajajacy obrazly reuerie. —

Maiani otwiera tezy na krzyz igla do siuany przebiac na blony rogowey. —

Richter wbiła noryk! Cesodena do kom-
pored: a stosownie do potrz: rozciągnięty
micy, przecina tęgę, porożno & pionowo. —
w ranie bicia, zmeńcy przecinającego, wbi-
ła nór w breg nacmiony stony rogowej. —

Beer 1792. przebił norykiem lanceto-
wym, wprost w nór rog: i tęgę, ukoś-
nie z góry do dołu, aby tęgę noryk była
rozamiona od bti: rog: a to dlatego, iżby bli-
na w bti: rog: nie emila rozemicy, p. rany
poprzeczną tęgę wyrzucił. —

Mountain przebił stony rog: noryk orka-
mi na równostor. trójkątny i w drugą stronę sta-
kone w tęgę p. samo ich rozdzielanie,
rozcina ją. —

Langensbeck w prowadza do komórki przedniej no-
ryk i g. tęgę podobny do Cesold. lecz nieśsey aż do
konca nosowego, a cofając go, przecina tęgę poro-
żno od brzośki kawn! do wewnętrznej. —

Weller przebił stony rog. koncem nora kator-
skiego, otworem wprowadza igł. kanyłową, aby
czyszczyć pionowo porożce, i g. tęgę kanyłową so-
w. obraca ją w osi pionowej i wewn. płaszczy. so-
w. i wewn. w nową rozemicy, dla rozciągnię-
cia rozciągnięcia. —

2^a Modyfikacya cięcia tęgę, j. p. ko-
mórki, przed: lecz w przed: odcię. w szczyt płaszczyzny

rogony.

Hejermann unaraige, ze berznadnego
otwarcia blony rog: drucanie rązge tery, na-
der + utrudnianem, otwiera blony rogony, lan-
cetem obciernym, przednia nim tery i rany i
porzono rozszerza. —

Reichenbach otwiera blony rog: w ksetaci
i xik: tnye nozem ksetera blonym od keta wemstr:
na kempstr, potem w lina w srodek i g: kataraktom
ulosci i gory do dolu. —

Oelthius roznica nozem blony rog: w lina go
z srodek rozpartly z roznicy od srodka lin obwo-
dowi, lin kontowi nuszorem iacie robi porzono.

Tamain postaragaige, ze rana tery porzono
bardzo cysto sa zamykla na powrot, nuzit iacie pto-
wore na co dmierat w prawe nozem keta takto-
wym blony rog: i wprowadzit do komorki przed: no-
zyczki korycione, otok dany z roznicy, przy
koncu nuszorem, rozcinat tery pionowo. —

Pollier wrazu tym, gdzie naprocin z roznicy
znajduje sa bielmo, po otworzeniu rogony,
wprowadza zglebnik rank: rozszerza roznicy
poprzecznie w lewo i prawo. —

Maunoir z robi wazy odcinek z blony rogony,
wprowadza nozyczki do komorki przed: przebi-
srodek tery i nozem ramieniem i za pomoc
2. cieci odcina plat z tery, ksetatu i tacyf:
ktorego wierzchotek i obracany do srodka
tery, plat ten mocą kurczliwosci wstapien
sinusnych tery, maigcych postac promieni,

parcia są i lusterzy, przynajmniej w rożnicy, w ledwie
drugą stronę, rozszerza się ciemno. —

Skimby przeciąga rożnicę kaeryfikum, tu strona
stojącej. —

Skarpa spłosz Maunoria chęć mieć rastrożną
na ten raz w którym przy tej rożnicy się kształta
Loor rożnicowy poprzednio blękitno: wprawdzie
komórki przed: nożykami i igłami kształtujących
się, skutki utwierdzone, ramie idąco w białą stronę
bliżej nożyków, przecina tęzę porożną. —

Tridolomia p. komórkę tylną ok.

Podług powieści Maucharta, Voolhouse są
wprawdzie igły kształtujące, iaki przytłaczanie
czułości, do tylnych komórek, ok. i konie ich styka
tu przedmiem przeliniarzy, miał rygiel nitki i płać
ramyfkajace rożnicę, i to sprawiedliwie myśleć
wobec straszenia straszenia rożnicę, iemu przyjść aby
Weinhold nożykami i igłami, usunąć
poprzednirożnicę, przecina tęzę i tylnych komórek
i. pionowo i. porożną, otwierając igły straszenia do
kardio czerwego wchłaniania. —

Adams porożnowo postępowat iaki Cheselden
wzrostło przecinać rożnicę i igły ich wzrasta
rożnicę, wielu napobur: ich ramienia: porożnie atoli
wprawdzie do komórek tylnych nożyk 1. lin: straszenia
iaka Rege i gostrzikiem prostym, ostrzem nieco wy
płym, i koncem obosiecznym, obracając ostrze
tęzi, przeliniar tęzę, potem posunął go, aż do otworzenia
nutrznego, a cofając, przecina tęzę porożną, rożnicę
z rożnow i chęć kryli ciemną przecinać aby podpa
sta wężanin. — Tereti rias cornea i ogólnie rastrożną
ng, nibiat nbi i gory i rastrożną i przecina tęzę porożną.

Barrata urwanęszy niemocność wykonania
cięcia kłowego, igły lancetowej, z tylną kom: przez
cieną pianową, i z tem cięciem potęgać cięcie porożne,
z tego stworzyć trójkątny wypisła. —

Frydectomia czyli wycięcie cząstki teary

1. Przez komórkę przednią. —

2. Na pierwiastku komórkę przednią. —

Reichenbach radeł, otworzyć rógowy, wycięcie
złazkiem kolostom cząstki z teary. —

Wentzel wbił noż kataraktowy w błonę rog: ra-
piera koniec w tęg i od punktu wbił cięciem na 2/3 długości
wysunął noż w końcu nosowym i podobnie, i tak przy-
wydobyć soczewki. Koniec cięcia w błonie rogowej
wypisła z tego patach z szed: który odina norygerka-
mi korywem, a soczewkę wydobywa. —

Tabatier ten są różni od Wentzela, że przecina-
ją róg: i tak przywydobyć soczewki, patach tego wy-
siłki, podnosi tylną Darswila, a pomocą szarych
cyfrow wymiata tęg w srodku i podciągając ją
ku sobie, wyniosłość tej, norygerkami w płasko-
ści regulem obcina. —

Arnemann radeł po przecięciu tęg róg:
wprzedać norygerki regule w płasko, i nim otwor-
zający wycięć, a przecięć soczewkę wydobyć. —

Travers pomysłu nie wykonał. —

Demours przecinał nożem kataraktowym błonę
rog: białym pokrytą przy samym brzegu, wpro-
wadził tym otworem małe proste norygerki, wsu-
wał ich ramię drugie w tęg, aż w cięć szkiełkowe i
dwoma cięciami wycinał przy szkiełku w połowie
teary górnej, czuła się. —

Sorlin za postępowanie równe się obrać Panu
Wentzela róg tylny różniąc, i patach teary wymi-

u karykum podwojnym, naciska go, aby 2
ciężci igo mógł odciąć nożykami prostymi,
odwrócić rękawem wydobyc. —

Najpodobniejszą do Guereana jest po-
wami Muldera, który podobnie przecina
blonę rog. nożykami krzywymi, tarcz przeci-
nie na pancerze są jak Guereana na rozstę-
pami są płaszczyznami kłty, płaszczyznami i p. otwor
rozwroty wydobyc. —

Weinhold podobnie nożykami igłkowymi
nakłatać nożykami kłopotliwie, wyjąć jak płaszczyznę
i ciężki strona wypukła nożykami, lecz uwarie
łukowski tarcz, przebiega ramie tych nożykami,
p. tarcz, rękaw ramie ruchome nożykami przyciska
do statku, wymiata tarcz, który potem ramie na
igł, kłucie między palcami tak widać tarcz wy-
prowadza na rękaw. —

Reisinger widać wyjąć tarcz, ra mięse
najbardziej mięse, które wyjąć w mię otwór okrągły
wykładać on nożykami karykum, których kary-
ki. Gaymnia tarcz i podnoszą i z postaci tarcz
kręgle, tak umieszczać tarcz p. karyki, nożykami
przy nich są rękawicze wyjmować. —

Wprandrie upodobać w udrzeleniu wiadomości
publicznej Kunstmann, który rękawicze
plim, i Reisingerowie, p. w. menistwo przyznać na

Tridectionia na rękawicze Romowski

Beer przecina blonę rog. na 2 linie, wyjąć
karykum i. nożykami kłopotliwie, płaszczyznę widać
tarcz p. otwór na rękaw: i wydobyc, ciężki odina, p. 2
tego celu prowadzić Blumier tarcz

szery porytki. —
Gibson odcina przy płacie z błony rog: na 2 & 3 linie
naciśnięciu palca wskazującemu z góry do dołu na ok. 1/2
co, zniwala tęgę do wypadnięcia p. otwór w bło-
nie rog: zrobiony, a cię ożeś wypadły odcina nożem
z ostrzem, tęgę przyciętą w którymś kierunku między do 1/2
rog: odcina nożem ostrzem sprężystemi. —

Waltter podobnie, nie wyrywa kcieryka od rzy-
nia gnieńca tęgę, p. otwór na 2 & 3 linie w błonie rog:
zrobiony, lecz ocknie, a w skutek parcia cięry
szklanej, tęgę dobrowolnie się wypadnie, a wy-
padła szery porytkami odcina. —

Tridectomia p. oku komórki.

Wutter przebiega Sclerotyke przy rogownicy, igitą do
obalenia soczewki, p. otwór wprowadza ramie tęgę
nożem do komórki tyłnej, ramie zaś lancetowe
ostre, p. breg błony rog: do komórki przedniej, tęgę
sprowadza obu ramionami obejmując tęgę, po-
suwa ją aż do bregu ~~tyłnej~~ rogownicy, i dwoma ci-
cierny mycina trójkąt od obwodu tęgę aż do
bregu rogownicy, płatek tęgę myciły, ha-
kiem wydołowa. —

Tridectomia p. komórki tyłnej.

Rippe proponia przy znacznym zaćmieniu ko-
mórki przedniej, lub przy rozciągnięciu soczewki rzy-
nie przebiega lancetową Sclerotyke p. otwór w pro-
wadzić nadzienie do Weinholda podobnie w planerze
nie rzytę soczewkę obalić, a tęgę przy pomocy na-
ciśnięciu palcem na błonę rog: nożem ostrzem i myciły.

Tricodialysis.

I Oderwanie skóry od Ligam: ciliaris.

Sposób ten w r. 1802 p. Sharpe i Schmidt ogłoszono
współczesni, dawniej p. Burri i Assalinigo
był wykonany 1784 r.

Burri igłą prostą, dość długą, do obalenia so-
roewki używaną, wprowadza p. Sclerotyke do
komórki tylnej, pochwila skórę na linia przy
brzegu roczniey rawerty, posuwając igłę do ko-
mórki przedniej, ratapia ją wierz, ku komórce
tylnej i odrywa z czoła skóry od mrowca ciliarnego
Sharpe wprowadza podobnie igłę prostą
do obalenia sorowki używaną do komórki tyl-
nej, komie igłę wkręca przy wewnętrznej brze-
gu skóry ciliarnej, do komórki przedniej, a poro-
wie igłę z góry do dołu od wewn: do zew: kęta,
odrywa z obwodu skóry. —

Adam Schmidt. otwiera przy pomocy błony
ocz. ^{na wewnętrznej} ~~wewnętrznej~~ — potem odmiunet skóry, sposób, gdyż
igłą katarak. z krótkim końcem, nieco zgęta, wpr-
wadza do komórki tylnej na 1/2 linii od orbicula-
ciliaris, pochwila skórę do komórki przedniej, a
pociągając igłę wolna do dołu, ku tyłowi odry-
wa skórę. —

Leveillé komentator Sharpe, to rachowanie
ostrożne: w obawiając się rać mianem sorowki do-
cniej po oderwaniu skóry, woli poprzedzić obale-
nie sorowki, a po mitalnem czoła skórę odrywać, w-
prowadzając igłę p. komórkę tylną. —

Podwójnym prulicium tarcz nige proponowali
Himly i Beer.—

Himly, piornieisthono odrywał tarcz, prostą dzi-
dowatą igłą, p. błonę rog: wprowadzoną, gdzieś
komórka przednia ciążna, wbiła igłą nakłapnie-
ną o konicie wew: do komórki tylnej, i przez środek
tarczy wprowadzoną do komórki przedniej, posu-
wał przec igłą do wew: bregu ciążnego, przy-
nim na nowo napuszczała tylną komorę
p. tarcz, a tak maig 2. razy na igłę tarcz,
lekkiem naciskiem ku tyłowi odrywał ją od
wzrostu. — Tereli tarcz doś blisko do błony
rogowej przylega, wówczas naprzd obala socren-
ty, a potem kiedy komórka przednia, na nowo
ciężę wciąg się wypełni, odrywa tarcz. —
Pranie współczesnie z Himlym i Bett

Modyfikacja. Dialysis.

Wprowadzenie igły p. błonę rog do komór
ki tylnej a zamtąd odrywać tarcz.—

W tym celu Souche Couleau wbił igłę Shar-
pey, a w komórkę tylną posuwał takową do
krota oka wew: gdzie sposobem Sharpey, od-
rywał tarcz. — W tym celu 61 rog: wew, kłupo prz

Dialysis p. błonę rog: i komórkę tylną.

Tak odrywali Schmidt—Himly i Beer.

Apsalini wprowadził kleszczyki spojazy-
ste, rybkowane, maigce i jedno ramie nieracho-
me, tyne, a drugie krótsze ruchome ostrze,
p. otwór w błonie rog: — ramieniem ruchomym
pruliciał tarcz, posuwał ją ar do bgu wew: i odrywał

Bonrel p. otwór w błonie rog. wstawiając
kacryk, podługory do Lig. ciliarę, odrywa
tęzę od niego. —

3. Dialysis p. Sclerotypę i Komórki ty

Rike w miyscu gdzie się Sclerotypę prze-
biega, podrażnia obalając sióreczki; przecina
Sclerotypę nożem katarakt. w prowadzą igłę
korymę po tylniej przeszerzaniu sióreczki
p. uierz sióreczki, aż w tył bgu ciliarnej
tęży i poruszeniem igły do góry i do tyłu od-
rywa tęzę, kataraktę, przyciska do tęży, aby
współczesnie obala, aby trzymając się tęży
stanowita cięć, opierając się ramieniem

2. Specios Dialyseos z wyprzedzeniem
i uniesieniem tęży - Fridoentley

1^a Uniesienie w błonie rogowej

Langenbeck poprawił, tem Fridoent-
ley, iż na 3. linii od miysca gdzie tęży
ma być odrywana przecina pionową błonę
rog. na 2^g linii, otworem tym w prowadzą
kacryk, ugięciem i odrywa tęzę przy Lig.
ciliarę, wydobytą na 1^g rano błony rog.
na rann. i między wargami rany błony rog.
wstawia tęzę odrywając i zabezpiecza od ram.
Nicią różnicą. —

2^a Uniesienie w Sclerotypie.

Emden chce za pomocą Raphianklistu
narzędzia, p. Sclerotypę, odrywać tęzę, uzić odry-

in pporadza, andery, bregi rany 72
wary ~~bezwzględnie~~ ~~niebezpieczna~~ ~~niebezpieczna~~ ~~niebezpieczna~~
Sklerotyki, aby się z nią rosta. —

Tricotome dialysis.

Tonegana podał do tego myśł, iżby się poryz
p Sklerotyki wprowadzić drywac tery a Lig.
citarie i kurii środkami się grze i cze, rozciąć tery,
Modyfikacja Tridodialysis + Tri-

Docetomedialysis.

Aspalinii odwrócić się odwrócić się odwrócić się
tery, wprowadzić iły cze p blony rog: i noryz
orkami Davila odina. —

Spisob. — Tridoparechysis.

Prucia ganie Arreniey z unierzleniem
Dziatanie to, wtedy da się wykonać, kiedy roznica
otwarta, tery białym środkami pokryta, pociąg-
gnywszy ją w miejsce blony porostowate, pociąg-
ta more Turpe do wroble. —

Adams pociągnywszy blony rog: naciskiem swego
Speculi oculi spowodować prolapsum iridis, cze
te wypada ujęwszy strzyżymkami wyciąga i
sere x i restawia, iły i z naryżami rany bto-
ny rog: rosta. —

Hamly pierwszym pomysłem wykonać pomysł
ten, robiąc otwór w blonie rog: noryżkiem sierpo-
wym, breg roznice tery ujęwicie haczykiem
i wranie blony rog: noryż. —

Emden nalecał unierzlenie bregu roznice
w Sklerotyce, rblirynowy go do niej środkami
naryż. po cze r. Raphianhistron, ujęwicie

ze ten bryj zwrócić się z tylną krawędzią
i wielki miedzy oczami rany Corneae i Sclerot.
Scleroticectomy s. Coreomorphosis
per choroideam.

Mysł pierwszy przeprowadzenia światła
przez tylną krawędź do retyny poprzez Stentor
ritu w przypadku zupełnego zacięcia błony
rogi: — Pierwszokroć tak robił: Sherris 2. cięcia
Stykiem na $1\frac{1}{2}$ linii Stigmerii, przy rezi-
bgu corneae, conjunctivae, sclerotice i choroideae
przebieg, wysiłki z tego powodu. Strach, że
cięcia nożycami i otwór nie mogący się
być bliżej nieprzerwy, ale raczej cię-
nięciem przerywającą, przez którą światło przechodzi
na cięciu szklanym, żółtym, wysiłkiem. — Stentor
jednak nie odpowiada ocellisowi, więc do-
mniemano postępowanie o tyle, iż przecina się
Conjunctivę nożycami pionowo, potem oko-
licznością nagle odwraca się na wewnątrz,
przez co Conjunctiva lekko do boku przycięcia
usuwana są i Sclerocyli i choroideae: płatki
okryte, a na otwór ten nasuwa się Conjun-
ctiva: na bok oddalona, aby rogowa zastępowała.
Przeglądali tego sposobu Beer — Wimber
Diatri na ludziach bezkorzystnie. —

Abby Conjunctivę nakrywającą otwór w
radyce zrobiony, pierwszy w położeniu usta-
wionym, na 1. linii błony choroideae na krawędzi rogi
na III 12

lic' utworzona są ią ściągami, tudzież
lekkiem naciskiem na oko w koncu nowo-
wymartym, sprawnia się sytuacja Protapsus
humoris wtręci w otwór Sklerotyki, aby
blona szklana z nią się łączyła, a cięć w
otworze stojąca narosnięciu otworu rapo-
brizata. —

Próbki wykonat to dręta mi na Audriach,
leer ber skutku. — 4 pracy jego, to są po-
karmie, że pokrywani rozenię takież Con-
junctura, nie i komiernie potrzebnem, że
w Hocrana w otwór cięć szklana, miękdy
i przezroczysty do 14. d. i nigdy nie dochodzi
stopnia ciemności Sklerotyki, że występuje
cięć szklany i warunkiem istoty, a ra-
nieniu ciemni się cięć szklany i zadaniami
nieodrobnem, leer podobno próżnem zadaniami.

Mesmer usiłował białonę blony rog: w-
datnie do przepuszczenia światła, wycinał z
blony rog: białonę Kewatell okrągły na
1. linij, a wypierając pręciśk na okolo oka,
uniwalał cięć szklany do występi: potem przy-
wiązując na oko obrożkę sprężystą, sta-
wał się cięć szklany w otworze unierić, — cięć
sowienka i w oku szklany wydobywa i
obala w oku. —

Skutkiem użycia Mesmera było

zmniejszyć v. powiększyć raćmienie
wypadki iicy sabb:—

Jeszcze inny sposób przedsięwzięto, w rze-
bimowięt słony rog: roztynię ię wycały,
kt: rog: ze zwierzęcia, lecz ber skutku
przekonano się, że kawatki rogowej rze-
dzącej nie wchodzą więcej wzwieglę i
sny rogów, a tem bardziej z obcz. —

Uwagi nad temi Sposobami
Wśród tak różnych sposobów i narzędzi, ma
jednego, którymby wyimnie w każdej
rzedę wystarczyć można, Rzedę rzedich,
w danym potku może być dogodany,
a lubo ubieys: Lekare, na 3. najmniejsz
4. sposoby, iako wystarczaice, są rzedzanie
ograszenie to iednak nie sprzyja sctne
drżna bowiem rozmaitosć stanów ohe-
prywatnych do tworzenia rzedzicy, wiczy
nie 12 głównych rzedzicy są wymagane sp-
sobów; — a nado może nie wystąpi
iessere dotąd znane nam są stany ch-
i: by nie potrzeba było iur nadal
tego sposobu. —

Główniejsze

Unregelmäßige Fingertornia

[illegible]

75
Piotr iu północy nie ranył. Ciepła kępnia
nie dowała wzięcia, i o twardość piersi, robiony
drużniaczek, też kępnia silnie od niego po-
dług. Arteria w piersi Małusieńka
robiona, nie przypadła na środek, tęży, le-
na ię bry obawiony.

6. Kieralnicy od wsamienia Soczewki rozciął i górną jej
brzość, od kouszycielniczyński między wargi ~~z~~ gran-
tary, w celu uwolnienia przednia jej brzości rozci-
nąć, i tak to się Polakowski powiada. — Spotyka ten epi-
sób wainy murat, i takby cięto wronie tory, mogło się
wnieć, rozciąć, lecz obawa ta, że wstąpi, bo pociągła, in Soczew-
ka wapiński podpadła. Lep. co przeciwnie. Na rozciągłych, i
również, i w organicznych nastąpić mi może, ety, i
soczewka rozciąć w głąbiu przedniej tym erasem, i
z niej tory rablić się, i do soczewki wcale nie przy-
nastąpić.

C Wiele i waznem miejscu iak nagabrowniejsze Turcy, ktor
pozwinno rozmowac, iaceli bygd moie, cato sredniez teleg.
Ne nazywanych sposobach apostroregalismy, i chci widzi
no mialt egiptu karastajace, iednak obsewniej przegoni roblino
d. D. l.

Dobra frada Emdena uwieczniona w wargi ranę
 przy miedzy wargami w Cornea i Sele - uwieczniona
 lubo przy adnawieniu tarczy, wale, przysaga niedogodności,
 przy Orbita tomii nacięciu wygośćnieniu i wargi były mi

[illegible]

wagi, gdyż przy *Synicesis* zreniecy natr.
 plantę eresto system *soorew* *Kixendrowy*, co ma
 ora realiz. — *Wri* *cas* *reneria* *fraim*. *Katarakt* *re*.
 dy *wythmonac* *moima* *Diatexis* *pe* *komor* *tylki*, aby
Katarakt *ade* *alie*. *Podras* *roo* *nie* *nia* *thay* *ka*.
orew *ka* *ta* *Jridotomie* *ka* *ta*, gdyż *Jridotomie*
radnie *a* *Dia* *lysis* *mat*, *cyri* *madrici*, *ona* *ay*
ex *scay* *stai* *ai* *pomocna*. —

- [illegible]

- [illegible]

77
moga być wrytane, lub też wina i in. Al.
toma? Ktore postac i sta ma D^{na} Kowalskiego,
napisadnujora i tego wryt, i i prawnia
tylki, tylna Moninika, da sie w prowadni a by
da wrypukla dobru mowi byda nactoma i stu.
rie mowi nact do rorciaia Dorewki. Kto sie
sciole nastanowi, ta two oeni mowierki Rejmanna
Adamu i Larigenbecku.

Co do norm dxiatonia?

- [illegible]

sacrowkowy od drzewa, ale nie przecie ma-
 cinowi tej rasy, o tem pamiętać należy, i e-
 radko system sacrowkowy, gdzie w stanie
 udzielnym, gdzie roznica i rawnosci, a tra-
 dności drzewa najwzrostu a topnia rze-
 cinosi i dogodnych iuda oholi rwnosi, i-
 by był pomysłny skutek.

Warunki przedstomci sa:

1. Stwierdzić poprzedniere btony rogowej, co-
 dy i drzewa, gdy ma się wydzic sacrowki
 o tery niestworze, gdy i inaczej anicmy na-
 wet utwor w btonu rog. wytarowy do oprow-
 dzenia narodzi na wznoszą Moniolla przedni.
2. Ten wykora gdzie nowa roznica, tem i ber-
 pignicy, bo choć się dwidni wariet Leornia
 i dwidni coholwiek utworu perontani.
3. Wale napobirzenia i wzniesia; najlepiej wje-
 wabsernion maczenia post-powarsia anty-
 plagistycznego i fradkani narstotgerne-
 roznicy, nozernicy.

Wskazanie sacrowkowe.

1. Gdzie stany abeen drzewa, utworze rne-
 nicy w dwidni perontrem tery.
2. Gdzie bton sacrowkowy na dygi niestworze.
3. Gdzie perontrem btony rog. drzewa utwor-
 nicy tylko roznicy na rwnosci i u góry i
 góra tery odzwac nie rwnosci.

Lahary.

1. Gdzie sacrowka i tery rwnosci.
2. Gdzie perontrem btony rogowej iut na
wznoszą czyli w kraju nozernicy.

79.

- [illegible]

4. Marcedonia do ujamowania i ogcinania tytu
in Trinostmiana i Reiungera niod promiecia
Woryat ku 16. spocobos luba u dos konatoni uz nu
dos te terne.

1. Nady Preichenbachu do wojeicia drin ku u teraj
nii de usku temin nii. —

2. Past powani Demonura f podobni gore do adu
wania, nii wojeicia tytu.

3. Spocob Muldera f obwaraiacy.

4. Spocob Muttera rozwolekty.
na Wentylem paszli Sabator, Konecomum
Dortentga Mulier.

ka Beerem, Benedikt, Weinhold Reisin
get Bilson kar ej ty wo do konatili. —

Wraczi mod Grilodialixa

Spocob ten dos wiad derenia i powaga
Marpij i Adema Schmidt tan spady to
rozwolekty ratca, in wo istwa on si loone
ndatnych do stwierney adrenicy, procaen tylko
arwath adryshai more. — Spoty haiz go eloli in
ine ranuty. —

1. Ke nay u dey abragiacy a ku, tytu, anatom
stau ej powodem o nay wo ncey ory o rapa
lenia po Wtoto ngaly o ku pry nebi moir, bole
bowum o wielbli, howawania z proce wany
nay ty ta ray tytu z chorowicy f ber do mi
exce prawa rawre Lij: ciliare i proce pus
cilasco pod padai abarenia, a o nay by cy, in
kap. oka, nimo oway o er ni cy ory o perowania
o bardw a par ku. —

2. Ke abwai tytu, pry Wtorem ej wo niey otw
ra, na ra wile pry o eloli anatom ni cy o ra
wed, o by wielbli stau howy oci o eloli abie gwa

morina byto; bo w tem diatemia, iireli aoveres
ta z miasceu niasygrawona, mizdyj cig i stony ro
gowyj Bregiem, raledwii pot linia prastreni
ej mizdyj, a ta nawet wyptanionz f p. pro
ufus ciliaris, lotone opiscia na uury szli krom
ciliaris, ta k. wicz pro trebnem bzdrii adenare
ni wafoterone procepus ciliaris a to bor &
wielkiego nadawezien orbiculi ciliaris abegdi
ej ni mori; a nawet gdy wyystlo nay pompi
nily spodyj, obawia ej nalezij, abeg pigment
tam nigrosu. mofpuoreraide ej w cizry szli
nie ruziereto wyptan Bperacyj.

3. Teranie aderwanion wyptan, soba rostawia
nagatany ej ramyhaia, tery naradza ej a
ogale uozigierie tery w lotone ragowey
Neor tamu idonem a rothowi wstawia ej rana.

a k. graninie tery iur pterej willeu ponnain
gdy samem iij ruzagmionem, rostawia w
dylloraginych wladzej miorza rapalnic.

6. Neuchonwa i roznicy ni tyfko, ale i wstawia
ku nadawezia ej rdaia.
Atoli te ramenty ni ej tly wagi, abeg ten spoj
sob diatemia rannichana.

4. To naywainigowim bydo ej rdaia, is wabutka dr
wonych rapalen, rostawia wyphikatyorych, tery
magerosicy rostawia ej sciale i lig. ciliaris, p
w niatyfko prastren mizdyj tery i prastren
mianu ciliaris rapetnij ruziaion. ~~rozwia~~
lia ruzmion, ale nawet tery rostawia ej tly abto
roz. ii. tly mizdyj tery i. Mierotyha ruzkoj
w tym ruzi i spowoby nasu i narudia ni wy
atareraiz, bo hawry k. prastren i podwaj
prastren i nagi, co nagle pily tery adrycaiz perys.

a toczona tyłko przedni rai moze. - O poprac
 dnicem obaleniu Czerwoli, ceni mysli nie
 moina, bo Kapaloni astatniq nadliq raioray
 by moze; tak wice, cieni stan blony raioray
 nie sorwoli roki Fridatomii Weltera, oceni
 albo adzwaniem tacy, nie wiellki nadlicia, a
 zi edarani to uicpradli, i tacy tacy uicwici
 Sta ergo in Fridodialisibz i boni Mithun. -

Warunki Fridodialisibz.

1. Wselli poprowadnie prauici blony raioray
 ni i miastrownie potrebniq, qdy nacy
 dni raioray do blonibz przedniq i alt
 nej prelituam w prowadnie moina. -
2. Tera w samym bregu ciliarnym, tam gdu
 uci dawu ni ma sorwoli; i breg tery i raioray
 adzwajaj sama tyllko haurglicia; - gdu
 rab Czerwoli i obena; tery edwici breg wta
 nie raioray, tam i tery pociasas ciliarny
 cyfiam adzwaj moina; - naciom gdu tery
 i lig. ciliari raioray i ciliari, abowogreda biny
 igla raioray, raioray i pawatnem uiguiam
 pti tery adzwaj. -
3. Ergo eis uigdara ptiorela ptiorela poprac
 dnic, aby uicorwai dabra i uicwita do raioray
 tacy, i alt raioray w ptiorela abali Katarali
 aby pociasas ciliarny tacy uicwita i aby
 raioray do ptiorela abali raioray i moza. -
4. Aby utrymac atwor raioray raioray
 a. Uicwici mem ergo i uiguiam tery po raioray

in Betonie rogowej. —

6. *Procraspiterus wyckii* Kaimath & Turg. —

2. The proportionally sitting in the adjoining Ma-
tarahly, Utton stary na cigranoh nidozwahing
manahae' aq. xunucy. —

Do skatla Dialirco, to nagwidy, paryu nia's
sa more:—

say more! —

6. Aby i ichinobobuik. a podobem Naturalistę i mi-
sca wyrażać, aby podobieństwa i różnogo-
symbiosis wrony, nie w alba nie było nie no-
malnego. on ten podobieństwo i różnogo-
Langenbecker, Gräffego. —

[illegible]

3. *Grisea porrecta raimondii*, nithamifery.
nocta do tery, i brzeg abwodaw tery limfy wy-
posony zrost sie z Ligamento ciliari, tam dojedzie
dwatke przez Komatki tery.

4. Watoni aseptici pirocratytyu Soczewki;
ależ dość oborną utworzył rzenie, wypadek
tego przynajmniej nad prodom, pirocratyty,
Soczewki; lecz to być nadwyręcinia Soczewki;
ni da się uolnić. —

Zponowidny 16 zprosobai y. redyng s'ej byde wrytany
Schmiedl. H.

1. Schmidtia; Himleys rapromozigly neissze.
Pogoniondy; merochidy. —

2. Wscena: Stratynickiego, tam gdzie uwerliwiał
mordina, si haeryk tacy penerwaj, a Dorewki i
wie ma! —

3. Bontzla, Langenbusha. Sowilhego i. hro
harykani rathrytoni. —

bliznę tę wycina się dość głęboko, i surowe,
aby powiększyć bliznę i skurczono. przedciąga

3. Stosowanie apasemii i leucemii na atropia

Wskazanie

Wykonuje się w tym samym wywołaniu powie-
ki na rekon: takowym, które się apierwó-
dom farmaceutycznymi i mechanicznymi
które są potrzebne: ośm nadani, wykonano po-
wielki nadawania, ośm i innych organów,
a którego przyczyną w nim są: wady, apasemii,
Jedzie Wlepharophthalmia potęż-
nie i znacznym rozpułchnięciem Conjuncti-
wii powieki, opierająca się w rozkładaniu
postępowaniu. -

Labary.

1. Ectropia wywołuje znacznym atropia blizny
której powieki rekon: tak upi: gderatare w i d.
brygu orbity ant przyczynę. -
2. Ectropia decyduje się samym sposobem oddal-
cia.
3. Ectropia a starych. -
4. Ectropia i atropia z innymi chorobami, a
decyduje się ulczy, i atropia starych przyczynę.
Diatania to nie sprawa i ułczego derygu
i f. abrocyguem i atropia przyczynę powołowa-
wania po to usuwają. -
Miara korupcji Diatania, da się odnaczyć
miarę przedłużenia i miodności skrycia atropia
przezawronę na miodności. -

Sposobów głownych 3.

1. Ciepł: przeciwstawa kt. Conjunct: z wywoł-
aniem atropia wywołuje się. -

ciągłocie i do góry i do dołu, całem adstosowaniem
 kuli oka, wspólnie ustatka kuli pręciom swoim
 gładką. — Lekkie przedstosowne stojące uymu
 anad: owerporykani i kowry kum pręciostow,
 na kłom tęgum — i odina norijekani wllgute
 ni i kłirumbr pręciomym i strony prawy
 na lewy i ter norim wyprukłym wygina tygi
 ile do ramieratneba, strzegę się kłaczenia
 Mase orbic: i chrastki rzeowey. —

2. Op. Gdy pręciostoweni Coniuncti i fionum
 albo rozpułkani i i bardo rucarne. —

Operatos norijkim wyprukłym adina prę
 i stowory Coniunct. ad l. Kłata aka, d. l. 2 pra
 racij ftr: Kłu lewy owerdracice Kłapki tra
 mi, kług rzeowey i orbiculare. — po cern rze
 pręykani anad: uymu płat adity Coni
 juncd: i uniostrzy powikł odrahi i prę
 bem anad: ad bregu rzeowego i ad orbicular
 ris palpebrae poceru kłiczy odrahi tygi
 płata norijkani i wllgoteni. —

Dry Dystomatycznem pręciostow Coniunct.
 wyina się takowe i gwał 2. ejciani i ejci;
 Tereli oka powikłi pccipia. Driatani na
 oka się pręciostow. —

3. Op. w rarei kłaczenia kłapki kłi rzeow: pa
 wicki —

Operatos wllgute bregu orbity, pręciostow na
 rem wyprukł: pręciostow ogólny, i orbi rze
 bliwnion powikłi or w kłapki: rzeow: wllgute
 rzeowey kłaczenia: V rzeow: kłapki pręciostow i pręciostow

być ci do cię normalniey drug: a skoro
ona za kręwą albi, załtada a paszki tępą
by rozciągata wgi rany powiee rątaney
Pierwszy raz powieka nie mogła załtada
sta, wtedy sprowadzi Ataxias sprowadzi
nym na to zdarzenie, w którym Ataxias
było bardzo wielkie i drugo trwało, więc
powieka znowo rozciągata była wy-
cina się kawałek w postaci N. trójkątnej
z samej powieki, w tym celu odmierz się
wielkość fedy z powieki, przerzucić
na wycięci, które trójkątne fedy po-
stała, powieka przypadła na breg
powiekowy - powieka wytni się nożem.
Niemniej prostą trójkątną równoramienną
wskroś całej grubości powieki, ponownie
cięcie wcięci. ^{no} ~~zastąpił~~ ~~kat~~ ~~przez~~
ostre - gdy się krowa: wstrzyma, ucy muć
się 2. szparykami, powieki przecięta, i wci-
gani 2. w krowa krowa: i tak przy Colo-
boma powieki się zryje. -

Opisanie

Czyszczenie twarzy i powieki sprowadzi-
wszy powieki do drug: przegwać - wstę-
pny plaster lepić, przykładać się
pod twarz, 1. na górnej powieki, 2. na dol-
nej i utwierdza się a paszkę w postaci idnoobu,
przeprowadzić rące a paszki przepa-
rowane nity się naciągają, aby trójkąt

sposobem przeciawnym, wywierając tak-
że nacisk na skórę.

Wzrost 3. Opar: rozszerza się powoli w kierunku
nemi walcowania skub: w rany i kłuski.
tak długo to robią, dopóki się nie utworzy
~~ran~~ w rani i kłuski. Wówczas rozwinęły się
koni: która powstanie z rądem wypatru-
jącym dacie powłoki długosi. To normal: z bli-
ższą. — Wzrost 4. Opar: rozszerza się w rany
na skórze, które się otulają powłokami skub.
umier. w St. Mied.

Złazzenie pro Opar.

1. Znacny Oparień Zapalenia. —
2. Chłiwos i wymioty. —
3. Przestawienie rany na wrażliwość i rozszerze-
nie rany. —
4. Wyrastanie górnej rany i niezapalenie
osieradka. —

Wzrost 5. następny dzień odnawia się opa-
r. 2. rany i kłuski do rądem rozszerza się
Vejsta i St. Mied przy kłusce opar: powstaje
Vejsta i kłuski i owoce pro kłuski alba, dla
napotnia: rany: się się kłuski. —

Wzrost 6. etap: rany: rąda kłuski rany i St. Mied
kłuski. — St. Mied. Chłiwos i wymioty u-
miera się St. Mied Cham i mata dora Cham
i eterem. Dostaje owoce: wskazywać ugięci
głębokości lekarskich. Wyrastanie górnej tra-
ni się kłuski i kłuski i kłuski owoce i kłuski

cuta. In Opus. Gorięz nieciągłość celu.
Opinacja, powtórzyć.

Opereatio Entropii Frickii in Distichiasis et Ble- pharoptosis.

Diatamiem tem. zamierzamy sprawdzić
utrata substancji w powłokach. powłoki
z tej wytypie iakim. Probowali. z powłok
regu.

Lafresy gtoniejsze działania

1. Wymierzenia ościele wielkości obwodu
czerw. wyjąć się mający z powłoki na resz.
2. Wyjąć faldy kuli odmierzonej, Wska-
zanie z ogółu v trawieniu kłasiu resz.
powłoki tejż. Wsk. ciarki. tudzież
wydobyć z wyjątku włożo wżo-
wych. stonowe. Opatrzenie i Laceracja.

Wskazania

1. Worek w Wrgenie powłoki nadwo-
żniace ię i kuli oła ogólnie.
2. Opędzenie powłoki. Blepharop-
tosis: powłokę na przytępnego pre-
stowania powłoki powłokę kęch po-
włoki górnej.
3. Fracturas.
4. Distichiasis

Lafresy

1. Wrgatki powłoki Entropii i Stosis
Wrgęz dęz ułunaj Laceratione much.

chemi: & dynam -

2. Jeśli jst. chłony podłodzi i dym brzozyjst
3. Jeśli ptosis podłodzi i przyczyny kłone
inaczej mógłby nastąpić jst. przeciwny i dym
graphthalmos. -

Operacja ta nie wywiera wielkiego wpływu
na oko i agonię chorogotną. Język nie,
to i wrzuci, gdzie siateć acz powiada przyczyny
nie mieć scowię i gdzie sposób Operacji
zastosowany do jst. chłonego, - i innego
sposobu podłodzi. na wzrostku jst.
nastąpić nie mogą.

Sposobow 5.

1. Wyższe kawałki i listy z pętlami
ogólnymi. -
2. Zmniejszenie części reon: powiastki, środki
praw: v. kłone: siarku
3. Odjęcie brzozy i kłonego. -
4. Zmniejszenie włośnośc kłonego nozemu. -
5. Oddalenie włośnośc kłonego wyprężaniem.

Przyrządy.

Chorogotnie do tego kłonego jst. Kłone
rych i ich nie ma to pake albo kłonego
kłone: - Kłone i w kłonego jst. -

2. i gty operatorom i kłone i w kłone: podłodzi
nie uoskrowane. Kłone i kłone
tegi, kłone: kłone: siarku. - Kłone
kłone: kłone, kłone i kłone kłone
to operatorom kłone i kłone, cętkiem.

Stronk maty, wypruty, - Lyleb: gtona
 wy - Kleszczki do wgraw: w bosc: - pasc
 plastera angisk: - Lereb: skub: B. d. 18
 Na - Opatka walcowa B. d. 18 - Co
 mod: 1 - Usadzenie iak: przy Ectro
 pium:

Dzielnice

1. App. Dory Blepharoptosis glicy reg normalnie etois

1. Storo Plomc: gtony gtony gtony gtony
 iak przy Ectropin Operator odmi
 ny dule wiskosi: fady, na wyzycie
 rucronay, streguecy, rucronay, na wile
 mato, w tym celu dyleb: skub: na
 u regy na reon: Kleszczki u regy
 ni 2 areb: 2 pascem Wiskosi i wisk
 rski ludy - ay mui fady wisk
 trzebny 2 blaczk: pascem reon: na
 2. Linia nad legum reg: anosiw postoi
 fady pascem: w ten: Keri choremu
 starycy: i reany: dla pascem
 cy regy 2 craci rany: i atwian
 przy wate: starycy: przy bieray, co
 idle talk: fady wate: bieray ad pascem
 2 rary pascem: bieray 2 wisk: 2
 na mui: na fady: mui: pascem:

2. Lesliq: mclarto mui: fady, u bry mui
 2 etate, i rski: pascem: trymam: mui: mui
 iak: przy Kleszczki 2 pascem: wisk:

a na korym od Warty wezm. w Pior. bym
powiech w całej linii w Młody rąpy Pa-
rycia wyrostac, moim do tego wyci Pa-
ochronnicia i kłaski tyżestlinowy, Ktorę
ci wprowadza pod powiech, powiem onygora
ci gubli w Taim amacramy Krew.

2. Plast, pnie pomochik, pniega i powiech
Do gory, aby wgi rany iak. may + roztawia,
w tem uymu szery porytkiem daby
bory rany, odrabia go ar do tarsus, wgi-
mnia, rąpy wesp. i ich granatkami, o-
szery dracie iak. Kropki Trawe i uysia
Kananatki obwodowy z gruntem (Maybo-
ma). Do ocyprzenia Kroi oglada ci, ci
ni porosto usore Kithadzeow w niisprawy
Kym Kroi - malarzory uymu i ci szery
orytkiem i uymu.

4. Op. Dwy saniey Trichicis et Di-
Stichicis, Kudy bryg powiech nie
+ wbreony

Uymu ci szery porytkiem iak. Kroi
iak. rąpy, iak. may b. rąpy i. maytem
tergnieniem wyrgwa ci w Kroi. porosty
iaki by wyci rąpy albo Kroi by by, nie
trzeba wyrganie priedej b. d. d. iak. iak. d. d.
abawo w budzeniu w. Kroi d. d. d. d. d. d.
wice.

Opatrzenie
W. 1. Op. Ocyprzony rany, Kroi,

Składa się 1. v 2. Siegi wgrzanki: Tęczy
wzagi rany płuściarkami napr. mij dry Siegi rany
przełapionem, to malszywa się płuściarkami
Kłob: i Kompresyom a przystrzyna się
a paszka do kłob. wrota obwinięty. —

W. 2. Sp. Test round in the 1. Procks, in
nitrous plaster up. in purple of shab.

W.B. Spoo. Lachrywa sie rang perubium
 Shub. in Voiept. amare. So utward
 sie perubium lepr. perubium Komposit
 sem. i. Opasba ^{perubium} utward.

W. F. Spoor: Doo'e' f' opasac' a' m' must the
a' torone.

Idarxeria pro Oper.

Wyroki i opiewy Kapuła: Hieronimowa
osiągnięcia celu. —

Seczenie następ! Pręgi Włosty się po-
je dnato ściegiem Krow: leczy się i takto także Krow
ro się spocznienie i się ściegi rozwałcznia poma-
cino się i i wydoligwa-

Trasac kw: ciarls: ualidny po puirowym
nagmar, uo argabato si patrubnui uis
kici chorupy 2 i 3 wry powtorze. Sam
ydui uis pocięto bryg powitlowy lenci dro
ga Ropi. Wraci rhyta Lepplan antyphi
wumicyrym mna: a u powitlowy
uic Ofier ualidny ergato ad rhy powtorzenia
u tem albo inrem micyca na powia
u uicito powitlowy. Myrataru

racoy wogrywa cię na nowo wyrażę wypra-
stawiamy przyzwyczaję pro wyrażę trawie
produktu traw. powiem althors cię ul-
rzyto Druh i Dyst. promygotec' o przy-
wroci przyzwyczaję. Cornea o oddalenia st.
nordnawinisia Conjunct: i balbi oculi.
Do czego stawał Gradli fias. -

Operatio Sargostethalmy
Poniżej dratania Horemisza prosta.
orze powiecie prosta rewn powiecie
i cię produktum, poniżej dratania Horemisza
tego dratania, etae wyznacza, ki lewnia
stanow obchych malkarungach to drat.
wydratowu i Chirargii. - a toli po-
niżej przy dratowaniu lewnia, ni-
kiedy dui cię iedniel, etae prostrany ty
chki od dacie, a przy nagminie umię wy-
wia moina ię umiędzy wydrat dratania
normalnych -

W Karana Horemisza tyfko wtem
rnatrenia, gdy powieka rewn powieki
i dawniejsu rozpięciu, rnatrenia u-
traty substancji powieki. -

Chorego suda cię na krucie i. Pomoc
nik utrzymuje gładę przyzwyczaję do
owych powieki, Operater unosi powieka rewn
powieki owymyżkami anaki w po-
stać palcy podturnej wyznacza tablowa
oici pod tyfem orleci, powieka tyfem

pade, poprawniam, a cieżci roz-
 serem nawięzkaniami na ręk i wiew: i ręk
 linia cieżcia ortu równoległa z brygum
 powieki, po cieżci uszere cieżcie i
 Dno cieżci nabi rany dżiwa potrzebę
 wężkorego pownużenie powieki na-
 wet i truci choćby miało pownu-
 żenie p blinę i rany i p. mija, ni-
 nadziejanie tanci. — Po watri-
 manii krowo. i tancja a plicy na-
 ry pownużenie ^{prze} plicy i p. dżiwa
 pownużenie do górnego brygum, po
 pownużeniu rany pownużenie i dżiwa, co-
 ne krowo pownużenie pownużenie i na cieżci
 pownużenie pownużenie i pownużenie:
 do dżiwa brygum pownużenie i dżiwa
 w górnym krowo pownużenie, po cieżci ni-
 dżiwa brygum pownużenie krowo i cieżci w-
 krowo: i atwierdnie pownużenie i krowo
 i krowo i cieżci krowo i krowo krowo na-
 cieżci. —

Operatio Colobomatis (Zapalenie)

Działanie ten nacięzanie rany
 to pownużenie cieżci i krowo brygum
 wery, i cieżci i krowo.

W. 1. rany pownużenie i dżiwa od dżiwa
 brygum i krowo i dżiwa krowo
 pownużenie.

Ustalenie to działanie rany i krowo

ny Holowicki powiſſi ory ſawir
ory radawomiti. —

Kochanem. Tak maczna atr
ta iata powiſſi, is ciaz e aciz
gnaſ orowem krow: ca nado gnat
umily ſij paſaſſy obrariſy u chadz
powir: organ: nateſpito powiſſi
bydaz u nado ewgiong uſwirat
uſto i atucirabaly te wyatuwian
na uſtyguy rewn: Driatami to u
iat bar: obrariſy uſpierz gdn Co
loboma u maczney atraty eub
atanyſi rbyſt gwaſſi: ſiag. pow
ſi naprionem ſiſſy uſta obrariſy
u tak naprion i powiſſi, u uſwa
iſy ſij u ſiſſy uſta, wyatuw i ſij na
rariſi u ſiſſy uſta rewn: uſta uſta
rariſi iſyſſy padpada ſiſſy: ſiſſy
ſij rgarbun Prop: ſiſſy uſta
ſam tyſſy driatami to iat ſiſſy
nem i ſiſſy uſta gdn atraty pow
ſiſſy bardro mata: powiſſi ſiſſy
ſiſſy rabyſſy wyſſy uſta? —

Dziękuję

Proste noryſſy — ſiſſy uſta
tych ſiſſy uſta ſiſſy uſta

stani — Seriliby ścigł. ni wy-
starczał ratory i tytu, i le dżogon
dżogon wymagal bezdri — Kapo-
biegawce ruchom powali; więc
statuicic, poidnani, konie dżo-
gów dol. przylepia się na polio-
ni, a górnych na crote płaszczy-
stka asfarcia ścigów, w ich prostru-
nie przylepia się warthie pastwa
płusku Angielskiego —

2. Marce zabliżnionych brzegów dżogon.

Ugrymni się pełena wielk. i waki-
za b. potwor asfery, choćby za dżogon
poidgawce dżo solen, a współnie dżo
ciągawce adolci, i adcina się prostru-
no iyerbani z iaki najmniejszy dżo
to sulest: — to samo przedkieru-
kadnaje to asfery. — Poidnani po-
dobnie wielk. w pierważym rari. Dżogon
razożył obtoży i pżerbiem słuab, dżo-
ry się utwierdza pżekien, lepi: i p-
wryic, się kompresu na crote pżo-
tożonym: —

92.

Lobarrzenia pro Oper

macys

1. Myrowani zię iuigu
2. Poł quattoary z nępręgion
orparę prostę.
3. Kapralenie Kuli alba.
4. Entropia z Entropiem.
Charadrenie Tym adurucione iur
+ anidone. —

Wostatnien tyłko rari, mana mo-
iny m etan chorego aerynic, wy-
cia gniac, wto Vi regowe. —

Paski lepkii rostawia zię, wri zię
utworu abhorapelli do J. Q. z B. —
pro crieu adlepi zię i nowemni apa-
try a postnegtary, ię ranyra-
ię iięgi przechodnie w Popiinie
prociwary nitky wyimnie zię.

Operatio gland laer



1.
2.
3.

1.
2.
3.

93

Operatio glandulae lacry- malis hydatidosae.

Oziatanium tem zamierzanu, ut orować
drogę do gruczołu łzowego dla otwore-
nia tam worka wodnego. —

Czynności.

1. Oczyszczenie. Wodnika. —
2. Wypróżnienie cięczy narządku. —
3. Oddalenie worka wypobyciem & zmniejsze-
nie go. Rep. —

Wskazać to oziatanie Gland. lacrym.
hydatidosa. —

Lakazny.

1. Wystąpienie znacznej okolicy okołodu. —
2. Żelki kula oka bruno: niebieskawo
wygląda, i znaczni napęcznie. —
3. Żelki wrzotk utraciony. —

Leż chociaż przystąpić do: j. raka-
rang Operacya, gdy jednak j. pewny
wzrost, i. i. u. nie robić, chory smutnie
skłonny, a je Operacya może być oca-
lonym, porażka dla tego stany rakowat-
ki se wyominione, i. tam tylko
niegodni się robić, gdzie nie ma nadmier-
noci powiększenia & nie Operacya pomy-

tych stanach pomysłnego skutku
nie merime. —

Przyrząd.

Lancet & mały troygramen^{IV} ptaszk.
Hoczek z gumy spręż. & strony — kom-
pres i Ciepła mied.
Chory more Sudric & liiec. — Skoro

Pomocnik utwierdzi głowę chorego, sko-
rą powięź oka chorego ściągając
i do góry, Operator w miejscu tam
okolicy skranioney i orodolu, gdzie po-
cnie napotka twardość, włóci lancet
troygr. pod powięź górą, blisko ię-
potężenia i dolną nadając kier. w oku
grodolu tr. posuwa Lancet & troygr. o
półki dobiebli na otwory i nie wpry-
wiercy wyjetyniający Gę ta odległość
znowa naprowadzić do potór. normal-
w otwór rany w sunie stoerek & strony,
zblizny wszy powięzi, ułory chorego na-
bicie, poronno, rękę głowa niżej leżąc
Gdy Exophthalmos w takim, stopniu,
mimo uicry adspynio-niej, powięzi oka
pokryć nie mogą. — na należy oka
cisnąć, lecz ułory wszy chorego, ocre-
wać dopóki muszkuły odryskawszy

skoroś nie cofną oka ku iarni. —

Co dzień w prowadzą są sędziwy stocełki
strona, a iereli po niecałim czasie, imie
ni są worek do zwiazku, okaze się wyjątk
kuch solarnych, które się wyją i wyją
gny. — Jesli by worek w kilka tygodni
i po cofn: oka, nie wystają, spróbować
można kastropli: ciery drzew. Dla wzbud
Lap: i Rep: worka. — Co iereli by się nie udało
porostanie siostata, z której wyją, wać by
Dni cięć dawniej w worku się nagromadza

Encephalio alienatae Carunculae
lacrimalis. — Encantis. —

Prer drianie to, chcemy oddać ciałko i
cathem brodanki, w której mow: oka kierzga.

Czynności Głowne

1. Ułicie brodanki, po ściśnięciu wysięd: osady
i i sposobu polazowania się z ci: przybyłymi,
kacym i lub skorypryskaniem. —
2. Odrobienie i i. —
3. Opatrzanie. —

Wskazania.

Wielkie powiększenie tej brodanki, tak, iż
czynności powiek są nadwężone, wrodek
naszkodzony i kady mimo racjonalnego leczenia,
nie udało się i i zmniejszyć. —

Leżary.

1. Kady nie można być pewnym, czy przy-
czyną zwiększenia trwa usere i cięgle dris-
La. —

2. Żyłki organa przyległe są w ft. podługwa-
nym.

3. Żyłki brodawki j. skłonata, Karaynomat-
yczna, gdy wlecy j. tytko cura palliativa.
4. Gdy korzenie brodawki rachodzą głębię,
nie nosem sięgnąć wolno.

Operacya ta nie wypaie się być obrażają-
cą organom, atoli skutki jej, nie rawnie
są na korzyść chorego. — Zbanuana j. żyłki j.
cystą chorobą miejscową, żyłki ropienie po
działaniu nie uszkodzi oka, żyłki osada bro-
dawki j. dość powierzedowna i nie sięga błon
oka. — Szkodliwem j. to działanie, żyłki bro-
dawka j. ~~brodawka~~ rakowata. — Purmann
wspomina o brodawce włośności pęści,
którą pomysłnie oddalił.

Przyrząd.

Skazyłk podługowy 4 po 2ny — Skazyłk
anat. — Noż mały wypralki — Nożyczki
Koopera — Woda Tidenas — Podkładka stop-
niowa i Opaska walcowa — Pomoc: 2. —
Chorego sadza się na krześle, pomocnik do
piersi głowę jego przycisną — jeśli j. drucik,
trzyma si na toni.

Działanie

Wzrostu mniejszej brodawki.

Leżąc na boku, pomocnik głowę chorego przy-
cisną do piersi, druga ma być wolna do
unoszenia powieki. — Operator uymuie gur

haczyłim, pociąga go nieco ku sobie, i
wycina część z całej brodawki norygetkami
wskłysł: — Jakiś mórna coś oskredzić bro-
dawki: robi się to dla tego, żeby po rusze-
nim się wycięciu nie operować stłbicidni
lacrymaru.

Wzrost ras górnicy brodawki j. wielkiej
zastawia, wzrost w Conjunct: powiśle,
Pomocnik tak roztwiera powiśle, aby mniej-
sze przyłączenia iak najlepszy był o d-
kryto — poczem ująwszy haczyłim gura,
pociąga go ku sobie, i dotoni, w tem w bgu
wew: i p.d. podstawi gura, robi się o d. g. tła-
ku, w kłamniku bgu orbity, kłorem odci-
na gura od bony kłercy powiśle od zew:
na wew: — podobnie po tej pnie sobie
z odcięciem rwiarków i powiśle, do bna,
wymocinowy iak do dotu, po czem gura mo-
niej ująwszy wycina nosem z noryget-
mi, o tyle o ilego j. przewidzonego.

W tym razie przychodzi część z wycię-
brodawki, niż potrzebniem j. od ruszobizki:
~~cała~~ j. ty niania ter — a nawet tam
górnicy są obawiać na licy przewidzenia
gura, mniejsza j. nieprzymnoś j. ty nia-
nia ter, niż odrodzenia się gura — wtedy
są cały gura wycina. — Dla usunięcia
podczas Oper. wzrost: przestrykiwać woda.

Opatrenia. — Dyrzora się albo i doman
imiejsie obrarone wysciata się pulchary
skub: na co się kompres. studej i Opas
Monoculus. —

Edarzenia pro Oper.

Strwotoki następnę — wysolli stop. Zap-
Ropienia topnie — wyrosle glib: na
er. siach skalec: powstoc: rany na m
stę postaci — Dacryostag: — Płynienie
ter — Ectropiu powieki dolnej. —

Strwotokowi nasadza się Trim. — S. Teden
w Solucy, Asturu i naciskiem. —

~~Edarzenia pro Oper~~

Lapal. rąda Okładan rim: i Pienek. —
Ropienia topnie mogące i niszczyc po-
restatose brodem: wstrzymuje się tonierow
srodki. — opatrnie się solucy Asturu & ~~the~~
Siarka Zynku, bionge b. w: gr: na
B: Opie. —

Brodawki na łgne, powściągnę Kam-
juchiel: maie baerność na Coniunt: —
po przytran: przestryknąć Mlekim
& cierni Klejowaty. —

Wzrost utworony, traktuje się podług
jego postaci. —

Dacryostagon unara się pg. nielito-
rych na nie ulecrony — ale pg. Petyta
mornaly stworzyć worek tr: w łgci

96
ohla new: na new: powieki; aby szły mo-
gły się przedkładać w rękę stoły do nos-
ka tr: wsadacona. —

Cetropium miltarum unawiają na mi ule-
wone — ale Adams myślał o sztylu powieki
w kci reu: a się gęgrosy mocniej po-
wili p to wyżej r szyma przy Comis-
sura et. —

Operatio Sacci lacrymalis.
Fistulae lacrymalis-et ad
formandum ductum excreto-
rium lacrymalem. —

Przed to działanie obęgniemy postępo-
wani lekarzkie rozciągające do otworu
nia worka łzowego, jeżeli ten jest, do prze-
torowania kanału nosowego, jeżeli ten jest
łzowym i na koniec do utworzenia drogi
dla ter sztylny, jeżeli nos jest tr: j prze-
stercowy, jeżeli kanał nosowy jest organi-
cznie zamknięty. —

Działania.

1. Utworzenie worka tr: clem rozciągania
dalszych postępowań. —
2. Utworzenie worka tr: i przetworzenie kana-
łu nosow. —
3. Utworzenie drogi sztylny dla dopływu
ter do nosa. —

Co do 1. Diatania, glówniejsze diatanie

a Otwarcie worka trawego. —

b Wyczerpanie jego. —

c Wypłcenie koprok, kanatów i worka

d Opatrenie. —

e Leczenie następne. —

Wskazania.

1. Wzrostki stan chorobny worka tr.: który
mianowicie Hydropsacie lacrymalis

2. Leżenie rony w worku tr.: — rozwo-
dzenie worka — stan jego fistulowry — roz-
puknięcie błony wewnętrznej worka — trat-
kanie otworu wychodowego worka tr.: Ca-
ries ossis unguis i Necrosis. — Zarosnię-
nie w. zawarcie koprok tr.: nie dozwolę
porozumieć, że kanatów trawych i
kanatu nosowego. —

Leczenie.

1. Nieco Hydrops sacci lac. da się ul-
czyć oddaleniem przyczyny powodowej —
jeżeli trwa krótko i nie j. w stanie kom-
plikacyi, mianowicie, jeżeli isprze nie-
podpada derog. —

2. Wiek młodościowy, delikatny skł. ciała
a mianowicie sklerony a dyskr. skrofule
która w druci najcięższej j. niepokusowa-
ny — i nie w tym wieku dradaniem natury
choroba może być ulczona — i nie p. s. d.
hi d. utel. i pharmaceut. Dyskrazja ta us-
mierzy się dać. —

3. *Imię Dyskarye*, czyli to one stowię w sto-
sunek ~~powodowym~~ powodowym choroby worka trz. v. czy-
li tyłko tonarszą, tył chorobie - gdyż w
warie ostatnim, rakarnu do Oper: mi będzie,
a tył przygony, iż nawet po Oper: czyn-
ności chłnu na ranę się wywierają. —

4. Stan takowy Hydropis, który naciskiem
nosowym może być ulczerony, albo o-
tył z mniejszono, iż choroba nie od-
mnie ryson twarzy, bo małe płynie
ter, pochodzące z tego, iż sobie chorej palcem
pryciska z worka, nieupowarnia do por-
ażenia worka. —

Taka Operacja nie wiele na oganiam
wplywa - zbawieną j. o tyle, iż stworzy nowy
work, myślenie można ft. iego oddać
j. szkodliwego i p. ten stworz drżać można
na stan iego chorobny a nawet i wtedy, gdy
czynność worka zmniejsz można. —

Przyrząd:

Nóżki żurki, prosty, z gorbikiem nieco wy-
piętym & nóżki kataraktowy Strzykaw-
ka Ancla - Żyłki: rątkowa srebrny & z fi-
binu - Żyłki: rątk. ciemki klarego konie j. na
zposob żyłki: rątk. — Szereporyłki anatoma-
Tęciuta - walcerek skub. mały - plasterek
lepkich & ciur: — Kompresy owiełkiu — Opaska
Monoculus — Pomocnik 1. do trzymania
głowy — Staw & tył 1. rątk. będzie na czoło
2. napozna powieki odcinające przy koncu

ow: ku tyłowi - Chory siada na krześle.
Operacya:

1. Gdzie worek tr: nie j. fistulowry.

Dornolinsy aby worek tr: wypchnął się ten-
mi & inną ciętą chorobną, operator stając obok
chorego nie przeszkadzaąc w padaniu światła.
Pomocnik naprzeciw powieki przy kciaku
potem ująwszy nos jak pióro, obrotowy go
zwrócić do kierunku nosa i uchwycić z płasko-
do brzoju orbity - Stawia koniec noża pod
~~ten~~ tendo orbitalis, w kciak nos i góry do
dołu, nieco ukośnie z powodu ku tyłowi, do
worka tr: tak iżby kciak noża przybrał
kierunek, i takoby miał wyjść pomiędzy skrzy-
łem nosa i podim rzęsem, rozciągnąć worek kana-
łem, pochłaniając nos ku sobie wyciągając
go z worka. -

2. Gdzie worek tr: j. otwarty na re-
ntr: j. fistulowry.

Żeby otwór reny & w skórze nie j. bardzo
odległy od worka tr: i tyle j. obszerne, i
wpuszczać może ciętą ręką białą ręką. wpro-
wadzić się ten, a po nim wsuwamy warłki
noryk, przecięć się i fistulę i worek tr: tyle
ile trzeba, osłaniając ściągacz, orbicularis
palp. i kanałki tr: - Tam gdzie otwór fist-
j. ciasny, rozprężenie go stroną & gąbką
suszniczą, a rozszerzający postąpić się, i tak
wyjąć & bez poprzedniego rozszerz. wpro-

Wadza się w otwór fist. Kolec noryka i sz-
czygi i przeszedł, aż do worka tr: roztwór-
su. — Tam atoli, gdzie otwór rewn: fisto-
lony j w pewnej odległości od worka tr: ro-
cina się otwór ten minuscule fistoty,
wtedy koniem to przecięcia ściągamy fist: rewn:
wystawera czasem do porównania są z otwo-
rem fist: worka tr: ap. Zap. cięciem work-
owego. — Lecz i wtedy obywatel rewn: wor-
ka tr: j bardzo mało wac ściągamy blisko są
sobie, prosto przyrocinaniu worka ostro-
nie drudat, aby tylny ściągamy minuscule
bo inaczejby się nadwyrzuciło os unguis
i takowe uchwycenie mogło by być powo-
dem do poróżnienia paska: drogi p os
unguis rglębniłkiem. — Po tem Operator wy-
prasa cicer rnygonięcy się w worku tr:
ciśki worku ranyora plyn, nacisk palcem
wystawery na wyprzyn. — po tem przestry-
ka się worku tr: T. cięty ap. Strzykanki. An-
Czysto iednak wypada są, że secretum j
gęste, cięte, nie łatwo oddaujące od ściąg, lub
tr: ramykające jak coplek wysięi worka
tr: do kinału nos: wtedy wprowadza się p-
otwór w worku tr: rozciąty, rglębniłk fisto-
lin: trzymając go naprzed porożnem do
worka, a wianie jego podnosi się do p-
nu, tym rglębniłkiem poruszając tu i

Indrie Lehar se stara unvolnić skroz
płoseć będogę w worku tr: i takową wy-
dobywa sprząpętkami, po erem uisore
pruustryka V. cięptę. — Bywa, że ta skroz
płacę j. orasem takę gęstą, iż nie ogola
cięcy z worka po otworzeniu nie odpy-
wa, i Leharowi sprawia to rękudzenie, iż
mu się zdaje że do worka nie trafił. —
Po moim sturyc na pręstrąg, aby po-
otworzeniu worka, nie rzucił przypr
wadzenia rękobnika do nosa od raru, lecz
postawić naderż rozpulchnienie tej skroz
Łosi Łastrętkanin codziennie, a w kółka
Dni pnieknać się, czy się sprząpętkami
skrozpłoseć mi wydobędzie. — Na kądyc
waria się od raru przebrać worek tr: wtedy
pociąć warstwami nożem wyprułygom,
aby cię pod seigacrem orbicularis wprost
i z aże: na guzie utworzonym ze wypu-
nionym worku gorę punkta tr: są otwarte,
dobrze woli Lehar, iżeli je palcem przy-
cisnie, aby w rasi cięcia cięcy nie odpy-
Opatrzanie Wyseiny twarz, wsuwa się
po rany ciętki matki skubanki w V. cięptę
emacraną, aby tyłko wstępowat do worka tr:
gęstą inacny powiękłyty odrym traumaty-
czny — rany ratują się plasterkiem i z aże:
na to przykłada się matę kompres, który
się utrządza Monoculo. —

Zdarzenia po Operacji. 99.

Wysoki stopień Zapal. crasum Zap.
to bywa różowe. — Ból gwałtowny —
Pływanie ter — Porót stanu chorobnego. —

Secrenie

Baroko j różnem traktowaniem opero-
wanego, z tego względu, że różnie Zap.
z tego skutki nie j czystym wypadkiem
Oper. lecz skutkiem porażenym pierw-
tne chęć wzbudza, dla tego Zap. naj-
częściej bywa dyskrąjnym, mięsn: &
metast. a tak więc atakować ma Leherz
secrenie do st. Rop: do Corruen: do roz-
puknięcia, do stopnia szuro-ptymu,
do Caries & Necrosis kości tr: do st. cło-
miernego błony szl: do raktamii krostek
i kłanów tr: ze względu na rodzaj
choroby mięsn: & metast: powodowa-
nie do fistuły. —

Ropienie z porażenym traumat: i
szkwa i łagodnego porażenia
V. cięż- opalowania powrotnego. — A po-
wasz Howard: ścian fist: po porażeniu
ju okazuje j wypadkiem Zap. i Rop:
tych ścian, proto Wład: domię: n-
nie j powinny u oddać. — Wzrost Rop:
pty fistule worka tr: j dyskr: co
morały pokryć na iśno przedmi-
nucy. —

Precin Rozpulchnienie & wyrostom
okupującym się na wewn: seianiu owc
ka br: wyrwa się na wewn: porestory
Kiwai durn: Seig. iako to R. Opn
Chorogom Alboni Siackum Lymhu
Kamienia piśkiel. & precypit: cerni:
w postaci mascei: —

Sam goru w oworku odosabia się
salna chnie f: Dacryops blenoidens:
waje porestryk: & waz. c. R. Opn
Solneyi Sublimatu zlagodzonego Muz
id Lem: Cidon: & w postaci Mascei
w Masta nieolonego i precypit: cerni:

Ponieważ Caris wyplk j. wypadkim
Pytko: preto do niej odnain stosowne
lezenie. —

Pyk Caris kox" br: & j. zniszerong nige
nige istnie iur otwor do nosa i wypok
nie Kanał nosowy j. zawarty & tych star
now nie ma, tytko j. otwor do nosa & os
unguis nie j. przedziurawiona, a kanał
nosowy nie wiadomo czy da się przetorować
czy j. zawarty-wł. rare utrzymać otwór
chorobny & os unguis do nosa prowar
dagey, dopóki nie zabliżni się i nie stnie
oncie. —

wł. rare, lezenie się radosuni na kox"
br: tak aby rozfolacya nastąpiła — Skoro

ta wyrażenie i tak, że os unguis i Kanat nos. otwartemi zostana, restawia się niethnuty Kanat nos. i otwór w os unguis otwarty utrzymuje. —

Gdzie Necrosis, czyli odrostowania? —

Stan atoniczny worka tr. wymaga środków ściąg. wzdur i naciśku. —

Początek iereli Lekarz mądry nie, nie celu swego nie dopiast wyśledzi:

1. Czy punktka $\pm$ Kanatki tr: odpowiedz dać, prosi się. —

2. Czy Kanatki, przechodni $\pm$ nie i wiały sposób. — Wyśledzenie to odlegawa się tak.

Iereli $\pm$ bieżecenia, nie można było są przechodząc ostanie kropki i Kanatki tr: $\pm$ ~~przeprawa~~ przeprawa Lętybnił Anela ~~przeprawa~~.

~~Kanatki~~ prostojadła w kropki tr: i przeprawa $\pm$ Kanatki tr: aż do Kęta i bieżu 2. Kanatki, posuwa go w pionie, aż dołnej poriano, w górnej ukośnie, wśrodek najprężenia skóry, wzdur aż do worka tr: iereli rątybnił w nim stanął, wtedy punktka tr: i Kanatki nie ucięcia, iereli anadart rątybnił, to nie są przechodnie, lecz nie adatne do przeprawy. ~~tr:~~ i wtedy obrócić kierunek przecin st: obrotu kropki i Kanatki, który zależy od braku sprężystości i kurczliwości tych organów od st: naturozłymowego, od natężenia

blony serc. i wysciągającej, a mając
na względzie główną chorobę zaradzić się
środk. wewn. i zewn. — Zrobić zaś badanie
pokazało, że kropki i kanałki tr.: choć nie
zarosłe, tak są zdeorganizowane, iż nadal
czynności nie będą mogły wypełniać, wtedy
napróbenoby było utrzymywanie otworu w
worku tr.: a należy wory go,  pomocy
Lekarskić nie nie orestlinić. Wrazie
przeinywym, dzie badanie pokazało, że
organa znerone są wadnie do czynności,
wtedy wysledzić Stan kanału nos.: taki:
Wycisnąć wory work tr.: przestrzykamić
i nacisk: Operator wermie Zgłęb. fistrb: gra
kości odpowiednić kanałowi nosowemu
na 2. i 3. cale długi, wprowadzić go w
kierunku poziom: do worka tr.: a pod-
mówczy do pionu rapasera w głąb
worka tr.: w wysię jego lekkome, a stąd
stara się przesunąć aż do kanału nos.:
kręć między 2. palcami ten Zgłęb: po-
suma go co raz niżej, jeżeli Zgłęb: naprót
ka ramie, wolno naciskając — jeśli i to
nie nadejść, nadeść równie kierunkiem Zgłęb:
nikoni 4. cofać go i wprowadzać. —

iereli tego oaru mi udato się przejść
 wyscia lejk: ranićhać usitoni: - bo mogły
 powstać w worku fady i wżeteli stras.
 i rapora j rnacone rogi: i rozpułchnienie
 bli: srl: wyscia lejk: - opatrzyć się chony,
 a dnia następnego powtorzyć: iereli
 rglbnił: fisor: nie dogodny, wyc srebrny
Meiana a iereli i tów po nacioku nie-
 bolesnym puszczony, nagle wyskoczy
 z worka na parę linii, wtedy Kanat
 nosowy j rarsoty. - Lur w rarię precin-
 nym goru Kanat nos: j o tyle nie puch-
 ni, ie w dalszym kierunku otworzyć się
 może, wtedy urbroić się ciępliwoscią, p-
 ras dżupę, powtarzać ustawaia. - fiel:
 Lglbnił przeszedł wyscia lejkowate, de-
 kar daley rasumi, air do wyscia w nos
 a dotykanie się kosei pokrytych blonę sd.
 sprawni drwinienie nieprzyjemne w nosie
 i puchona o przejściu do ciemy nosowej.
 Po śledzeniu restawia się Rglbnił w kana-
 le nos: odriennic przestryka się worki
 bi: i Kanat nos: wśród stojącego w nich
 rglbnił, a po przestrykaniu na no-
 wo śledzić. - Iereli na karcim wyprawdaz:
 spostrzegło się ie rglbnił daley nie idzie,

Wtedy wypełniony worek tr. lekko skła-
banką, w ciępt. & rmaci utrzyma się
plastorokiem & sier: a zgłębnik przytrwie-
dzi się pastkiem plastorokiem lepkim nad su-
chem brzośnym na ciele. —
Tam zaś, gdzie podługim i berku-
tem usiłowaniami okazywało się, że ka-
nat nosowy j. nie przechodzi, napros-
tać tego postępowania, a powtorować
drogę sztuczną.

Wskazania do dalszej Oper. fistuły

worka tr. są:

1. Wskazanie worka tr. z iakiś Robniek
będą przywrócić, jeżeli w tym jest stop-
nie, że cięć nagromadziła się do nos-
prętyżce nie może & że cięć nagro-
mada się w takiej ilości w worku tr.
że atżo wynika pękanie ter, kytrop-
sacsi laer. z jego składowi & ber, iako
to uści sprowadza Sparator: worka
tr. — Kap-fistulę — Caries Kości i Necrosis
2. Wskazanie worka tr. w bliskości wy-
siedzi iego do jamy nosowej, jeżeli po-
przednio leżono tera-pentymu i st-
ten naroszenia pozostał, iako cysty
produkt przywrócić iwr wygastę.

Lakary.

102

1. Gdy stany wymienione chorobne kanatu nosowego, rawisty od choroby miedzownicy & ogólniej Dyskracyi & miasmaterney, obciążają się iwi w ogule ciała & ukryty, o której iednak do myśleć się można, a nawet choroby te, choćby iwi były w stanie wyrodzenia, uderwalaia Operacyi. —
2. Gdy w ciele chorego j' doznosć do psu-
dooplastyki. —
3. Gdy cierpienie worka tr. & Kanatu nosowego j' chorobę zastęperą, metastatyczną.
4. Gdy j' Caries. —
5. Gdy j' Necrosis Kieci tr. i przyległych.
6. Gdy j' przekształcenie worka tr. & Kanatu tr. otaczających Kieci, iak Exostasis, tkami Kieci przyległych. —
7. Gdy większa część Kanatu nos. rorostła od dołu & mała część rorostła od góry, bo wtedy czego swego dokłada, można drogę fałszywą porotorować. —
8. Wyrody fałszywe w jamie nosowej &, Algimora, które Kanat nosowy, o tyle rorostłać mogą, iż się iwo do Styrnosci sprowadzają. —
9. Stan takowy Kropeli i Kanatków tr. gdzie nie ma nadziei przywrócenia ich

czynności. — Sprawdzic niektóre raku-
zy, nie są stłoni; doświadczenie ich istnie-
nie, dopóki są same nie roztępi uszu-
nięte są. przy kry na oddalony. —

Przyrzad.

Wszystkie te narzędzia, co do otwarcia
worka tr.: ~~innych~~ Lgłbnik! z rogu
widoryb. — Killa Lgłb.: różnej grubo-
ści i socbrnych, a między nimi Lgłb.:

Meirana Brost do robienia ponerochy
z. sztylet Beera, trójgranicowa raku-
sreny — Główni Lgłbników choć grubo-
ści, bydr cienkie, jak u najcien-
szych. — Strony skrypcowe i stożki
stronowe, różnej grubości z. ranołka
z 2. nitkami lnia nych z. adwab. nasrostk.

Narzędzia do wydobywania Lgłbnikarnosa
jak blaszka Kabanisa, narzędzie Kargera

Pomocników tytu i Włoxenie takier, jak
przy otwarciu worka trawego. —

Przitanie

Otwarcie worka tr.: jeśli nie jest otworzony,
jak myśli. — Otwarcie raku Kanatu nos:
racyna się po krysi, iur rto chwila,
Kiedy po otwarciu worka, wolno jest śledzić
kanat nosowy. —

1. Otwarcie Kanału nos: przy rozpułchnię-
niu jego błony wewnętrznej i części tej przeto-
rona j sposobem wyżej wym: i brodnika
wym:—

Nim się wydobędzie Łzębnik. Atwiercy
 w nosku tr: przetrzyła są ~~tena~~ tenże
 kółka rary i cięta, a odległowsy plas-
 ter utwierdzaicy Łzębnik do czoła, kółka
 rary go są pokłoci między palcami, usci-
 lując przesunęć głębiej, jeśli są ude, aż
 do dolnej części Kanału nos:— po czem
 na nowo się opatruj— następnym dni
 tu samo robic, dopóki Łzęb: ber skła-
 leor: Kanału nos: nie przeydnie do samej
 porowicy.—

Terzi naroszenie Kanału nos: naka-
zuie rwanie awiarku.—

Przeznaczają się o stanowisku, o obwo-
 dzie i rosnieniu i wnieskuje, że morina
 pomysłnie Daley Dziatać, w powiedra się
 Łzębnik Meriona z. drót z. setylet trzy-
 go: sposobem wyżej wyżej wym: i wsunąć
 się wliwanku Kanału nos:— Skoro chory
 ulewie drwin: w nosie, jeśli przy wywieraniu
 nosa kółka kropli krwi i Łzębnik nie
 natrafia na chropowatość z. kłoci, rodnie-
 lenie miysca roste, morina unawia-
 ra uskutecznioue.— Po czem Łzęb: z

Orat coſa ſię z rany i nſurwa Łytleb
z rogu wiloſy: — Łytlebnik ten roſtanie ſię
i przyrząd Łakłada, iak wyżej. — Tak
naſtępnie, przeſuwac ſię łacie od cien-
szych od grobſzych Łytleb: aby kanał ro-
zroſły, dopóki nie łacie w ſtanie przy-
jęć ſtrony. —

Terli Operator uſię Ławtoſki, otedy
roſtanowiąc ię w noſie, przeſuwa, dopóki
ſię ię długość rui: ſkonczy. —

Wprowadzenie ſtrony.

Łurſide porzyra ſię od ſtrony E. oryli
ſekundy, której koniec odmiſłory ſię
między rybami, raobragli i wyproſtona-
wſzy kawałek na ſ. Łali, poſmarowany
Ot: Mige: wprowadzi ſię iak Łytleb: do
worka tr: ſtamtę do kanału noſ: i do
dolnej części jamy noſowej, wſtrzymania
ſię na kitha minut, p: który czas chory
ſtrachem ochłonie i ſtrona rozmięknie,
poſuwa ſię ſtrona tak, aże chory ię
ię wgardle, reſte ſtrony przyklepi ſię na
coto i opaskę utwierdzi. — Oboj ſtrony
do worka tr: wlozy ſię waleczek ciemli-
wa ſkubanki a wſryſtło plaſterkiem
lepſzym z aże: utwierdzi. — Po kitha go-
drinach, gdy mianie noſowej ſtrona
rozmięknie, drucik noſową róznowrat.
Kie

na lewym, aby powisnęła p. drugą stronę
 wychyliło, a nadawany popęd mocny spo-
 sobem wycierania nosa, stara się wypro-
 wadzić stronę, jeśli stanie blisko otworu
 nos. tak, że więcej można, szczyt perykard
 mi się wydobędzie, jeżeli daleko sięga, kęś-
 ka który wionem, po ciem koniec strony przy-
 lejnia się pod skrzydłem nosa. — Przy opo-
 wadzeniu strony do kanatu nos. wydawa-
 się, że się ramiona w worku tr.: co posz-
 tregłory, wyciągnąć i wyprostować w try-
 na nowo wsunąć. —

Sposób drżania strony, j. od powiedni
 sposobowi wycia stoczków na rozszerze-
 niu kanatu unynowego. Ponieważ więcej
 cie strony j. nieprzyjemne, jeżeli równym
 sposobem więcej można stoczeki stronowe
 które od cięśnych do grubych się roz-
 wiaż. z. radzą więcej drotu otwianego,
 który j. raleczany tam szerególnie, gdzie
 w worku tr.: osobnienie obfite szluru
 ma smięsce, gdzie Lehar mi może cho-
 rego co dręć mdracie i gdzie worki łatwo
 może ramię naciskać przez dół wywierany. —
 Ławore jednak lepiej j. kiedy przed wycia-
 nym p. kłopotliwie dni więcej się z. z. z.
 rogu nieład: aby ramienię drżliwość
 worka, więc i odrym po nagłym wycia, drotu
 otw.: —

Desautt ratuje smutek czyli zawtó
lek tródnio porze korzysci męskości od
strony, że nie pędzenie i przesuwanie
i Trudniejszy, bo trzeba przesunąć
którego uszko nawleka się zawtó. —
Schmidt miał przedylekcyę do tego sposo-
bu, ale nie wiadomo z jakiego przyczyną
Łożarzenia wśród operacyi.

1. Konwulsye mianowicie w Kobiet bardzo
ciężkich, nakazuje porzucić w Oper. i
wtedy najpewniej się tyłko może tr. skus
bankę pulchną, dopóki dalej nie lego-
można postąpić. —
2. Łeczenie nakazuje wycia zawtó
tręsnących.

Łożarzenia po Operacyi.

Łeczenie mocne ropianiu — Pror wrodz
wółka tr. Caries — Neurosis — Plysmie tr.
i powrót stanu dawnego. —

Praciu Lapal: postępowanie antyphl. na-
tępowane do indywidualności, a czego: rinnen
Pianki — gdy eructość wółka, Okład — ochmicki —
muri: — Praciu ropianiu stary ochyda stary
i pręsty kanie caeramy Łagod: Kleist: scig
gaigecmi. — Praciu innym stanom widomo.
Od crason Louberta Wielbity się rodania, wrog
dem wycia rurek metallor nych Pot — Pi
chter — Walter — Dupuytren i Gräfe raczy
umilbiac ich wycia. — Znawcy dość Oper.
na wyparci tego sposobu przynośni Dupuy
tren nie wyparci iednak sejle stanom ow
ka tr: i Kanale nos: gdzie by tego sposobu
wyc można. —

Größe unvoraus na abfite odosobnienie selu
zu preexistierende. pormy sie po wprowadze
niu wstawiające raka rurki Stowiane,
kiedy Dupuytren zŁote. —

Rurka ma stanowić kanał p. który by pro
pływać moga, który po urzyciu stron, choc
dostatecznie przetworzony wytył są rozciąg
i usiłowania miszory, atąd to narzekanie
i Lehaney i chorych na traktowanie strony,
atąd wytyłło urzycie dośotu ołow: p. Sharne
i Dubois zalecone, iż urmano nie rozstrze
mie stronę więcej j chwilowe i wtedy tyłko
moż state uleczenie spowodzić, kiedy ten
razdki j przypadek, iż dyskrarjg wytył piono
Rurka wprowadzona do kanału nos: drżar
la iak Łgłb: i stronę a te ma korrysć,
iż nie urbrania doptyonu ter, nie trzyma
otworem rany worka tr: nie spowodza str
brzegów rany worka tr: co bywa przy urzyciu
strony. — Rurka wprowadzona tlni iak
ziato mech: i wtedy nawet czynność odbywa
kanatu nosowego, kiedy na równatze fistula
j rablirionna, a gdy mechaniczym nacis
kiem na sciany, o tyte i przyprowadni
do strwardnienia, iż przestaje być wy
teorna rowille tył robi miysca, iż przy
moenem uryceraniu nosa, wypadła. — Lecz
i drugiey strony na rurki naganę to morion

powiedzieć, że uścił mniły drążące ciążę,
iż strona, rantała, doot stoniany orod
tr: i kanał nosowy rapalaig gwałtownie
uścił się wstania kopuine, szatze ranie-
chać musi tego sposobu leczenia, tem
większe Kap: i Pop: przy użyciu rutiłom
tęgi, mianowicie iereli dyskoarya i ra
nasto widoczną, bo gdzie j. ułtytę, tam ty
nie tytę się khać należy, iż teoryty-
ronie khać się khać. —

Wyjaśnienie oriatania strony. — Po-
wszy raz w sunarowy strony E. kudy się ob-
niły do worka tr: w sunie walcerek re
skub: pulchny utwierdza się konie wy-
chodzący z nos: pod skrzydłem nosa plas-
terkiem lepkim, cały nos kładzie przytłoc-
dra się do czoła — co dzień z 14. dni wycy-
gać wolna strona z kanału nos: dołgo
pod skrzydłem nosa wystawiać kudy or-
swiera strony, ucina się kanałki orle-
rum nosowym odwibionym i przed wy-
giniem przestryka się work tr: więcej
nieco świąg: Lapide Divino c. R. Opiv. —
Potem po d. 14. wycy-
tercy, również z 14. kłkhanascie, iednak
przy tej stronie raniechać wsuwania ma-
kerka skubanki do worka tr: — Stosowne
nie do stanu specyficznego choroby, wycy-

się s. Solucyi Lapidis Divini c. R. Opri

z radkiego rozpuszczenia Sublimata s. samy
R. Opri z V. autory s. Masei z precept

crum: s. Janina. — Tak się postępuje dotąd,

aż się osiągnie pełność rozpuszczenia Kanatu
 nos. do stopnia dostatecznego. —

Co do dalszego postępowania w urzyciu stoecka
stronowego. — Dniem wprzód natorone Opatrie

nie po odwilżeniu odcysnuie się, stoeck strono-
wy, który był na sposób haryka ragiety, przy

Kacie tha, wydobywa się do góry po przestryk-

nięciu, potem nasmarowany masieci odpowiednią

nowy stoeck się wprowadza do worka tri i ka-
natu nosowego; po d. 14. bierze się stoeck głęboki

a po drugich 14. ieszcze głęboki i przy naigard

szym prestaie się wsuwać watecek skubanki

do worka tri. — w ten czas chory naucza się sam

solie wsuwać przy zwierciadle, o tym tylko go

przestrer, iżby koniec wystający przy Kacie olla

rowni: na linia linia raginat, bo inaczej

po rozpulchnieniu konca dolnego restalby miej-
scisty do Kanatu nosowego. — Można ten sto-

reck przeviare nitka, którą zwinięwszy skryć

pod plasterkiem angals. — Gdzie się urzędo drota

otowianego, maiać opatryc raz drugi, położyć się

choremu, aby on w nos wciągnąć V. cieptę, po

czém cofa się drot do góry, wycyszcza się

work tri i Kanatu nosowy przestryknięciem

po czém tenre drot, jeśli j. prosty i gładki

wsuwa się. — Po 14 d. urzywa się głębokiego, a

po drugich 14. ieszcze głębokiego. — Przy urzy-

drota otowianego, niekoniecznie co dni cz-

musiać go naley, owym lepić i by 2.
3 dni porostał, ranze jednak korzystnie
aby co driin precyście kanał przestryka-
niem. — Przy wycia rawnoloki, co driin naley,
cresć iij tliwacę w Kanale nos: i worku
P: wysunąć z nosa i odcieć i dalszą wsunąć
a ponownie teręca cresć w Kanale nosowym
i w worku tr: oskorpicić salurem, proto naley
odmickoryć rawnolokę przestrykaniem. — Tereli
trzeba, to cresć rawnoloki wciagać się męgiea
naprowadza się lekarstwem odpowiedniem; a
ponieważ celem wycia rawnoloki j: rozszerzenie
kanatu stać, proto tam, gdzie rawnoloka wde-
no się przesunęła, robi się iij gróbszą p: dodaniem
h. nitki; którą się raciepnia wzrętkiem do in-
nych nitk i woskiem naprowadza, a prze-
gólniey grubienie to j: potrzebne dla osób ro-
tych, silnych, u których kanaty i otłory są ob-
szerniejsze. — Co 2. i 3. tygodnie powiększa się
o 1. 2. do 4 nitk, a skoro, lekarz uwna, i jesto-
pien' rozszerzenia j: taki; iij nie tylko wde-
ale i na ranworze nie rawnoloki się, nie
zaprzestanie jednak wycia rawnoloki; ale
iisze p: dłuży czas, nitki będzie wymonot-
nymie sposobem, dopoki nie dojdzie do 1. nit-
ki, którą wyciąga. — Gdy tak p: 6. i 12. mie-
sięcy, nawet p: rok postępowano, bo po 6.
mies: przestawny recydywa następuje, a to
ciągo, iie rawnoloka nie tylko mechanicznie
driata, ale driatać ma p: nacisk i drżenie

nie i wzbudzać proces wspania w nosie
i kanał nos: części ratyfikacyjnych organi-
zmie. - Najwyższy stan tenie wraca. - Aby,
wzrostu ery można bezpiecznie zapobiec
przycia ranach ^{na} ~~na~~ ^{na} ~~na~~ unarać: -

1. Leby tak: strona najwyższa, iak i stosek
stronowy, drot otwierany i ranach na
grubsza przesunaty się lekko p kanał na
sony i worek trawy. -
2. Leby drot otwierany granie dobrowolnie p
nos: wypadat. -
3. Leby się szluz obficie nie nagromadzał, a
tem, mniej rep: -
4. Leby naciskające worek tr: występowata ciec
podobna do smietany. -
5. Leby ciata rozszerzające, były takim szluzem
powleczone. -
6. Leby chory rathansy worek zdrowe, mógł
wolno oddychać stronę chory. -
7. Leby rozszerzający do worka tr: ciec stru-
mieniem p nos wychodziła. -
8. Leby wyniosłość pokarmu się w kacie
wzrostu: oka znikła, a bregi worka tr:
rozwarły się, klesząc na wewnątrz jego. -
Gdy się takie rzeczy okierują p. b. Mias: 4,
pokry, gdy obok tego leżono podług wskazan
choroby głowna, iako powodową ratędy, można
być pełnym stałego uleczenia i środków
rozszerzających raniczać. -

Otwór mały wystający w worku tr.: zabryma
 się plasterkiem dla wybonienia przylegu po-
 wietrza otwór ten jeśli brzegi nie są stward-
 nięte, co rzadko, ranieca się dobrowolnie w
 dnie kłucha, jeśli zaś są stward.: przytrawia
 się kamieniem piśkiewnym & w otwór wypro-
 wadzi się wątki lancet i brzegi rozetnie. —
 Ale ponieważ przy obroceniu szcęk rozorene-
 nia worka tr.: i kłanatu nos: dla atonii wor-
 ka i dnak cież się w worku nagromadza i wy-
 pyna ~~go~~ go, przeto poleci się choremu, żeby
 sobą palcem naciskał w miejscu rzydła
 i miejscu środkow. wmacniających i wygnat.
 Mniej znaczące stopnie zatkania i zaros-
 nienia kłanatu nosowego, dają się czasem
 oddalić temi 2. sposobami lew. tam:

1. Gdy kłanat nosowy j. ramłnięty w $\frac{1}{2}$ swęj
 dotknę & gdzie część jego górna j. zarostł. —
2. Gdy w nosie są fałszywe wyrody, które kła-
 nat nosowy naciskają na ranke. —
3. Gdy dolna muszla nosowa j. przekształconą
 i zarostł. —
4. Gdy znajduie się Caries ossis unguis &
 kości przyległ: i caries ta stanowi konplikacyę
 i natęży ściśle do składu choroby. —
5. Gdy os unguis j. obnaronę. —
6. Gdy stan choroby worka trawego i kłan-
 atny sposób leczenia, nie może przywrócić
 normalnej czynności w worku tr.: & przeto
 musi się oddalić. —

Nie mi porostnie, nad przebiecie kości trawey
 dla utarowania drogi setworzyć do przepływu

ter do iamy nosowej, z. niszczyci worka tr.: i choremu napowiedzieć wieczne płynie nie ter po kacie wewnętrzny. — Lecz ponieważ tym sposobem postępuje, nie mamy pewności osiągnięcia celu w równym stopniu, iak je rozstrzeżenie kanatów naturalnych, przeto tego sposobu nie gnozna poczytywać, na zastępcy dwóch poprzednich, oto z tego względu:

1. że droga setuorna, iakimkolwiek sposobem przygotowana, najciężcię dobrowolnie narasta, chyba że porostanie w niej rurka. —
2. Przez rurkę porostawioną z. drogę setuorną, nigdy trzy nieodpływają tak, iak je kanał żywnoty, stąd tylko trzy płyną z ciężkością. —

Przyrząd.

Terz narzeczia co powyżej. — Trójgranicie Potła z rurką z. narzedzie Dupuytrona z rurką z. trójgranicie z deprezorem Pellierainne — jeśli się chce kość wyciąć importe pica Buntora — wałek z cinkich nitów — stożki stronowe i wszystkie części do opatrzenia potrzebne.

Działanie.

1. Kres otwarcia worka trawego, iak powyżej opisane. —
2. Kres. — Po poprzednim rozstrzeżeniu i wyzyszczeniu worka tr.: Lekarz wprowadzi trójgranicie i rurkę ułożenie z rurki: na wien: z góry do dołu, z przodu ku tyłowi, w dolnej i tylnej części worka tr.: i kości tr.: wstawiając trójgranicie

~~z punktu~~ sposobem kroczenia i cieżar z miłoś-
sile, i tak przeprowadza i by otwor wew. by
pod przednim końcem górnej muszki noso-
wej, między tą muszką i procesus maxile-
laris; - zastawiający rurkę trójkątnej wycię-
gnię; - jeżeli się znajduje droga wycię, wtedy
trójkątnej spodka konicy muszki i blasku
kości sitawcy - kłosa kropki brzośi wypływ
z nosa przez trójkąt konicy V. p. rurki i gdy
wypłynie zęba z nosem, wówczas się droga
dobrze, potem kłosa wprowadzi między
włoski p. rurki trójk. do nosa i poleciwszy
czyścić nosa, wydobycia konicy między
między nosowej brzośi z prętką się tró-
kątnej z rurki z tek. sposobem powy-
żym i w otwór przetworzony wprowadza
się konicą otwórka strawy z strony - albo
strona p. kłosa miniat brzośi nosem kłosa
porównany wóć, otrzymać głębiny, gdy rbi-
ny się konicą odmieli do nosa wydob-
dzi się. - Podaje prętką, między
wóć się przetworzy, aby się między prętką
i między głęboko wpaść do jamy nosowej
sposobem kroczenia dla tego się prętką,
aby się kłosa między paszorek pata, z tek. dła-
tę z sposobem, kłosa spawie z rurki

Imi ralecaci przed przebiegiem obnaryc
 kosc ciecim, - rada jest, bo ciece sprawnia
 krowanumie miysce drzatania rastanaique
 holce wystajacego ra worku trygranca, nie
 ma lypor naklsry nad $\frac{1}{2}$ linii -

Opatrzenie. - Wyjelni sa worki tr:
 naderkum skub: pulchorny w V. ciapt: zmag:
 i pokoyie pilast: lepkim, konie gorny
 nitki przylepia sa na crole, dolney
 pod skrytem nosa. -

Leczenia po Operacyi

Gnatowny bol glony - znerne nabr-
 mienie powiek - gzeraste wyrastanie z
 worka tr: - uparte owrucha: worka tr: -
 zarosnienie drogi srturaley. -

Lnaykle bol glony i nabrzmienie po-
 wik przy spokoyem zachoracium, do-
 boscioalnu ustypnie, a iesliby przyryzua
 bylo ra wilkie wypetnienie worka tr:

skubanku, Opatrzenie ponowi sa i mniy
 sa worki tr: wypcha. -

Wyroastanie gzeraste i owrucha: worka
 wymaga stosownych lekarstw, rownierz.

urzyć się Masce i porzucić: eren: i mro-
tonier: iahor urzyć można Solucyi Nitro-
tis Argentę - przystawiać tym re-urzyć
można rozszerzonego kwasu - Solucyi
Octanu Plurii. - Co dzień worki te: prze-
mywają się, Łaskotki: i ma nowo wypełnia-
ją skubankę - odnawia się rozszerzanie
i utrzymuje w otworze worka tw. - Jeżeli się
postępuje sposobem 1. to j. jeżeli miedzi
przebiegnięto drugiego dnia w prowadza-
ją miedzi, iedwab: a w siodłań naci na
15. cali długiej, przynajmniej się walcem
z cienkich nici uwiąty i odpowiedniej
głębokości otwór: przetworz: nasmarui-
ją go Masce potrzebnej i przebiegnię-
ją miedzi do kranu stacjonarnego. - Tak
codziennie się postępuje wydobywanie
walcem p. nos i co dzień nowy wsu-
wając. - Po 12. d. walcem ten robić
grubszy, i tak p. 5. 4. 6. Miedzi-
cy urzyna się. -

Jeżeli się 2. sposobem postępuje, drut

dlugo tak, iak przy wieciu strony, a
skoro stwierdzona siecią sztucznego
kanatu, o tym stani, iż raborjora
od ciarosa: raniuchać rorowiedza. —

Przy wieciu atoli watekoni, iusere po
ich oddaleniu, rostanie się nitki iednabi-
ne, je R. D. Ktore po tem wolno przygryz-
aby się otwor w worku tui ragoit. —

Zapobieganie rorowiedziom nowicy drogi
nie onato Ktore roboto, rorybke nie
badro się pomysłnie powodzi; to byto
powodem Pichterowi i Skarpie, i
radziti wiec ielara rorpalanego, —
co na nadto gorattonne w rbuska
shodku, na wiele niszczery i narania
na umierzenie orzei porybke. —

Dlugie stanowisko rurek metaliow-
owsumanych, nie j pewnem, a skoro
wypadna, stan dawny wraca. —

Preraczenie rachowania się dietety-
cznego, clem ukroćcenia reprodukcji,

nie wiele wyskac moiny, ani ter
pe kienie na bolu z dronym, irby
sie w drodze sztuczney ciece statnicy
nie nagromadzały. —

Po wyskaniu drogi sztuczney, wy-
dawa sie, ze ciece worka tr: pod
i nad porzeczkiem drogi sztuczney,
wypetnia sie z trami, w tedy chory
ma je wycisnac palcem. —

Tzwane Schmidt postregat, mierzot-
ny stan fistuly worka tr: to j re-
zany^{na} worka tr: pochodzący ze rwa-
nina, i daie mu sie, ze stan ten,
porimiondy sie dae leciec iak fis-
tula kanała Stenona, to j rozse-
rzye otwor fist: rewn: i wew: sciąsy
otworu przytranie kamieniem płaskim
o tyly irby skornia powstata, ktora
by tymczasem wlebraniata od plynu
ter na rewn: a odpadlosy zostawia
maysze rozdrazn: do tego stopnia rewn:
iulki, irby otwor mozt zarosnac. —

Operatio Sterygii

211

Dratamieut kum parimienany odagi caatthe
starydeltha = iate = pnenie prosta sta jego
porzucenie, a reszte rostawiajac swednieu.

Wskaz: starydeltho pneskadrajac wrozkowi, i ma
jac rachojsie wabk. rog. jej pnerowyston odg
mijac. To ma mizee gdy wryto popmeduo
prostho mogany pnierye sknyd².

- Kalkary 1. Wrethla dha wspotacna kati oler
2. pgrubienie, raem, rozgulotnienie bti. rog.²
3. Daonow sknydeltha, kt. muno swania, mego
starye. bti. rog.³ miera-graja

Dratamie to naj. tak dabie skaryzac, bez o ka
nyu jego, mozna bytlo sadu rowelwien skny
deltha, re stozyma rozrzenena jego, iedzista
jego, rdawnowi komplikacyi, i re kt. norm. i
menorm. bti. rog.² Tam gdzie sknydeltho p. b.
obreme, gdzie po w: rastania mienig, a kum +
jest calkiem, gdzie j. ziele prosta i. cornea
mian: jest cornea j. pnerostorona, tam konyu
spodniewai iiz memorna, bo choi re odczyni
sknydeltho pnerowyston iu nie wron, Ma
wet goni sknydeltho wotko wedi, a naj
pomyt: odrobieniu, metnion cornea, wotaji
choi wroth rownerych uornas.

Tam gdzie sknydeltho dopiero cornei nagraja,
konyu i widoczna.

Przynaj: druzp: skoncami delik. anoti: nozysk
wotkote i dawiela, delikatny noryl, gabli
i ciepla, kompresy, opaska walcowa.

Chorego sadza się na knieie na jęu swiatła i aby uko-
nie swiatło padało

1. Dziat. Gdy skrzydłko pulchnie j. ośrodku na
bł. rog i ja przezu rastawia

Pomocnik powieka gorną ułnyuje palcem wstecz.
i ind. i gł. do pierzi przysucha. Lemiej palcami wstecz
odwaga powieka dolną. Operator ułnyuje raskrzydłko
swyprygłkami, przy jego ośrodku tak aby
nie naraził corneule i lacrymalis, poczygga
skrzydłko ku sobie, odcina się od skrzydła
swyprygłkami wklepdeniu podwinie, potem
ułnyuje breg ind. skrzydła i odrabia
norygłkami Dwiela od skrzydła ku lornia
ciężani do środka się zbierają cemi do
podstawy skrzydła ku jego wierzcho-
tkowi. Podług Skarpy swyprygłkami ręką
prawą trzymając, ułnyuje się za skrzy-
dłko na $1\frac{1}{2}$ linii do legła od jego wierzcho-
łka, jeśli się operuje na oller prawej
do tego stopnia. Odcina się od oller, a in-
da się stopnie wleci-urze skrzydła
umiesionej ściśle się przy bł. rog. nory-
głkami odcina od wierzchołka ku podsta-
wie, potem cześć porostatą odcina się na
l. 4. $1\frac{1}{2}$ linii pod bregu błony rogowej. cięci-
pod kółkiem i odcina od ralia cięciami
Koncentrycznie idącemi do bregu błony
rogowej. — Poczto cięcie, to się rysknie,
i po rabbinowina rany, nie porostanie

pasmo zallirniunia zatrudniające ruchy
sta. — Wzrost, gdzie wzrzechotek i na
precio wzrzeni, tam tylko, gdzie pule-
chno lery wolno odrobie, gdzie nie, zesta-
wia się, przestaje na preciein, macyr-
porzynażących ten wzrzechotek, który pod-
padnie wosfania, bo chce go odcieć, n-
shutku zranienia, na blonie rogowej
zostanie metność. —

Dział: Przy takim stopniu polzerenia
Skrydetha z blone rog: i z ber znaerney
skaleer: bl: rog: narudziamy ostremie
odrobie nie morina. —

Wtedy wymuie się na Skryotyce przy
bregubli rog: skrydetho skryperykam, z-
niostory falka, wycina się i z nożyerkami,
a wotwór zrobiony wprowadza się noży-
erki i przecina Skrydetho kolisto, blis-
ko bl: rogi — skutkiem tego cięcia będzie
skurczenie się części Skrydetha na blo-
nie rogowej będącej, która po kilku
dniach dać się będzie skryperykami z-
obcięższy do kła, przestanie się na tra-
wieniu części porostatej. — Wzrost, gdzie
Skrydetho mały część blony rog: pokrywa

można jego wierzchołek przeciąć nożem
przy Cornea, cacię to, nie ma drżyc w
Sclerot: ~~po~~ co przecięty roztanie podsta-
wa ryci zbliżającej się do błony rog-
tanie przecięcie można powtórzyć.

Opasanie. — Porwolinszy aby miły
se rwan: p kółka minut krowańto,
odrysza się twarz ze krwi i na oko, po
ramknieciu powiek, przytóry się miły
kompres, który się przytwierdzi opaską
kotową.

Zdarzenia po Operacji.

Ból gwałtowny — Naprężenie i Zap: oka
Czes. Pterygii w ramieniu dalszego postę-
powania roztawiona, może sprawnie mę-
tłość błony rog: i mimo palchne przy-
stawianie Pterygii do bł: rog: po rdzieciu,
błona rog: nie odrysa porowowystości.
Ból gwał: nie kaniernie j wypadkiem
Zapab. lecz czasem skutkiem drażn: ~~rozp~~
nerw: więc usmierzyc się da Okład: cięty
wily: & narkot. — zachowanie się chorego
antepilog. — Gdzie ból i naprężenie w oku
się wypadkiem nap: i dochodzą stopniowa-
ren: postkromiają się postępowaniem pro-
cinowalnym. Po tym prur kółka
dni, w puszcza się pod powiekę kółka

113

hropli Mleka ciępt. & Mucil. Sim:
Cydon. — Porostatac skrzydlatka na bł. rog:
po ustąpieniu Zap: traum: leczy się tak,
jako przedmiot, którego umiśnienie raz
mierzamy. — Mocność błony rog: bywa
emissioną środkami przeciw płomom bł. rog:
Dalsze postępowanie na tem restry, aby
oko co dzień 2. & 3 razy przemyć Odwar-
zem tężnym Salsur. — Porostajęc wro-
tami Conjunctive, rychło ustępuje w
sposób użycia środków, przeciw mocy
błony rog: wymierzonych. —

Sectio Corneae.

Nie dawnemi crasy, porażony r. War-
dropem, wielu ralecato otworzenie Komórki
przedniej oka, dla upuszczenia cieczy cię-
ry wodnej, jako środek abarwienny i
najdzielniejszy antyphlog: w Zapaleniu
oka, które najmocniejszemi antyphlogis-
tikami wbiegu wstrzymać się nieporadza.
Mamy Zapł: skrofaliarne, serulopityno-
we, które nader trudno dać się postroz-
nić. — mamy postrozenia, że w takich
Zapal: gdy Cornea pęknie i ciecz wodna
z Komórki przed: upływać może, że napt:
to postaramia się zmniejsza i ustępuje —
lecz ta ulga, jako choroby doznać po

pełni: cornea, nie może być miarą ub
gi, mogący nastąpić po otworzeniu
ry rog: bo to j bodźcem do wysnego sto
pnia Zap. —

Ograniczając się na postępowaniu in
nych, upuszczenie cięry wodnej, ma
być korupcyjne w Zap: Kuli oka, gdzie
leżąc się nadziw, aby cornea nie pękła
w których postępowaniu rana, mę
ność cięry wodnej i chory się uwalnia
ból mocny głowy i rozprzeczanie Kuli
oka. — Wardrop. raleca usunąć: cię
ry wodnej, przez tego, przy pomocy
stos: Staphylomatis, a nie ich nie or
nacza, przez to rade się, iż tam tyflio,
gdzie Staphyloma j erycto catensy.

Operatio Staphylomatis.

Celem działania tego j odebrać wypukłość
przebieg Kuli oka przez się i w całym się
obwodzie, w ramieniu w budowaniu takowe
go stopnia Zap: Ktoreby zmniejszyć mogło,
dalsze odosobnienie cięry wodnej. —

Wskazania.

1. Staphyloma cornea totale, a mianowicie ta
kie, które usiere cięgle wzrasta, j boleśnie
namierac się powiększon nie dawała i wystania
ją Kuli oka na nptyny nieważne, gdzie
niebierając instancją zmniejszenia i. w którym
się postęga ślad, czy to w samym Staphylo
macie i. Kuli oka, gorzej przezistoczenia

- schodł: na północy. —
2. Staphyloma racemosum: gronkowe: / jeśli
nie ciele i rugulnie i deroganizowane i
ma skłonność do rozrzedzenia się na ciele
j: hirsophthalmia: j. —
3. Staphyloma corporis ciliaris. —

Leżary.

1. Gdzie Staphyloma j w stosunkach roz-
pisanu przeciwnych wyniesionym przy
wskazaniach. —
2. Gdzie kula oka j tak rozszerzona, i cel
uleczenia dopięty tylko mój na j. i j. nyz-
cicie. —
3. Gdzie stan chorego rnosnym uogólnie mój na
średkami lekarskimi. —
- Operacja ta, tylko przy wysokim stopniu
obratowości chorego z. oka, może wzbudzić
odczyn nader bolesny i niebezpieczny: lecz to j
nieuniknione, bo rozryte samo drżenie ani istnie-
nie oka nie regeneruje, ani organizmowi, więc
Operacji przynajmniej mój na skutki rbaning,
bo najcięższe i niebezpieczne i cel mój bydr dopię-
tym bo odcieniony produkt jaskry, rnie się
się dać i odcienieniu cielej wodnej, j. od-
czyn rnapalen. Operacji wzbudzonej. —
- Prze-
ciec nie mój na, je czasem bywa średkami
średkami — pomocnym, lecz Staphyloma rostanie
wzrost, lecz Operacji, deroganizacji nie tylko oka
regeneruje mój, ale i rycie, więc przynajmniej należą
wielkie wartości, jeżeli lepiej nie ma lekar-
stwowo czasem, na rycie średkami lekarskich.

Sposób operowania j. kłosa

Jedni radzą, trawie kłosa rog. - inni kawiorki
przebiegac - inni oaciec - inni odcieć - inni
i tacy, którzyby chcieli podwignąć, lecz tego
strasze napalenia. -

Przyrząd.

Nóż kataraktowy p. Bucra do Staphylomaty,
przerobiony - Nóżekli Davila z. w kłose
Ludwika - Szaryperki anatomiczne -
Ułósniuk powieki Pelliera z. Richtera - Ha-
czyk do utrzymywania kuli oka, gdy j. w
k. Sta phyloma - Jętki - Wóda ciępa i zim.
plastry angielskie - Kompresy - Opaska. -
Ułożenie się chorego iak do Pterygii, iereli,
drucie, obwiązany nóżki, sadna się na ko-
nie Pomocnika. - Pomocnik z tyłu chorego
ręką 1. przyciska głowę do swoich pierś,
palcem wsłk. ręki 2. z. unoszikiem podno-
si górną powiekę, bez dotykania kuli oka
palcem wsłk. i środ. Operator ściągając dolną
powiekę do dołu, nóż w białą przy kciwie zew. oka
w cornie staphylomatyczną, nieco nad średnicą
porzeczną, po cym posuwa nóż ku kłontowi wew.
oka, odcina z kłose bl. rog. Dolną iak przy wydobyciu
katarakty, potem uymnie szaryperkami na odcie-
niuk cornea i nożykami odcina drugie 1/2 kłosa - nie
chce wyrwać nożyrek, obrociny nóż do góry, os-
trzem cięcie kłosa dokonac. -
Jedni Staphyloma j. skomplikowane z. warietate
anadydują się w obwodzie jęgo, przydanie Operacji,
są mściwe, choćby nalerata cusi Sclerotie rąk, w
takim razie, użycy kacykiem na Staphyloma
kłada się nóż, aż w Sclerotie, tunc z góry do dołu i

reszty porostajęcej odcina nożyczkami Ludwika.
Tam gdzie jest Staphyloma corporis ciliaris, robi się
cięcie $\frac{1}{2}$ i tak: ~~z cięcia~~ w okolicy dolnej oka, z kła-
wego rozszerza się nożyczkami aż do kła, cięciem
tem nożyczkami odcina się kłone, rog. tęgę, socren-
kę z torobką, corpus ciliare i część Sclerotica i
corp: cili: rosta, więc $\frac{1}{2}$ i tak $\frac{1}{2}$ oku kuli oka i -
Mamy inny stan patologiczny oka Staphylo-
ma cornea pellucidum s. Hyperceratosis p. Adams
sa - oistocie tej choroby nie są w zgodzie i idon-
radzą środki sięgające, inni wypuszczają wodę.
Adams uleczył stale wydobywając Socrenkę.
Gdzie oko jest bardzo niepokojące przy Operacji, le-
piej nie oszczędzać chorego, ratować w Sta-
phyloma kaerki. -

W czasie Operacji strodz się naciska na
kulę oka, aby nie stać się przychylną magła-
go wypadnięcia socrenki i cięczy siłanicy. -

Gdzie jest Staphyloma racemosum, tam od razu i
przydnie w samej osadzie cornea z samego
Staphylomatu. -

Operowanie. - Lewarszy powieki, ramyką
się plastrami lepkimi. oba oczy, na karku
oko przykłada się kompres, który się utwier-
dza na ciele Opasłaz walcowy.
Łedarsza się po Operacji.

1. Jeśli pozostały tron kuli oka, zapieknem.
zmniejsz: prur. Łapi: i Rop: ulęga. -
2. Jeśli Łapi: bywa na mało mały, i tak potrzebne
do zmniejszenia odosobnienia cięczy wodnej, co
nadknie. -
3. Wydarżają się wyrostki z przetrwaniem chorego. -
4. Wypada nerwa i ruysechiana w postaci $\frac{1}{2}$ kuli
Browney. -

5. Wydara się ze otwor odciety cornea czopek
brawny natykal. —

6. Wydara się, że tam gorie nie odcieto samy
Sorentki, ta występuje z oka, toż i cięć słu
Leccenie


Zapalenie i takiego stanu umysłu, gorie
wymioty następną, kalery na rąstosowaniu
do indywidual: leccenia antyphlog: i postę
usmierz: wycięć Pławek, Okład: zimn: — go
palenie ustanie Okład: ciepły, a nay x na us
pokojeniu umysłu i uniesieniu drżani
nia swiatła. —

Gdzie Łop: na mate, d. l. s. 8. otwiera się oko
i porwała przystęp powietrza i swiatła. —

Gdzie błona nerw: i mysch wystąpiła, wycięć
noryerek Ludwika z pło odcięć postępną
Sorentka występuje wyprzedzić i z naley
Przećć wypadnięć cięć słu: nie robić
nie x nad rawarć poklek, słu: koinosę, leccenia
na gorbaciu. — Chory ma lecieć p dni kłłła,
dopóki nie minie nieberpięczeństwo, p
wypadnięcia cięć słu: — posila się go tylko
pitynnem pokarmami, a by ich nie rut, kom
pięsty często się odnawiać, bo cięć słu: p od
płyn. — Oka oczy ramknieć byde onacz p
8. 10. dni. — Oka chore parę razy na dzień p
cięć słu: odnawem słu: przy otwieraniu oka
byde ostrożnym, aby błony delikatney exsudatu
plastycznego nie rawać. —
Gdzie Przy pomysłu powodzenie się w 8. 4.
10. dni uleccenia —

[Faint handwritten text from another page, likely bleed-through or adjacent folio.]





BIBLIOTEKA
Wyższego Seminarium Duchownego
w SANDOMIERZU

R 1760

2 Isigobhona
 Ea. B. Grolomkogo

Fragment Chirurgi praktychny

Uy muregotinene neary rawantjij

Carwato, Eshingato Festuati — sp. 1.
 Operatio ad...



7
 19
 25
 37
 40
 64
 82
 84
 87
 91
 93
 94
 96